12Cag：Eα=740keV-BAT-RESULTS

备注：

1. 12Cag模拟考虑了无限厚靶情况；使用R. J. deBoer et al.(2017) R矩阵截面及分支比；基态分支考虑了角分布；
2. 11Bag模拟从靶面发射
3. 分析的实验数据共测量105.5 h，实验室本底采用了108h，进行了归一并fix先验
4. 实验数据累计**240.8 C**；按照deBoer R矩阵截面计算理论反应数目（0.54/C）：**130**

48块探测器sum总谱，未施加其余条件；Fit ROI:1000-14000 keV；

200 keV/Bin；12Cag reaction counts

Global mode：122± 23；Median +- central 68% interval: 123^{+25}_{-22}



---

nhit == 1 && Innernhit == 1；Fit ROI:1000-14000 keV；200 keV/Bin；

12Cag reaction counts

Global mode：128± 26；Median +- central 68% interval: 130^{+28}_{-25}



48块探测器sum总谱，未施加其余条件；Fit ROI:5000-14000 keV；

300 keV/Bin；12Cag reaction counts

Global mode：164± 25；Median +- central 68% interval: 165^{+26}_{-25}



---

nhit == 1 && Innernhit == 1；Fit ROI:5000-14000 keV；

300 keV/Bin；12Cag reaction counts

Global mode：141± 28；Median +- central 68% interval: 144^{+29}_{-27}



5270keV&6166keV受从冷阱位置发射的11Bag反应的γ影响

48块探测器sum总谱，未施加其余条件；Fit ROI:7000-14000 keV；

300 keV/Bin；12Cag reaction counts

Global mode：139±23;Median +- central 68% interval: 140^{+24}_{-23}



200 keV/Bin；12Cag reaction counts

Global mode：150±23;Median +- central 68% interval: 152^{+24}_{-23}



100 keV/Bin；12Cag reaction counts

Global mode：147±22;Median +- central 68% interval: 148^{+23}_{-22}



nhit == 1 && Innernhit == 1；Fit ROI:7000-14000 keV；

300 keV/Bin；12Cag reaction counts

Global mode：129±27;Median +- central 68% interval: 130^{+29}_{-26}



100 keV/Bin；12Cag reaction counts

Global mode：142±27;Median +- central 68% interval: 144^{+29}_{-27}



内层16块sumInner总谱；Fit ROI:7000-14000 keV；

300 keV/Bin；12Cag reaction counts

Global mode：138±25;Median +- central 68% interval: 139^{+27}_{-25}