

Appunti Algebra 1

APPUNTI DEL CORSO DI ALGEBRA 1 TENUTO
DALLA PROF. DEL CORSO E DAL PROF. LOMBARDO

DIEGO MONACO
d.monaco2@studenti.unipi.it

Anno Accademico 2022-23

Indice

1	Gruppi	4
1.1	Automorfismi di G	4
1.2	Automorfismi interni	4
1.3	Azione di un gruppo su un insieme	9
1.4	Azione di coniugio	13
1.5	Applicazioni ai p -gruppi	14
1.6	Teorema di Cauchy	15
1.7	Azione di coniugio su un sottogruppo	16
1.8	Teorema di Cayley	17
1.9	Permutazioni	20
1.10	Classi di coniugio in S_n	26
1.11	Prodotto diretto	28
1.12	Prodotto semidiretto	30
1.13	Teorema di struttura per i gruppi abeliani finiti	35
1.14	Teorema di Sylow	42
1.15	Gruppo dei Quaternioni	50
2	Anelli	56
2.1	Riepilogo sugli anelli	56
2.2	Operazioni tra ideali	60
2.3	Anelli quoziente e omomorfismi di anelli	64
2.4	Prodotto diretto di anelli	68
2.5	Ideali primi e massimali	70
2.6	Anello delle frazioni di un dominio	74
2.7	Divisibilità nei domini	80
2.8	Domini euclidei (ED)	83
2.9	Domini a ideali principali (PID)	87
2.10	Domini a fattorizzazione unica (UFD)	88

Ringraziamenti

Davide Ranieri, Federico Allegri, Pietro Crovetto, Francesco Sorce, Leonardo Migliorini, Matteo Gori, Daniele Lapadula, Alessandro Fenu, Leonardo Alfani, Clementina Salamina, Giorgia Capecchi, Gianni Bellu, Carlo Rotolo, Lorenzo Picinelli.

§1 Gruppi

§1.1 Automorfismi di G

Dato un gruppo G possiamo definire l'insieme degli automorfismi di G come segue:

$$\text{Aut}(G) = \{\varphi : G \longrightarrow G \mid \varphi \text{ isomorfismo}\}$$

si verifica facilmente che $(\text{Aut}(G), \circ)$ è un gruppo, e in particolare $\text{Aut}(G) \leq S(G)$, ovvero il gruppo delle permutazioni di G . Si osserva che $id \in \text{Aut}(G)$, $\varphi \in \text{Aut}(G) \implies \varphi^{-1} \in \text{Aut}(G)$ e $\varphi, \psi \in \text{Aut}(G) \implies \varphi \circ \psi \in \text{Aut}(G)$.

Esempio 1.1 (Esempi di automorfismi)

Esempi di insiemi di automorfismi:

- $\text{Aut}(\mathbb{Z}) = \{\pm id\}$.
- $\text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*$.
- $\text{Aut}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong S_3$.
- $\text{Aut}(\underbrace{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}_{n \text{ volte}}) \cong GL_n(\mathbb{F}_p)$

§1.2 Automorfismi interni

Definizione 1.2. Dato un gruppo G possiamo definire l'omomorfismo di **coniugio**:

$$\varphi_g : G \longrightarrow G : x \longmapsto gxg^{-1}$$

dove l'elemento gxg^{-1} si dice **coniugato** di g .

Proposizione 1.3

Valgono i seguenti fatti:

- (1) $\varphi_g \in \text{Aut}(G)$, $\forall g \in G$.
- (2) $\{\varphi_g \mid g \in G\} = \text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$.^a

^a $\text{Inn}(G)$ si definisce **gruppo degli automorfismi interni**.

Dimostrazione. Proviamo le due affermazioni:

- (1) Per verificare che φ_g è un automorfismo bisogna verificare che φ_g è ben definita, ma ciò segue dalla chiusura di G per l'operazione. Verifichiamo che sia un omomorfismo:

$$\varphi_g(xy) = gxyg^{-1} = gxg^{-1}gyg^{-1} = \varphi_g(x)\varphi_g(y) \quad \forall x, y \in G$$

ci resta da verificare che sia una bigezione. Partiamo dalla surgettività, vogliamo verificare che $\forall y \in G, \exists g \in G$:

$$\varphi_g(x) = y$$

in tal caso basta prendere $x = gyg^{-1} \in G$. Per l'iniettività si osserva:

$$\ker \varphi_g = \{x \in G \mid \varphi_g(x) = e\} = \{x \in G \mid gxg^{-1} = e \iff x = e\} = \{e\}$$

pertanto φ_g è iniettivo.

- (2) Verifichiamo che $\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$; mostriamo prima che $\text{Inn}(G)$ è un sottogruppo di $\text{Aut}(G)$, infatti: $id = \varphi_e \in \text{Inn}(G)$, $\forall g_1, g_2 \in G$ vale che $\varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2} = \varphi_{g_1 g_2} \in \text{Inn}(G)$, infatti:

$$\varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2}(x) = \varphi_{g_1}(g_2 x g_2^{-1}) = g_1 g_2 x g_2^{-1} g_1^{-1} = \varphi_{g_1 g_2}(x)$$

infine, $(\varphi_g)^{-1} = \varphi_{g^{-1}} \in \text{Inn}(G)$:

$$(\varphi_g)^{-1} \circ \varphi_g(x) = (\varphi_g)^{-1}(g x g^{-1}) = x \iff (\varphi_g)^{-1} = \varphi_{g^{-1}}$$

e analogamente per l'inversa a destra. Per verificare la normalità bisogna mostrare che:

$$f \circ \text{Inn}(G) \circ f^{-1} \subseteq \text{Inn}(G) \quad \forall f \in \text{Aut}(G)$$

ovvero:

$$f \circ \varphi_g \circ f^{-1} \in \text{Inn}(G) \quad \forall f \in \text{Aut}(G), \forall \varphi_g \in \text{Inn}(G)$$

si osserva che $f \circ \varphi_g \circ f^{-1} = \varphi_{f(g)} \in \text{Inn}(G)$, infatti:

$$\begin{aligned} f \circ \varphi_g \circ f^{-1}(x) &= f(\varphi_g(f^{-1}(x))) = f(g(f^{-1}(x))g^{-1}) = \\ &= f(g)f(f^{-1}(x))f(g^{-1}) = f(g)x(f(g))^{-1} = \varphi_{f(g)} \end{aligned}$$

□

Osservazione 1.4 — Se G è abeliano, allora $\text{Inn}(G) = \{id\}$, infatti:

$$g x g^{-1} = g g^{-1} x = x \quad \forall x \in G, \forall g \in G$$

Proposizione 1.5

Dato un gruppo G si ha:

$$\text{Inn}(G) \cong G/Z(G)$$

Dimostrazione. Per dimostrare il teorema ci basta trovare un omomorfismo surgettivo da G in $\text{Inn}(G)$ e poi sfruttare il Primo Teorema di Omomorfismo. Sia:

$$\phi : G \longrightarrow \text{Inn}(G) : g \longmapsto \varphi_g$$

tale applicazione è chiaramente ben definita, ed è surgettiva per come abbiamo definito $\text{Inn}(G)$. Verifichiamo che è un omomorfismo:

$$\phi(g_1 g_2) = \varphi_{g_1 g_2} = \varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2} = \phi(g_1) \circ \phi(g_2) \quad \forall g \in G$$

dove la penultima uguaglianza è vera per quanto visto nella dimostrazione del (2) della proposizione precedente. A questo punto, per il primo teorema di omomorfismo si ha che:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\phi} & \text{Inn}(G) \\ \pi_{\ker \phi} \downarrow & \nearrow & \\ G/\ker \phi & & \end{array}$$

dunque:

$$\frac{G}{\ker \phi} \cong \text{Inn}(G)$$

non ci resta che osservare:

$$\begin{aligned} \ker \phi &= \{g \in G \mid \phi(g) = \varphi_g = id\} = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x, \forall x \in G\} = \\ &= \{g \in G \mid gx = xg, \forall x \in G\} = Z(G) \end{aligned}$$

□

Osservazione 1.6 — L'isomorfismo trovato è del tipo $gZ(G) \mapsto \varphi_g$, ricordiamo che è ben definito per il Primo Teorema di Omomorfismo.

Osservazione 1.7 — Si ricorda che se $G/Z(G)$ è ciclico, allora G è abeliano (e quindi $G/Z(G)$ è banale), infatti, sia:

$$G/Z(G) = \langle gZ(G) \rangle$$

Presi $g_1, g_2 \in G$, si ha che $g_1Z(G) = g^{k_1}Z(G)$ e $g_2Z(G) = g^{k_2}Z(G)$, da cui:

$$g^{-k_1}g_1Z(G) = Z(G) \iff g^{-k_1}g_1 \in Z(G)$$

ovvero $\exists z_1 \in Z(G) : g_1 = g^{k_1}z_1$ e analogamente $g_2 = g^{k_2}z_2$, da cui:

$$g_1g_2 = g^{k_1}z_1g^{k_2}z_2 = g^{k_1}g^{k_2}z_1z_2 = g^{k_1+k_2}z_1z_2$$

e contemporaneamente:

$$g_2g_1 = g^{k_2}z_2g^{k_1}z_1 = g^{k_2}g^{k_1}z_2z_1 = g^{k_2+k_1}z_2z_1 = g^{k_1+k_2}z_1z_2$$

dove nell'ultimo passaggio si è sfruttato il fatto che $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ e $z_1, z_2 \in Z(G)$. Da ciò segue che G è abeliano.

Osservazione 1.8 — Dunque $\text{Inn}(G)$ ciclico $\implies G/Z(G)$ ciclico $\implies G$ abeliano da cui:

$$\text{Inn}(G) \cong G/Z(G) \cong \{e\}$$

Osservazione 1.9 — $N \trianglelefteq G \iff \forall \varphi_g \in \text{Inn}(G)$ si ha $\varphi_g(N) = N$ (o anche $\varphi_g(N) \subseteq N$). Equivalentemente, i sottogruppi normali di G sono i sottogruppi **invarianti** per automorfismi interni (ovvero sono tali che $gNg^{-1} = N, \forall g \in G$). Se $N \trianglelefteq G$, si può considerare:

$$\text{Inn}(G) \longrightarrow \text{Aut}(N) : \varphi_g \longmapsto \varphi_{g|N}$$

con $\varphi_{g|N} : N \longrightarrow N$ che è un automorfismo, infatti rimane iniettivo, la surgettività segue dal fatto che $\varphi_g(N) = N$, e infine, essendo φ_g un omomorfismo su tutti gli elementi di G , lo sarà in particolare anche su tutti gli elementi di N . Dunque

quando si ha un sottogruppo normale, ogni automorfismo interno si restringe a un automorfismo di N .

Abbiamo visto che i sottogruppi normali sono invarianti per automorfismi interni, possiamo generalizzare quest'idea e considerare i sottogruppi invarianti per automorfismi:

Definizione 1.10. Dato un sottogruppo $H \leq G$, esso si dice **caratteristico** se è invariante per automorfismi:

$$f(H) = H \quad \forall f \in \text{Aut}(G)$$

Anche in questo caso basta verificare che $f(H) \subseteq H, \forall f \in \text{Aut}(G)$, perché si ha anche che:

$$f^{-1}(H) \subseteq H$$

da cui si ottiene:

$$f(f^{-1}(H)) \subseteq f(H)$$

Osservazione 1.11 — Si osserva che se H è caratteristico in G , allora è invariante per tutti gli automorfismi di G (e quindi in particolare quelli interni), dunque se H è caratteristico in G , allora è anche normale. Il viceversa è falso.

Osservazione 1.12 — Se H è caratteristico in G (dunque normale), si può scrivere un'applicazione:

$$\text{Aut}(G) \longrightarrow \text{Aut}(H) : f \longmapsto f|_H$$

dove $f|_H$ è un automorfismo di H .

Osservazione 1.13 — Si osserva che se H è l'unico sottogruppo di G di un certo ordine, allora H è caratteristico in G (segue immediatamente dal fatto che gli automorfismi preservano gli ordini degli elementi).

Esercizio 1.14. Il centro di un gruppo, $Z(G)$ è un sottogruppo caratteristico.

Soluzione. Per dimostrare che $Z(G)$ è caratteristico è sufficiente far vedere che:

$$f(Z(G)) \subseteq Z(G) \quad \forall f \in \text{Aut}(G)$$

ovvero:

$$f(z) \in Z(G) \quad \forall f \in \text{Aut}(G), \forall z \in Z(G)$$

dunque bisogna verificare che:

$$gf(z) = f(z)g \quad \forall g \in G$$

poiché f è un automorfismo, allora $\exists h \in G : f(h) = g$, dunque:

$$gf(z) = f(h)f(z) = f(hz) = f(zh) = f(z)f(h) = f(z)g \quad \forall g \in G$$

□

Esempio 1.15

Sia $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{1})\}$, G ha ordine 4 ed ha tre sottogruppi ciclici di ordine 2:

$$H_1 = \langle (\bar{1}, \bar{0}) \rangle \quad H_2 = \langle (\bar{0}, \bar{1}) \rangle \quad H_3 = \langle (\bar{1}, \bar{1}) \rangle$$

ed essendo G abeliano si ha $H_1, H_2, H_3 \trianglelefteq G$ (e quindi i sottogruppi sono invarianti per automorfismi interni). Tuttavia nessuno dei sottogruppi è caratteristico, infatti possiamo prendere un automorfismo non banale (e quindi non uno interno) e vedere come i sottogruppi di questo tipo non siano invarianti:

$$f = \begin{cases} (\bar{1}, \bar{0}) \mapsto (\bar{1}, \bar{1}) \\ (\bar{0}, \bar{1}) \mapsto (\bar{0}, \bar{1}) \end{cases}$$

la definizione della mappa data tuttavia non è completa, perché abbiamo stabilito solo dove vengono mandati i generatori, dobbiamo definire cosa faccia un elemento generico:

$$f((\bar{a}, \bar{b})) = af((\bar{1}, \bar{0})) + bf((\bar{0}, \bar{1})) = (\bar{a}, \bar{a}) + (\bar{0}, \bar{b}) = (\bar{a}, \bar{a} + \bar{b})$$

a questo punto abbiamo definito completamente l'applicazione (rimarrebbe da verificare che f sia un omomorfismo), e si verifica facilmente che $f(H_1) = H_3$ quindi $H_1 \trianglelefteq G$, ma non caratteristico.

A questo punto è facile verificare che:

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong S_3$$

infatti, ogni automorfismo del gruppo si ottiene fissando l'elemento neutro $(\bar{0}, \bar{0}) \mapsto (\bar{0}, \bar{0})$, quindi il numero possibile di bigezioni è al più 3!, occorre verificare che tutte e 6 le funzioni sono omomorfismi. Dimostriamo invece che:

$$\boxed{\text{Aut}(S_3) \cong S_3}$$

Per farlo, poiché S_3 non è abeliano, possiamo osservare che:

$$\text{Inn}(S_3) \cong S_3 / Z(S_3) \cong S_3$$

in quanto l'unico elemento che commuta con tutti gli altri in S_3 è l'identità, quindi $Z(S_3) = \{id\} \cong \{e\}$. Per quanto detto si ha $\text{Inn}(S_3) \trianglelefteq \text{Aut}(S_3)$ e quindi $\text{Aut}(S_3)$ contiene una copia isomorfa di S_3 come sottogruppo normale, pertanto, se verifichiamo che $|\text{Aut}(S_3)| \leq 6$ abbiamo concluso. Sia $f \in \text{Aut}(S_3)$, f può al più scambiare i 3 elementi di ordine 2, d'altra parte, fissate le immagini di τ_1, τ_2, τ_3 ¹, i due 3-cicli² sono completamente determinati, ciò significa che si hanno al più 3! automorfismi, dunque:

$$\text{Aut}(S_3) = \text{Inn}(S_3) \cong S_3 \implies \text{Aut}(S_3) \cong S_3$$

¹Con τ_i si intendono le trasposizioni che lasciano fisso l'elemento i .

²Come si vedrà $S_3 = \langle \tau_1, \tau_2, \tau_3 \rangle$

§1.3 Azione di un gruppo su un insieme

Definizione 1.16. Sia G un gruppo e X un insieme, un'azione di G su X è un omomorfismo:

$$\varphi : G \longrightarrow S(X) : g \longmapsto \varphi_g$$

dove $\varphi_g : X \longrightarrow X : x \longmapsto \varphi_g(x)$ ³, con φ_g bigettiva, $\forall g \in G$. Si può definire un'azione anche come:

$$\varphi : G \times X \longrightarrow X : (g, x) \longmapsto \varphi_g(x)$$

Un'azione di G su X si indica con $G \curvearrowright X$.

Esempio 1.17

Sia $X = G$, quindi $\varphi : G \longrightarrow S(G) : g \longmapsto \varphi_g$, con φ_g coniugio, φ è un'azione. Come si è visto nell'(1) della [Proposizione 1.3](#) φ_g è un automorfismo di G (e quindi una bigezione), e φ è un omomorfismo. In questo caso si ha che:

$$\varphi_g(x) = gxg^{-1}$$

Esempio 1.18

Sia V un K -spazio vettoriale, sia:

$$\varphi : K^* \longrightarrow S(V) : \lambda \longmapsto \varphi_\lambda$$

con $\varphi_\lambda : V \longrightarrow V : v \longmapsto \lambda v$, φ è un'azione di K^* su V .

Sia $\varphi : G \longrightarrow S(X)$ un'azione, φ definisce una relazione di equivalenza su X :

$$x \sim y \iff \exists g \in G : \varphi_g(x) = y$$

ovvero due elementi sono in relazione se esiste un'applicazione $\varphi_g \in S(X)$, per cui un elemento è l'immagine dell'altro mediante tale applicazione. La relazione è appunto di equivalenza, infatti: $x \sim x$, per $g = e$ si ha (essendo φ un omomorfismo) $\varphi_e(x) = id(x) = x$, $x \sim y \implies y \sim x$:

$$\varphi_g(x) = y \implies x = (\varphi_g(y))^{-1} = \varphi_{g^{-1}}(y)$$

infine $x \sim y, y \sim z \implies x \sim z$, infatti si avrebbe: $\varphi_g(x) = y, \varphi_h(y) = z$ da cui:

$$z = \varphi_h(\varphi_g(x)) = \varphi_{hg}(x) \implies x \sim z$$

Definizione 1.19. Data la relazione di equivalenza \sim si definiscono **orbite** le classi di equivalenza di X rispetto alla relazione \sim :

$$\text{Orb}(x) = \{\varphi_g(x) | g \in G\} (\subseteq X)$$

Da cui:

$$X = \bigcup_{x \in \mathcal{R}} \text{Orb}(x)$$

Con \mathcal{R} insieme di rappresentanti. Un'orbita è quindi l'insieme di tutte le immagini di un elemento in un insieme, mediante tutte le possibili applicazioni (permutazioni) dell'insieme $\varphi(G)$.

³Alternativamente si può indicare l'immagine con $\varphi_g : x \longmapsto g * x$ dove il simbolo $*$ indica l'azione di g su x .

Definizione 1.20. Per ogni $x \in X$ si dice **stabilizzatore** di x :

$$\text{St}(x) = \{g \in G \mid \varphi_g(x) = x\}$$

Cioè lo stabilizzatore è l'insieme degli elementi di G , che danno origine mediante φ alle applicazioni $\varphi_g \in S(X)$, che lasciano fisso un determinato elemento.

Esempio 1.21

Se $X = \mathbb{R}^2$ e G è il gruppo di traslazioni di vettore $\underline{v} = (0, l)$, allora:

$$\varphi : G \longrightarrow S(X) : \tau_{(0,l)} \longmapsto \tau_{(0,l)}^a$$

con:

$$\text{Orb}(x, y) = \{(x, y + l) \mid l \in \mathbb{R}\} \quad \text{e} \quad \text{St}(x, y) = \{\tau_{(0,l)} \mid (x, y + l) = (x, y)\} = \{id\}$$

^aSi osserva che il primo $\tau_{(0,l)}$ è un elemento del gruppo G , mentre il secondo è un'applicazione bigettiva di X .

Esempio 1.22

Se $X = \mathbb{R}^2$ e G è il gruppo delle rotazioni di centro O , allora:

$$\varphi : G \longrightarrow S(\mathbb{R}^2) : r_\theta \longmapsto r_\theta$$

con:

$$\text{St}(x, y) = \begin{cases} \{id\} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ G & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

e, detta ω la circonferenza di centro O e raggio $\sqrt{x^2 + y^2}$:

$$\text{Orb}(x, y) = \{(x', y') \in \mathbb{R}^2 \mid (x', y') \in \omega\}$$

Proposizione 1.23 ($\text{St}(x) \leq G$)

Dato un gruppo G e un'azione $\varphi : G \longrightarrow S(X)$, si ha che $\text{St}(x) \leq G$.^a

^aIn generale lo stabilizzatore non è un sottogruppo normale.

Dimostrazione. Si osserva che $e \in \text{St}(x)$, in quanto $\varphi_e(x) = id(x) = x$, inoltre, presi $g, h \in \text{St}(x)$, ovvero $\varphi_g(x) = \varphi_h(x) = x$, allora:

$$\varphi(gh) = \varphi_{gh}(x) = \varphi_g \circ \varphi_h(x) = \varphi_g(\varphi_h(x)) = \varphi_g(x) = x \implies gh \in \text{St}(x)$$

dove si ha che $\varphi_{gh}(x) = \varphi_g \circ \varphi_h(x)$ in quanto φ è un omomorfismo. Infine, preso $g \in \text{St}(x)$, si ha $g^{-1} \in \text{St}(x)$, infatti φ_g è bigettiva e quindi ammette inversa:

$$(\varphi_g)^{-1} \circ \varphi_g(x) = x \implies (\varphi_g)^{-1}(\varphi_g(x)) = x \implies (\varphi_g)^{-1}(x) = x$$

con $(\varphi_g)^{-1}(x) = (\varphi(g))^{-1}(x) = (\varphi(g^{-1}))(x) = \varphi_{g^{-1}}(x)$ e per quanto detto:

$$\varphi_{g^{-1}}(x) = x \implies g^{-1} \in \text{St}(x)$$

□

Osservazione 1.24 — Sia $x \in X$ e $g, h \in G$, allora:

$$\varphi_g(x) = \varphi_h(x) \iff \varphi_{h^{-1}}(\varphi_g(x)) = x$$

e per le proprietà di omomorfismo dell'azione φ , si ha:

$$\varphi_{h^{-1}}(\varphi_g(x)) = x \iff \varphi_{h^{-1}g}(x) = x \iff h^{-1}g \in \text{St}(x)$$

ovvero $g \text{St}(x) = h \text{St}(x)$, in quanto $\text{St}(x) \leq G$ e la condizione ottenuta è esattamente quella dell'equivalenza modulo $\text{St}(x)$, quindi:

$$\text{Orb}(x) \longleftrightarrow \text{classi laterali di } \text{St}(x) \text{ in } G$$

cioè due elementi danno la stessa immagine se e solo se stanno nella stessa classe laterale modulo $\text{St}(x)$, e la corrispondenza biunivoca tra orbita e classi laterali è data da:

$$g \text{St}(x) \mapsto \varphi_g(x) \quad \text{e} \quad h \text{St}(x) \mapsto \varphi_h(x)$$

che è ben definita e per quanto detto all'inizio è iniettiva:

$$\varphi_g(x) = \varphi_h(x) \iff g \text{St}(x) = h \text{St}(x)$$

(quindi due elementi di un'orbita sono uguali se e solo se lo sono le classi laterali dei rispettivi elementi che generano le applicazioni sono uguali modulo $\text{St}(x)$, dunque per ogni elemento dell'orbita c'è una classe laterale di $\text{St}(x)$) e surgettiva:

$$\forall y \in \text{Orb}(x), y = \varphi_g(x) \implies g \text{St}(x) \mapsto y$$

e quindi concludiamo che il numero di classi laterali di $\text{St}(x)$ in G è lo stesso della cardinalità di $\text{Orb}(x)$.

Per quanto detto si ha:

$$|G| = |\text{St}(x)|[G : \text{St}(x)]$$

ma $[G : \text{St}(x)]$ è il numero di classi laterali di $\text{St}(x)$ in G , che è proprio uguale a $|\text{Orb}(x)|$ pertanto vale la seguente:

Proposizione 1.25

Sia G un gruppo finito e X un insieme, allora:

$$|G| = |\text{Orb}(x)| |\text{St}(x)| \quad \forall x \in X$$

Osservazione 1.26 — Si osserva che essendo $\text{St}(x) \leq G$, allora è ovvio (per Lagrange) che $|\text{St}(x)| \mid |G|$, tuttavia, per la proposizione precedente, si ha che: $|\text{Orb}(x)| \mid |G|$ con $\text{Orb}(x) \subseteq X$.

Ricordando che:

$$X = \bigcup_{x \in \mathcal{R}} \text{Orb}(x)$$

se $|X| < +\infty$ si ha:

$$|X| = \sum_{x \in \mathcal{R}} |\text{Orb}(x)| = \sum_{x \in \mathcal{R}} \frac{|G|}{|\text{St}(x)|}$$

§1.4 Azione di coniugio

Definizione 1.27. Si parla di **azione di coniugio**, quando si ha un'azione di G su G stesso:

$$\varphi : G \longrightarrow \text{Inn}(G)(\trianglelefteq S(G)) : g \longrightarrow \varphi_g$$

Abbiamo già osservato che è un'azione (ovvero che φ è un omomorfismo). In questo caso:

$$\text{Orb}(x) = \{\varphi_g(x) | g \in G\} = \{gxg^{-1} | g \in G\} = \mathcal{C}\ell_G(x)$$

dove $\mathcal{C}\ell_G(x)$ prende il nome di **classe di coniugio** di x . Mentre:

$$\text{St}(x) = \{g \in G | \varphi_g(x) = gxg^{-1} = x\} = Z_G(x)$$

dove $Z_G(x)$ si dice **centralizzatore** di x . Per quanto detto in precedenza si ha:

$$|G| = |\mathcal{C}\ell_G(x)| |Z_G(x)|$$

In particolare $|\mathcal{C}\ell_G(x)| \mid |G|$ e :

$$|G| = \sum_{x \in \mathcal{R}} |\mathcal{C}\ell_G(x)| = \sum_{x \in \mathcal{R}} \frac{|G|}{|Z_G(x)|}$$

Osservazione 1.28 — $\mathcal{C}\ell_G(x)$ è un sottoinsieme, non un sottogruppo di G , poiché non c'è mai l'identità.

Osservazione 1.29 — Osserviamo che $Z_G(x) = G \iff x \in Z(G)$, infatti la per un elemento del centro si ha che $\forall g \in G$ l'elemento commuta, e dunque il suo centralizzatore è tutto il gruppo.

Osservazione 1.30 — Per un'azione di coniugio ha che $x \in Z(G)$ se e solo se $\text{Orb}(x) = \{x\}$ (ovvero $\varphi_g(x) = x, \forall g \in G$).

$$|G| = \sum_{x \in Z(G)} \frac{|G|}{|Z_G(x)|} + \sum_{x \in \mathcal{R} \setminus Z(G)} \frac{|G|}{|Z_G(x)|}$$

ma, per quanto detto, se $x \in Z(G)$, allora $\frac{|G|}{|Z_G(x)|} = |\mathcal{C}\ell_G(x)| = \{x\}$, segue dunque la relazione:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{x \in \mathcal{R} \setminus Z(G)} \frac{|G|}{|Z_G(x)|}$$

che prende il nome di **formula delle classi** (di coniugio).

§1.5 Applicazioni ai p -gruppi

Definizione 1.31. Si definisce **p -gruppo** un gruppo di ordine p^n , con p primo e $n \geq 1$.

Se G è un p -gruppo la formula delle classi diventa:

$$p^n = |G| = |Z(G)| + \sum_{x \in \mathcal{R} \setminus Z(G)} \frac{|G|}{|Z_G(x)|}$$

con $|Z(G)| = p^z$, $0 \leq z \leq n$, facciamo due osservazioni fondamentali:

- (1) Il centro di un p -gruppo non è mai banale, infatti, se osserviamo la formula delle classi, si ha:

$$p^n = |Z(G)| + \sum_{x \in \mathcal{R} \setminus Z(G)} \frac{|G|}{|Z_G(x)|} \implies |Z(G)| + \sum_{x \in \mathcal{R} \setminus Z(G)} \frac{|G|}{|Z_G(x)|} \equiv 0 \pmod{p}$$

con $\frac{|G|}{|Z_G(x)|} > 1$, poiché se un elemento sta nel centro tutti gli addendi sono 1 per quanto detto, viceversa deve essere che $\frac{|G|}{|Z_G(x)|} = p^{k_x}$, $k > 0$, poiché G è un p -gruppo, dunque:

$$|Z(G)| \equiv 0 \pmod{p} \implies |Z(G)| \geq 2$$

e quindi il centro di un p -gruppo non è mai banale.

- (2) Un gruppo di ordine p^2 è abeliano, infatti, si ha:

$$|G| = p^2 \implies |Z(G)| = \begin{cases} 1 & \text{non può accadere per (1)} \\ p & \text{no perché allora } G/Z(G) \text{ ciclico, ma } G \text{ non è abeliano} \\ p^2 & \end{cases}$$

dunque l'unica possibilità è che $Z(G) = G \iff G$ abeliano.

§1.6 Teorema di Cauchy

Teorema 1.32 (Teorema di Cauchy)

Dato un gruppo G e un primo p , se $p \mid |G|$, allora $\exists x \in G : \text{ord}_G(x) = p$. ^a

^aSi considera già noto il teorema per gruppi abeliani.

Dimostrazione. Sia $|G| = pn$, procediamo per induzione su n , nel caso $n = 1$ il teorema è ovvio. Supponiamo vera la tesi per i gruppi di ordine pm , con $1 \leq m < n$ e proviamola per n . Distinguiamo due casi:

- Se esiste $H \leq G$ con $p \mid |H|$, ovvero $|H| = pm \implies$ vale il teorema di Cauchy per ipotesi induttiva (essendo $m < n$), quindi $\exists x \in H : \text{ord}_H(x) = p$, ma essendo $H \subset G \implies x \in G$ e quindi la tesi è vera.
- Se $\forall H \leq G$ si ha $p \nmid |H|$, allora si può applicare a G la formula delle classi:

$$pn = |G| = |Z(G)| + \sum_{x \in \mathcal{R} \setminus Z(G)} \frac{|G|}{|Z_G(x)|}$$

ricordando il centralizzatore di x è uno stabilizzatore (e quindi un sottogruppo di G), si ha $p \nmid |Z_G(x)|$, e quindi:

$$p \mid \sum_{x \in \mathcal{R} \setminus Z(G)} \frac{|G|}{|Z_G(x)|}$$

da cui segue che $p \mid |Z(G)| = |G| - \sum pl_x$, per quanto premesso ($\forall H \leq G$ si ha $p \nmid |H|$), ed essendo $Z(G) \leq G$, l'unica possibilità è che $Z(G) = G$ e vale il teorema poiché è già stato dimostrato per il caso in cui G è abeliano.

□

§1.7 Azione di coniugio su un sottogruppo

Sia $X = \{H \leq G\}$ e $\varphi : G \longrightarrow S(X) : g \longmapsto \varphi_g(X)$, con $\varphi_g : X \longrightarrow X : H \longmapsto gHg^{-1}$. Si verifica facilmente che φ è un omomorfismo; mostriamo invece che φ_g è una permutazione, per l'iniettività si osserva che:

$$\varphi_g(H) = \varphi_g(K) \iff gHg^{-1} = gKg^{-1} \iff H = K$$

mentre per la surgettività si ha che $\forall H \in X, \exists L \in X$:

$$\varphi_g(L) = H \iff gLg^{-1} = H \implies L = g^{-1}Hg$$

inoltre si ha anche:

$$\text{Orb}(H) = \{\varphi_g(H) | g \in G\} = \{gHg^{-1} | g \in G\} \quad \text{St}(H) = \{g \in G | \varphi_g(H) = H\} = N_G(H)$$

dove $\text{Orb}(H)$ è l'insieme dei coniugati di H , mentre $\text{St}(H) = N_G(H)$ prende il nome di **normalizzatore** di H .

Osservazione 1.33 — Si osserva che $H \trianglelefteq G$ se e solo se $\text{Orb}(H) = \{H\} \iff N_G(H) = G$, ovvero se H è sempre chiuso per coniugio in G .

Per quanto affermato nella [Proposizione 1.25](#) si ha:

$$|G| = |\text{Orb}(H)| |N_G(H)| \implies |\text{Orb}(H)| = \frac{|G|}{|N_G(H)|}$$

Osservazione 1.34 — Quindi in generale, dato $H \leq G$ si ha che $\#\{gH\} = [G : H]$ e $\#\{gHg^{-1}\} = [G : N_G(H)]$.

Osservazione 1.35 (Sulla definizione di sottogruppo normale) — I sottogruppi normali possono essere ridefiniti nella maniera seguente, $H \trianglelefteq G$ se e solo se:

$$H = \bigcup_{h \in H} C_h$$

cioè un sottogruppo è normale se e solo se è l'unione delle classi di coniugio dei suoi elementi. Infatti:

$$H \trianglelefteq G \iff ghg^{-1} \in H \quad \forall h \in H, \forall g \in G$$

che equivale a:

$$C_h = \{ghg^{-1} | h \in H\} \subseteq H \quad \forall h \in H \implies \bigcup_{h \in H} C_h \subseteq H$$

d'altra parte se H è normale è chiuso per coniugio, ovvero il coniugio di ogni suo elemento è ancora in H ($ghg^{-1} = h', \forall h \in H$) e in particolare ciò significa che:

$$H \subseteq \bigcup_{h \in H} C_h$$

§1.8 Teorema di Cayley

Teorema 1.36 (Teorema di Cayley)

Ogni gruppo è isomorfo ad un sottogruppo di un gruppo di permutazioni. In particolare, se $|G| = n$, allora G è isomorfo a un sottogruppo di S_n .

Dimostrazione. Definiamo la mappa:

$$\lambda : G \longrightarrow S(G) : g \longmapsto \varphi_g$$

con $\varphi_g : G \longrightarrow G : x \longmapsto gx$, l'applicazione λ prende il nome di **rappresentazione regolare a sinistra** di G , si vuole dimostrare che λ è un omomorfismo iniettivo. Osserviamo innanzitutto che λ è ben definita, cioè $\varphi_g \in S(G)$, infatti φ_g è iniettiva (segue dalle leggi di cancellazione) e surgettiva, perché $\forall y \in G, \exists g^{-1}y \in G : \varphi_g(g^{-1}y) = y$. Verifichiamo che λ è un omomorfismo:

$$\lambda(g_1g_2) = \varphi_{g_1g_2}$$

con $\varphi_{g_1g_2}(x) = \varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2}(x)$, $\forall x \in G$, e quindi:

$$\lambda(g_1g_2) = \lambda(g_1)\lambda(g_2) \quad \forall g_1, g_2 \in G$$

infine, per l'injectività si ha che:

$$\ker \lambda = \{g \in G \mid \lambda(g) = \varphi_g = id = \varphi_e\} = \{e\}$$

da ciò segue che $G \cong \text{Im}(\lambda) \leq S(G)$, e se $|G| = n$ si ha che $\text{Im}(\lambda) \leq S_n$. \square

Osservazione 1.37 — In generale, dato $G = \{g_1 = e, g_2, \dots, g_n\}$ e $\lambda : G \longrightarrow S(G) \cong S_n$, si ha che:

$$g_1 = e \longmapsto \lambda_{g_1} \quad \text{con} \quad \lambda_{g_1} : G \longrightarrow G : g_i \longmapsto g_i$$

$$g_2 \longmapsto \lambda_{g_2} \quad \text{con} \quad \lambda_{g_2} : G \longrightarrow G : x \longmapsto g_2x \longmapsto g_2^2x \longmapsto \dots \longmapsto g_2^{k-1}x$$

con $k = \text{ord}_G(g_2)$. λ_{g_2} può essere rappresentata mediante la notazione dei cicli:

$$(x, g_2x, \dots, g_2^{k-1}x)$$

preso poi $y \notin \lambda_{g_2}(G)$, si ha analogamente:

$$(y, g_2y, \dots, g_2^{k-1}y)$$

Esempio 1.38

Nel caso in cui $G = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ consideriamo l'azione:

$$\lambda : G \longrightarrow S(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}) \cong S_8^a : \bar{a} \longmapsto \lambda_a$$

che, per quanto visto genera ad esempio le applicazioni:^b

$$\begin{aligned} 1 &\longmapsto \lambda_1 : X \longrightarrow X : a \longmapsto 1 + a \implies (0, 1, \dots, 7) \\ 2 &\longmapsto \lambda_2 : X \longrightarrow X : a \longmapsto 2 + a \implies (0, 2, 4, 6)(1, 3, 5, 7) \\ 4 &\longmapsto \lambda_4 : X \longrightarrow X : a \longmapsto 4 + a \implies (0, 4)(1, 5)(2, 6)(3, 7) \end{aligned}$$

che permutano gli elementi di X secondo i cicli trovati.

^aPerché appunto $S(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})$ è l'insieme di permutazioni di un insieme di 8 elementi.

^bPer $+$ si intende la somma modulo 8.

Definizione 1.39. Un'azione λ si dice **fedele** se è iniettiva.

Ad esempio l'azione di rappresentazione regolare a sinistra è fedele:

$$\ker \lambda = \{g \in G | \lambda(g) = id\} = \{g \in G | \lambda_g(e) = e\} = \{g \in G | ge = e\} = \{e\}$$

da cui λ fedele.

Osservazione 1.40 — Esiste anche un'applicazione $\rho : G \longrightarrow S(G) (\cong S_n)$, ($n = |G|$), detta azione di **rappresentazione regolare a destra**, con:

$$g \longmapsto \rho_g : x \longmapsto xg^{-1}$$

Lemma 1.41 (Lemma di Ranieri)

Sia G un gruppo abeliano di ordine n , allora $\forall d \mid n, \exists H \leq G : |H| = d$.^{ab}

^aIl nome ovviamente non è ufficiale, ma deriva da un curioso aneddoto in cui è coinvolto il buon Davide Ranieri, pertanto vi consiglio di citarlo con questo nome in contesti ufficiali, ma se volete farlo comunque è a vostro rischio e pericolo :)

^bLa dimostrazione non è stata fatta durante il corso, ma è stata comunque aggiunta per completezza.

Dimostrazione. Si consideri innanzitutto il caso $d = p^k$, p primo, e mostriamolo per induzione: per $k = 1$ la tesi è equivalente al **Teorema di Cauchy** (anche solo per i gruppi abeliani). Supponiamo la tesi per $k - 1$. Poiché in particolare $p \mid |G|$ scegliamo un sottogruppo H di G di ordine p ; tale sottogruppo è normale poiché G è abeliano. $p^{k-1} \mid |G/H| \implies$ per ipotesi induttiva $\exists K \leq G/H, |K| = p^{k-1}$.

Prendendo la controimmagine di K tramite la proiezione al quoziente troviamo il sottogruppo di G cercato. A questo punto possiamo scrivere in generale $d = p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}$; per ogni i troviamo sottogruppi H_i di ordini $p_i^{k_i}$ (tutti normali). Si ha quindi che $H_1 H_2 \leq G$ per normalità, inoltre $|H_1 \cap H_2| = 1$ poiché l'ordine di un elemento in tale intersezione deve dividere $(p_1^{k_1}, p_2^{k_2}) = 1$. Pertanto $|H_1 H_2| = p_1^{k_1} p_2^{k_2}$. Ragionando per induzione otteniamo che il sottogruppo $H_1 \dots H_k$ ha ordine d come voluto. \square

Esercizio 1.42. Sia G un gruppo, se $|G| = p^n$, allora esiste:

$$\{e\} = H_n < H_{n-1} < \dots < H_1 < G$$

con $H_i \trianglelefteq G$ e $|H_i| = p^{n-i}$, $\forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Soluzione. Procediamo per induzione su n , per $n = 1$ è ovvio, infatti si ha $H_1 = \{e\} \trianglelefteq G$. Supponiamo la tesi vera $\forall 1 \leq k \leq n-1$, osserviamo che G è un p -gruppo, pertanto il suo centro non è banale:

$$|Z(G)| = p^z \quad z \geq 1$$

sia $\mathcal{G} = G/Z(G)$, essendo $|G/Z(G)| < p^n$ (perché deve essere $|Z(G)| \geq p$), allora vale l'ipotesi induttiva, dunque $|\mathcal{G}| = p^m$, con $m = n - z (< n)$, allora esiste:

$$\mathcal{H}_m = \{e_{\mathcal{G}}\} < \mathcal{H}_{m-1} < \dots < \mathcal{H}_1 < \mathcal{G}$$

con $|\mathcal{H}_i| = p^{m-i}$ e $\mathcal{H}_i \trianglelefteq \mathcal{G}$. Data la proiezione al quoziente:

$$\pi_{Z(G)} : G \longrightarrow \mathcal{G}$$

per il Teorema di Corrispondenza dei sottogruppi, esiste una bigezione tra i sottogruppi di $G/Z(G)$ e i sottogruppi di G che contengono $Z(G)$, la quale preserva normalità e indice del sottogruppo, pertanto preso $\mathcal{H}_i \leq G/Z(G)$ è sufficiente applicare $\pi_{Z(G)}^{-1}$ alla catena scritta sopra e troviamo:

$$Z(G) = \pi_{Z(G)}^{-1}(\mathcal{H}_m) < \dots < \pi_{Z(G)}^{-1}(\mathcal{H}_1) < \pi_{Z(G)}^{-1}(\mathcal{G}) (= G)$$

Segue per il teorema di corrispondenza che $\pi_{Z(G)}^{-1}(\mathcal{H}_i) = H_i \trianglelefteq G$, ovvero si preserva la normalità dei sottogruppi, inoltre, segue sempre dal teorema che:

$$p^i = [\mathcal{G} : \mathcal{H}_i] = [G : H_i] = p^i$$

dunque la catena esiste e $|H_i| = p^{n-i}$ per $1 \leq i \leq m$. Essendo $Z(G)$ abeliano, i sottogruppi di ogni suo ordine (che esistono sempre per il [Lemma Di Ranieri](#)) sono normali in $Z(G)$, inoltre $|Z(G)| = p^z$ (dunque si hanno sottogruppi normali di ordine p^l per $l \mid z$), pertanto esiste la catena:

$$\{e\} = H_n < \dots < H_m = Z(G) \quad \text{con } |H_j| = p^{n-j}, \forall m \leq j \leq n$$

Bisogna infine verificare che $H_j \trianglelefteq G$, dunque:

$$gH_jg^{-1} = H_j \quad \forall g \in G$$

ma $H_j \subset Z(G)$ (sta nel centro, quindi è invariante per coniugio con tutti i $g \in G$, e in particolare quelli richiesti) dunque è sempre verificata l'ultima uguaglianza. \square

§1.9 Permutazioni

Ricordiamo brevemente che:

Definizione 1.43. Dato un insieme X si definisce **permutazione** un'applicazione bigettiva di X in se stesso.

Indichiamo con $S(X)$ il gruppo delle permutazioni di X e con S_n il gruppo delle permutazioni di un insieme di cardinalità n , che per semplicità indichiamo con $\{1, \dots, n\}$. Le permutazioni si possono indicare in vari modi, ad esempio, preso $\sigma \in S_{12}$ si può rappresentare mediante la matrice di permutazione:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 3 & 2 & 4 & 5 & 1 & 9 & 8 & 7 & 6 & 12 & 11 & 10 \end{pmatrix}$$

o anche con la notazione dei cicli:

$$\sigma = (1\ 3\ 4\ 5)(6\ 9)(7\ 8)(10\ 12)$$

ogni ciclo prende il nome di **k -ciclo** (dove k indica la sua lunghezza), come si osserva i cicli di lunghezza 1 sono stati omessi, in quanto lasciano fissi gli elementi, inoltre, i 2-cicli prendono il nome di **trasposizioni**. Formalmente, sia $\sigma \in S_n$ una permutazione di un insieme di n elementi, possiamo considerare l'insieme X , con $|X| = n$, il gruppo $G = \langle \sigma \rangle$ e definire l'azione:

$$\varphi : G = \langle \sigma \rangle \longrightarrow S(X) \cong S_n : \sigma \longmapsto \sigma$$

con $\sigma \in S_n$ e $\sigma : i \longmapsto \sigma(i)$. Osserviamo quindi che:

$$\text{Orb}(x) = \{\sigma(x) | \sigma \in \langle \sigma \rangle\} = \{\sigma^l(x) | l \in \mathbb{N}\} = \{x, \sigma(x), \sigma^2(x), \dots, \sigma^{m-1}(x)\}$$

con $|\text{Orb}(x)| = m_x$, con $m_x = \min\{k > 0 | \sigma^k(x) = x\}$, perché se $\sigma^k(x) = x$, allora $\sigma^{k+1}(x) = \sigma(x)$, pertanto, sia $k \in \mathbb{N}$ tale che $\sigma^k(x) \in \{x, \dots, \sigma^{k-1}(x)\}$, allora $\exists h :$

$$\sigma^k(x) = \sigma^h(x) \quad \text{con } 0 \leq h < k$$

Dunque vale che $\sigma^{k-h}(x) = x \in \{x, \dots, \sigma^{k-1}(x)\}$ e per la minimalità di k si ha che $h = 0$. L'azione di $\langle \sigma \rangle$ su X divide X in orbite e su ogni orbita σ agisce ciclicamente (ovvero $\sigma(\text{Orb}(x)) = \text{Orb}(x)$).

Definizione 1.44. Si dice **ciclo** di $\sigma \in S_n$ l'orbita di un elemento $x \in \{1, \dots, n\}$ vista come insieme ordinato:

$$(x, \sigma(x), \dots, \sigma^{m_x-1}(x))$$

Osservazione 1.45 — Un ciclo di lunghezza k (un k -ciclo) ha k scritte distinte, in quanto possiamo scegliere arbitrariamente il primo elemento.

Osservazione 1.46 — Data $\sigma \in S_n$, essa è determinata dalle immagini di $\{1, \dots, n\}$, dunque è determinata dai suoi cicli.

Esempio 1.47

Presa ad esempio $\sigma \in S_{10}$:

$$\sigma = (1\ 2\ 3)(4\ 5)(6\ 7\ 8\ 9)$$

chiamiamo i suoi cicli:

$$\sigma_1 = (1\ 2\ 3) \quad \sigma_2 = (4\ 5) \quad \sigma_3 = (6\ 7\ 8\ 9)$$

dove appunto $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \in S_{10}$ e:

$$\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \sigma_3$$

Definizione 1.48. Una permutazione si dice **ciclica** se ha un unico ciclo (orbita) non banale. ⁴

Osservazione 1.49 — Si osserva che:

- Cicli disgiunti commutano.
- L'ordine di una permutazione ciclica è la lunghezza del suo ciclo:

$$\sigma = (x_1, \dots, x_k) \implies \text{ord } \sigma = k$$

quindi $\sigma^k = id$ e se $d < k$, allora $\sigma^d(x_1) = x_{d+1} \neq x_1$.

Proposizione 1.50 (Struttura Delle Permutazioni)

Ogni permutazione si scrive in modo unico (a meno dell'ordine e della scrittura di cicli) come prodotto di cicli disgiunti, ovvero come composizione di permutazioni cicliche che agiscono su insiemi disgiunti.

Dimostrazione. I cicli della permutazione sono univocamente determinati in quanto orbite della permutazione, sappiamo che ogni permutazione si scrive come prodotto dei suoi cicli, e per concludere basta osservare che i cicli disgiunti commutano. \square

Osservazione 1.51 — Si osserva che l'unicità della scrittura di una permutazione vista nella [Proposizione 1.50](#) è effettivamente valida solo nel caso di cicli disgiunti, infatti, prendendo ad esempio:

$$\sigma = (1\ 2)(2\ 4) \in S_4 \quad \text{con} \quad \sigma_1 = (2\ 4) \quad \text{e} \quad \sigma_2 = (1\ 2)$$

non essendo σ_1, σ_2 cicli disgiunti, si osserva che $\sigma_2 \circ \sigma_1 = (2\ 4\ 1)$ e quindi σ era in realtà un 3-ciclo, e la sua fattorizzazione è unica come tale (mentre non era unica come prodotto di cicli non disgiunti).

⁴D'ora in avanti si utilizzeranno i termini "permutazione ciclica" e "ciclo" come sinonimi, in quanto una permutazione ciclica è appunto un singolo ciclo non banale.

Corollario 1.52

S_n è generato dalle permutazioni cicliche.

Dimostrazione. Segue immediatamente dal fatto che ogni permutazione si ottiene mediante composizione di permutazioni cicliche. \square

Esempio 1.53

Per esempio, preso S_4 , le permutazioni possibili sono cicli del tipo:

$$id \quad (a \ b) \quad (a \ b \ c) \quad (a \ b \ c \ d) \quad (a \ b)(c \ d)$$

per contare il numero di 2-cicli, ci basta scegliere 2 elementi dell'insieme in $\binom{4}{2}$ modi e poi considerare tutti i possibili riordinamenti ciclici (dove la scelta del primo elemento è arbitraria), e ciò può essere fatto in $\frac{2!}{2}$ modi, per un totale di:

$$\binom{4}{2} \frac{2!}{2} = 6$$

e ragionando analogamente per i 3-cicli e i 4-cicli si ottiene:

$$\binom{4}{3} \frac{3!}{3} = 8 \quad \text{e} \quad \binom{4}{4} \frac{4!}{4} = 6$$

infine, per quanto riguarda le permutazioni ottenute dalla composizione di due 2-cicli, possiamo scegliere e permutare due coppie di elementi, come nei casi precedenti, tuttavia, essendo i cicli disgiunti commutano (banalmente perché lasciano fissi gli altri elementi del dominio), quindi bisogna anche dividere per il numero di scambi per i cicli della stessa lunghezza, ovvero $2!$ dunque:

$$\binom{4}{2} \frac{2!}{2} \binom{2}{2} \frac{2!}{2} \cdot \frac{1}{2!} = 3$$

e dal conteggio delle permutazioni di S_4 divise per cicli di diversa lunghezza si ottiene: $6 + 8 + 6 + 3 + 1 = 24 = |S_4|$.

Osservazione 1.54 — Quanto visto nell'esempio precedente può essere generalizzato ottenendo:

$$\#\{\sigma \in S_n | \sigma \text{ è un } k\text{-ciclo}\} = \binom{n}{k} \frac{k!}{k} = \binom{n}{k} (k-1)!$$

Esempio 1.55

Per quanto detto risulta semplice ad esempio calcolare:

$$\#\{\sigma \in S_{20} \mid \sigma \text{ si fattorizza in cicli del tipo } 2 + 2 + 2 + 4 + 5 + 5\}$$

applicando quanto detto nell'osservazione precedente si trovano:

$$\frac{\binom{20}{2}\binom{18}{2}\binom{16}{2}1!1!1!}{3!} \cdot \binom{14}{4}3! \cdot \frac{\binom{10}{5}\binom{5}{5}4!4!}{2!}$$

Proposizione 1.56 (Ordine Di Una Permutazione)

Data $\sigma \in S_n$ con $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_k$, con σ_i cicli disgiunti, allora:

$$\text{ord } \sigma = [\text{ord } \sigma_1, \dots, \text{ord } \sigma_k]$$

Dimostrazione. Sia σ_i un l_i -ciclo, ovvero $\text{ord } \sigma_i = l_i$, vogliamo dimostrare che:

$$\text{ord } \sigma = [l_1, \dots, l_k] = d$$

osserviamo che $\sigma^d = (\sigma_1 \dots \sigma_k)^d = \sigma_1^d \dots \sigma_k^d$, in quanto i cicli σ_i sono disgiunti (pertanto commutano), essendo $d = [l_1, \dots, l_k] \implies d \mid l_i, \forall i \in \{1, \dots, k\}$, pertanto:

$$\sigma^d = \sigma_1^d \dots \sigma_k^d = id \implies \text{ord } \sigma = m \mid d$$

d'altra parte, si ha che:

$$\sigma^m = \sigma_1^m \dots \sigma_k^m = id \iff \sigma_i = id, \forall i \in \{1, \dots, k\}$$

dunque $\text{ord } \sigma_i = l_i \mid m, \forall i \in \{1, \dots, k\}$, ovvero $[l_1, \dots, l_k] \mid m$ da cui si conclude che $m = [l_1, \dots, l_k]$. \square

Proposizione 1.57

Le trasposizioni generano $S_n, \forall n \geq 2$.

Dimostrazione. Per dimostrare l'affermazione bisogna mostrare che ogni permutazione è prodotto di trasposizioni (in generale non disgiunte). Poiché ogni permutazione, per quanto affermato nella [Proposizione 1.50](#), è il prodotto di cicli (permutazioni cicliche) disgiunti, è sufficiente mostrare che i cicli sono tutti prodotto di trasposizioni, infatti si può osservare che:

$$(1 \dots k) = (1 \ k)(1 \ k-1) \dots (1 \ 2)$$

dove l'uguaglianza è tra funzioni, quindi ci basta mostrare che danno la stessa immagine. Se $i > k$, allora entrambe le funzioni mandano $i \mapsto i$, se $i \leq k$, allora la funzione a sinistra manda $i \mapsto i+1$ e $k \mapsto 1$, quella a destra lascia fisso i fino al ciclo $(1 \ i)$ che manda $i \mapsto 1 \mapsto i+1$ che rimane fisso in $i+1$, mentre $k \mapsto \dots \mapsto 1$. \square

Osservazione 1.58 — La scrittura di una permutazione come prodotto di trasposizioni non è unica. Ad esempio in S_4 :

$$\sigma = (1\ 2)(2\ 4) = (1\ 2)(3\ 4)(3\ 4)(2\ 4)$$

La seguente proposizione ci mostra invece che è fissata la parità della decomposizione in trasposizioni, cioè se σ si compone come prodotto di m trasposizioni, ogni altra decomposizione come prodotto di trasposizioni ha un numero di trasposizioni con la stessa parità.

Proposizione 1.59

L'applicazione:

$$\text{sgn} : S_n \longrightarrow \{\pm 1\} : \sigma \longmapsto \text{sgn}(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$$

è un omomorfismo di gruppi. Inoltre, se σ è una trasposizione, allora $\text{sgn}(\sigma) = -1$.

Dimostrazione. Osserviamo inizialmente che sgn è ben definita cioè:

$$\text{sgn}(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j} \in \{\pm 1\}$$

al denominatore del prodotto vi sono tutte le possibili coppie $i - j$ (in $\{1, \dots, n\}$) e anche al numeratore poiché σ è bigettiva, l'unica cosa che può cambiare è l'ordine (ovvero potrebbe comparire $i - j$ al numeratore e $j - i$ al denominatore), quindi $\text{sgn}(\sigma) \in \{\pm 1\}$. Mostriamo che sgn è un omomorfismo:

$$\text{sgn}(\sigma \circ \tau) = \prod_{i < j} \frac{\sigma(\tau(i)) - \sigma(\tau(j))}{i - j} = \prod_{i < j} \frac{\sigma(\tau(i)) - \sigma(\tau(j))}{i - j} \frac{\tau(i) - \tau(j)}{\tau(i) - \tau(j)}$$

da cui:

$$\prod_{i < j} \frac{\sigma(\tau(i)) - \sigma(\tau(j))}{\tau(i) - \tau(j)} \frac{\tau(i) - \tau(j)}{i - j} = \underbrace{\prod_{i < j} \frac{\sigma(\tau(i)) - \sigma(\tau(j))}{\tau(i) - \tau(j)}}_{\text{sgn}(\sigma)} \underbrace{\prod_{i < j} \frac{\tau(i) - \tau(j)}{i - j}}_{\text{sgn}(\tau)} \quad \forall \sigma, \tau \in S_n$$

Ci resta da verificare che il segno di una trasposizione è -1 . Sia $\sigma = (a\ b)$, analizziamo il segno delle varie coppie, distinguiamo le seguenti possibilità:

- $\{i, j\} \cap \{a, b\} = \emptyset$, in tal caso σ lascia fissi gli elementi, $\sigma(i) = i, \sigma(j) = j \implies \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j} = 1$.
- $\{i, a\}$ (o $\{i, b\}$), in tal caso $\frac{\sigma(i) - \sigma(a)}{i - a} = \frac{i - b}{i - a}$, però vi è anche $\frac{\sigma(i) - \sigma(b)}{i - b} = \frac{i - a}{i - b}$ e quindi il fattore dà 1.
- Infine, nel caso in cui $\{i, j\} = \{a, b\}$ si ha:

$$\frac{\sigma(a) - \sigma(b)}{a - b} = \frac{b - a}{a - b} = -1$$

Dunque si conclude che $\text{sgn}((a\ b)) = -1$. □

Osservazione 1.60 — La proposizione appena vista dimostra quanto detto sopra, ovvero:

$$\sigma = \tau_1 \dots \tau_m \quad \text{con } \tau_i \text{ trasposizione}$$

allora $\text{sgn}(\sigma) = \prod_{1 \leq i \leq m} \text{sgn}(\tau_i) = (-1)^m$.

Definizione 1.61. Una permutazione $\sigma \in S_n$ si dice **pari** se $\text{sgn}(\sigma) = 1$, **dispari** se $\text{sgn}(\sigma) = -1$.

Definizione 1.62. Dato l'omomorfismo $\text{sgn} : S_n \longrightarrow \{\pm 1\}$, si definisce **gruppo alterno**:

$$\mathcal{A}_n = \ker \text{sgn} = \{\sigma \in S_n \mid \sigma \text{ è pari}\}$$

Osservazione 1.63 — Si osserva che $\mathcal{A}_n \trianglelefteq S_n$ e $|\mathcal{A}_n| = \frac{n!}{2}$ poiché $S_n/\mathcal{A}_n \cong \{\pm 1\}$.

Osservazione 1.64 — Per quanto detto nella [Proposizione 1.57](#), un k -ciclo si può scrivere nella forma:

$$(1 \dots k) = \underbrace{(1 \ k)(1 \ k-1) \dots (1 \ 2)}_{k-1 \text{ trasposizioni}}$$

dunque un k -ciclo è pari se $k \equiv 1 \pmod{2}$, dispari se $k \equiv 0 \pmod{2}$.

§1.10 Classi di coniugio in S_n

Teorema 1.65

Due permutazioni in S_n sono coniugate se e solo se hanno la stessa decomposizione in cicli disgiunti.

Dimostrazione. Mostriamo le due implicazioni:

- Presa $\sigma = (a_1 \dots a_k)$ e $\tau \in S_n$, vogliamo dimostrare che $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}$ è ancora un k -ciclo. Sia $\tau(a_i) = b_i$, allora $\tau \sigma \tau^{-1} = (b_1 \dots b_k)$, con $b_i \neq b_j, \forall i \neq j$, poiché τ è bigettiva; verifichiamo l'uguaglianza mostrando che le due funzioni coincidono per tutti gli elementi. Si osserva che nel ciclo a destra accade semplicemente che $b_i \mapsto b_{i+1}$, a sinistra invece:

$$b_i \xrightarrow{\tau^{-1}} a_i \xrightarrow{\sigma} a_{i+1} \xrightarrow{\tau} b_{i+1} \quad \forall i \in \{1, \dots, k\}$$

Se, invece, $x \neq b_i$, a sinistra si ha $\tau \sigma \tau^{-1}(x)$ (cioè poiché non si parte da alcun b_i),
 $\neq a_1, \dots, a_k$
 quindi $\sigma(\tau^{-1}(x)) = \tau^{-1}(x)$, e quindi $\tau \circ \tau^{-1}(x) = x$; a destra invece, non essendo x alcun b_i viene lasciato fisso, ciò conclude che le due funzioni sono uguali e che quella a sinistra è quindi un k -ciclo.

- Mostriamo ora che due permutazioni con la stessa fattorizzazione in cicli disgiunti sono coniugate. Siano:

$$\sigma = (a_1 \dots a_l)(b_1 \dots b_s) \dots (z_1 \dots z_t)$$

$$\rho = (a'_1 \dots a'_l)(b'_1 \dots b'_s) \dots (z'_1 \dots z'_t)$$

per dimostrare la tesi è sufficiente trovare $\tau \in S_n$ tale che $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = \rho$. Scegliamo τ definita da:

$$\tau(a_i) = a'_i, \tau(b_i) = b'_i, \dots, \tau(z_i) = z'_i$$

ed eventualmente si aggiungono altri elementi. Verifichiamo allora che $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = \rho$, consideriamo (WLOG) il primo ciclo:

$$a'_i \xrightarrow{\tau^{-1}} a_i \xrightarrow{\sigma} a_{i+1} \xrightarrow{\tau} a'_{i+1}$$

e quindi $a'_i \mapsto a'_{i+1}$, pertanto $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}$ e ρ coincidono sempre.

□

Esempio 1.66

In S_5 le classi di coniugio di $\sigma = (1\ 2)(3\ 4)$ sono $C_\sigma = \{(a\ b)(c\ d) \in S_5\}$, con:

$$\#C_\sigma = \frac{\binom{5}{2}\binom{3}{2}1!1!}{2!} = 15$$

e da ciò si ricava anche che:

$$\#Z_{S_5}(\sigma) = \frac{|S_5|}{|C_\sigma|} = \frac{5!}{15} = 8$$

Esempio 1.67

Sia $\sigma = (3\ 5)(14) \in S_5$ e sia $\rho = (1\ 2)(3\ 4)$, cerchiamo $\tau \in S_5$ tale che:

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = \rho$$

si può scegliere $\tau = (1\ 3)(2\ 5)$, da cui:

$$(1\ 3)(2\ 5)(3\ 5)(14)(1\ 3)(2\ 5) = (1\ 2)(3\ 4) = \rho$$

Corollario 1.68

Valgono i seguenti fatti:

- (1) Il numero di classi di coniugio in S_n è uguale al numero di partizioni di n .
- (2) Se $H \leq S_n$, allora $H \trianglelefteq S_n$ se e solo se contiene tutte le permutazioni di un certo tipo o nessuna.

§1.11 Prodotto diretto

Ricordiamo brevemente che se G_1 e G_2 sono gruppi, allora l'insieme $G_1 \times G_2$ con l'operazione fatta componente per componente prende il nome di **prodotto diretto**.

Esempio 1.69

Presi ad esempio $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ e S_4 , si ha $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times S_4$, con $\sigma = (\bar{1}, (1\ 2\ 3))$ e $\rho = (\bar{4}, (1\ 4\ 2\ 4))$ in $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times S_4$ e l'operazione:

$$\sigma \cdot \rho = (\bar{1} + \bar{4}, (1\ 2\ 3) \circ (1\ 4\ 2\ 3)) = (\bar{5}, (1\ 4\ 3\ 2))$$

Osservazione 1.70 — Si ricordano i seguenti fatti:

- Se $H, K \leq G$ in generale HK non è un sottogruppo, ma $HK \leq G \iff HK = KH$. Ovviamente se uno tra H e K è normale in G , allora questo è sempre vero.
- $H \times K \leq G \times G$.

Lemma 1.71

Siano $H, K \leq G$ e $H \cap K = \{e\}$, allora $hk = kh, \forall h \in H, \forall k \in K$.

Dimostrazione. Preso $hkh^{-1}k^{-1}$, si ha:

$$hkh^{-1}k^{-1} = \underbrace{(hkh^{-1})}_{\substack{=k' \\ \in K}} k^{-1} = h \underbrace{(kh^{-1}k^{-1})}_{\substack{=h' \\ \in H}}$$

dunque $hkh^{-1}k^{-1} \in H \cap K \implies hkh^{-1}k^{-1} = e$, da cui segue la tesi. \square

Teorema 1.72 (Decomposizione in prodotto diretto)

Sia G un gruppo e siano $H, K \leq G$ tali che:

- (1) $HK = G$.
- (2) $H \cap K = \{e\}$.

Allora $G \cong H \times K$.

Dimostrazione. Definiamo l'applicazione:

$$\varphi : H \times K \longrightarrow G : (h, k) \mapsto hk$$

Si verifica che è un omomorfismo:

$$\varphi((h_1, k_1)(h_2, k_2)) = \varphi((h_1h_2, k_1k_2)) = h_1h_2k_1k_2$$

per il Lemma 1.71 si ha che $h_1h_2k_1k_2 = h_1k_1h_2k_2 = \varphi((h_1, k_1))\varphi((h_2, k_2)), \forall h_1, h_2 \in H, \forall k_1, k_2 \in K$. Si osserva ora che φ è surgettiva, per l'ipotesi (1); infine, è iniettiva in quanto:

$$\ker \varphi = \{(h, k) \in H \times K | hk = e\} = \{(h, k) \in H \times K | h = k^{-1}\} = \{e\}$$

dove nell'ultima uguaglianza si è usato il fatto che $H \cap K = \{e\}$. □

Osservazione 1.73 — Se abbiamo due sottogruppi G_1 e G_2 e costruiamo $G = G_1 \times G_2$, allora presi:

$$H = G_1 \times \{e_2\} \trianglelefteq G \quad \text{e} \quad K = \{e_1\} \times G_2 \trianglelefteq G$$

H, K sono normali, hanno intersezione banale e sono tali che $HK = G$, quindi verifichiamo le ipotesi del teorema, pertanto $G \cong H \times K$.

Esempio 1.74

Sia G un gruppo con $|G| = p^2$, dalla formula delle classi avevamo ottenuto che G è necessariamente abeliano, quindi G è isomorfo a $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Se G è ciclico, allora $G \cong \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$. Mostriamo che se non lo è, allora $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ e in questo caso tutti gli elementi di G hanno ordine p .

Consideriamo $(e \neq)x \in G$ e $H = \langle x \rangle \trianglelefteq G$ (in quanto G abeliano); prendiamo $y \in G \setminus \langle x \rangle$ e analogamente $K = \langle y \rangle \trianglelefteq G$, da ciò segue che $H \cap K = \{e\}$, infatti H e K sono sottogruppi ciclici di G di ordine p e quindi hanno in comune solo l'elemento neutro. Osservando infine che $HK = G$, per cardinalità:

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|} = \frac{p \cdot p}{1} = p^2$$

le ipotesi del [Teorema 1.72](#) sono verificate, dunque:

$$G \cong H \times K \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

§1.12 Prodotto semidiretto

Definizione 1.75. Dati due gruppi H, K e l'azione:

$$\varphi : K \longrightarrow \text{Aut}(H) (\leq S(H)) : k \longmapsto \varphi_k$$

si dice **prodotto semidiretto** di H e K via φ :

$$H \rtimes_{\varphi} K$$

(o anche $K_{\varphi} \ltimes H$) l'insieme ottenuto come prodotto cartesiano $H \times K$ con l'operazione definita da:

$$(h, k)(h', k') = (h \cdot_H \varphi_k(h'), k \cdot_K k')$$

Proposizione 1.76 (Il Prodotto Semidiretto è un gruppo)

Dati due gruppi H, K , allora $H \rtimes_{\varphi} K$ è un gruppo.

Dimostrazione. Come si verifica facilmente l'operazione indotta dal prodotto semidiretto è associativa, verifichiamo che (e_H, e_K) è l'elemento neutro:

$$(h, k)(e_H, e_K) = (h \cdot \varphi_k(e_H), ke_K) = (he_H, k) = (h, k)$$

dove $\varphi_k(e_H) = e_H$ poiché φ_k è un automorfismo (e quindi in particolare un omomorfismo), a sinistra, invece, si ha:

$$(e_H, e_K)(h, k) = (e_H \cdot \varphi_{e_K}(h), e_K k) = (e_H \cdot id(h), k) = (e_H h, k) = (h, k)$$

Per l'inverso si osserva:

$$(h, k)^{-1} = ((\varphi_k)^{-1}(h^{-1}), k^{-1}) = (\varphi_{k^{-1}}(h^{-1}), k^{-1})^5$$

dunque si verifica a destra:

$$\begin{aligned} (h, k)(\varphi_{k^{-1}}(h^{-1}), k^{-1}) &= (h \cdot \varphi_k(\varphi_{k^{-1}}(h^{-1})), kk^{-1}) = \\ &= (h \cdot id(h^{-1}), e_K) = (hh^{-1}, e_K) = (e_H, e_K) \end{aligned}$$

e analogamente a sinistra:

$$\begin{aligned} (\varphi_{k^{-1}}(h^{-1}), k^{-1})(h, k) &= (\varphi_{k^{-1}}(h^{-1}) \cdot \varphi_{k^{-1}}(h), k^{-1}k) = \\ &= (\varphi_{k^{-1}}(h^{-1}h), e_K) = (\varphi_{k^{-1}}(e_H), e_K) = (e_H, e_K) \end{aligned}$$

□

⁵L'uguaglianza $(\varphi_k)^{-1} = \varphi_{k^{-1}}$ segue dal fatto che φ è un omomorfismo e quindi manda inversi in inversi.

Osservazione 1.77 — Si osserva che $H \rtimes_{\varphi} K$ è il prodotto diretto se e solo se $\varphi_k = e, \forall k \in K$. Infatti:

$$(h, k)(h', k') = (h \cdot \varphi_k(h'), kk') = (hh', kk') \iff \varphi_k(h') = h' \quad \forall k \in K$$

e dunque $\varphi_k = id_H$.

Teorema 1.78 (Decomposizione in prodotto semidiretto)

Sia G un gruppo e siano $H, K \leq G$, con $H \trianglelefteq G$, tali che:

- (1) $HK = G$.
- (2) $H \cap K = \{e\}$.

Allora $G \cong H \rtimes_{\varphi} K$, dove $\varphi : K \longrightarrow \text{Aut}(H) : k \longmapsto \varphi_k$, con $\varphi_k : H \longmapsto H : h \longmapsto khk^{-1}$.

Dimostrazione. Costruiamo esplicitamente un isomorfismo tra i due gruppi:

$$\mathcal{F} : H \rtimes_{\varphi} K \longrightarrow G : (h, k) \longmapsto hk$$

Verifichiamo che è un omomorfismo:

$$\mathcal{F}((h, k)(h', k')) = \mathcal{F}(h \cdot \varphi_k(h'), kk') = \mathcal{F}(h \underbrace{kh'k^{-1}}_{=\varphi_k(h')}, kk') = hkh'k^{-1}kk' = \underbrace{hk}_{=\mathcal{F}(h, k)} \underbrace{h'k'}_{=\mathcal{F}(h', k')}$$

Si vede inoltre che \mathcal{F} è surgettiva per l'ipotesi (1) e iniettiva per la (2), infatti:

$$\ker \mathcal{F} = \{(h, k) \in H \rtimes_{\varphi} K \mid \mathcal{F}(h, k) = hk = e\} = \{e\}$$

□

Osservazione 1.79 — Si osserva che φ_k è la restrizione al sottogruppo H dell'automorfismo interno $g \longmapsto kgk^{-1}$, poiché $H \trianglelefteq G$, allora la restrizione a H di ogni elemento di $\text{Inn}(G)$ è un automorfismo di H .

Osservazione 1.80 — Sapendo che $G \cong H \rtimes_{\varphi} K$ e seguendo i passaggi della verifica di omomorfismo al contrario, si ricava che necessariamente φ è esattamente l'azione di coniugio su H .

Osservazione 1.81 — Siano $\overline{H} = H \times \{e_K\}$ e $\overline{K} = \{e_H\} \times K$, si osserva che $\overline{H}, \overline{K} \leq G = H \rtimes_{\varphi} K$, infatti sono chiusi per prodotto (ristretto):

$$(h, e_K)(h', e_K) = (h \cdot \varphi_{e_K}(h'), e_K) = (h \cdot id(h'), e_K) = (hh', e_K)$$

$$(e_H, k)(e_H, k') = (e_H \cdot \varphi_k(e_H), kk') = (e_H, kk')$$

e si verifica facilmente anche per inverso. Si osserva che $\overline{H} \trianglelefteq G^a$, in quanto $H = \ker \pi$, con:

$$\pi : H \rtimes_{\varphi} K \longrightarrow K : (h, k) \longmapsto k$$

con π omomorfismo come si vede:

$$\pi((h, k)(h', k')) = \pi(h \cdot \varphi_k(h'), kk') = kk' = \pi((h, k))\pi((h', k'))$$

Per come li abbiamo presi si nota subito che $\overline{H}\overline{K} = G$ e $\overline{H} \cap \overline{K} = \{e\}$, quindi valgono le ipotesi del Teorema 1.79, pertanto:

$$\overline{H} \times \overline{K} \cong G = H \rtimes_{\varphi} K$$

^a \overline{K} in generale non è normale, lo è solo se il prodotto è diretto, infatti in quel caso vale il [Teorema 1.72](#).

Esempio 1.82 ($S_n \cong \mathcal{A}_n \rtimes_{\varphi} \langle(1\ 2)\rangle$)

Verifichiamo che S_n è prodotto semidiretto di $H = \mathcal{A}_n$ e $K = \langle(1\ 2)\rangle$ ^a usando il [Teorema 1.78](#), per quanto detto nel (1) del [Corollario 1.68](#) sappiamo che $\mathcal{A}_n \triangleleft S_n$, inoltre, sempre per il punto (1), essendo $|\mathcal{A}_n| = \frac{n!}{2}$, segue per cardinalità che $HK = S_n$. Essendo $\mathcal{A}_n = \ker \text{sgn}$ e $\langle(1\ 2)\rangle$ una trasposizione $H \cap K = \{e\}$ (in quanto il nucleo dell'omomorfismo segno contiene solo permutazioni pari), pertanto segue la tesi:

$$S_n \cong \mathcal{A}_n \rtimes_{\varphi} \langle(1\ 2)\rangle$$

Osserviamo inoltre che:

$$\varphi : \langle(1\ 2)\rangle \longrightarrow \text{Aut}(\mathcal{A}_n) : (1\ 2) \longmapsto \varphi_{(1\ 2)}, id \longmapsto id$$

con $\varphi_{(1\ 2)} : \mathcal{A}_n \longrightarrow \mathcal{A}_n : \rho \longmapsto (1\ 2)\rho(1\ 2)$.

^aIn generale va bene qualsiasi trasposizione (che esiste sempre in S_n per $n \geq 2$).

Esempio 1.83 ($D_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$)

Ricordando che $D_n = \langle r, s | r^n = s^2 = id, sr s^{-1} = r^{-1} \rangle$, possiamo osservare ancora una volta che le ipotesi del [Teorema 1.78](#) sono soddisfatte. Poiché $\text{ord } r = n$, allora $|\langle r \rangle| = n$, e in particolare $[D_n : \langle r \rangle] = 2 \implies \langle r \rangle \triangleleft D_n$; inoltre, $\langle r \rangle \cap \langle s \rangle = \{id\}$ perché $\det(r_i) = 1$, mentre $\det(sr_i) = -1, \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Infine, essendo $\text{ord } s = 2$, allora il prodotto di sottogruppi avrà cardinalità:

$$|\langle r \rangle \langle s \rangle| = \frac{|\langle r \rangle| |\langle s \rangle|}{|\langle r \rangle \cap \langle s \rangle|} = \frac{2n}{1} = 2n$$

dunque $\langle r \rangle \langle s \rangle = D_n$. Pertanto $D_n \cong \langle r \rangle \rtimes_{\varphi} \langle s \rangle$, dove $\langle r \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ e $\langle s \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, quindi:

$$D_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

con:

$$\varphi : \langle s \rangle \longrightarrow \text{Aut}(\langle r \rangle) : s \longmapsto \varphi_s$$

dove $\varphi_s : \langle r \rangle \longrightarrow \langle r \rangle : r \longmapsto sr s^{-1} (= r^{-1})$. Si osserva che deve essere $\text{ord } \varphi_s | \text{ord } s = 2$, quindi ci sono soltanto due possibilità:

$$\varphi_s = \begin{cases} id \\ r \longmapsto r^{-1} \end{cases}$$

nel caso in cui $\varphi_s = id$ si ottiene il prodotto diretto, nell'altro caso si ottiene il prodotto semidiretto che definisce D_n . Se in $\text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ ci sono altri elementi di ordine due (ad esempio se $\text{Aut}(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}^* \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$) si possono definire anche altri prodotti semidiretti:

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

Rimane il problema di verificare se danno o meno due gruppi isomorfi.

Esempio 1.84 (Gruppi di ordine pq)

Sia $|G| = pq$, per il [Teorema Di Cauchy](#) esistono $x, y \in G$ tali che $\text{ord } x = q$, $\text{ord } y = p$, assumiamo (WLOG) $q > p$, allora si ha che:

$$H = \langle x \rangle \triangleleft G$$

poiché $[G : H] = p$, con p più piccolo primo che divide $|G|$. Alternativamente si può vedere che H è caratteristico in G poiché è l'unico sottogruppo di quell'ordine; se $H' < G$ e $|H'| = q$, se fosse $H \neq H'$, allora $H \cap H' = \{e\}$ e quindi:

$$|HH'| = \frac{|H||H'|}{|H \cap H'|} = \frac{q \cdot q}{1} = q^2 > pq$$

quindi H' non può essere un sottogruppo di G . Si verifica che, detto $K = \langle y \rangle$, le ipotesi del [Teorema 1.78](#) sono soddisfatte:

$$HK = G \quad H \cap K = \{e\} \quad H \triangleleft G$$

da ciò segue che ogni gruppo di ordine pq è prodotto semidiretto: $G \cong H \rtimes_{\varphi} K$.

Per classificare tutti i gruppi di ordine pq bisogna classificare tutti i possibili prodotti semidiretti $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ a meno di isomorfismo. Osserviamo che un prodotto semidiretto deve avere un'operazione definita da:

$$\varphi : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}^* \cong \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$$

Essendo $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \langle y \rangle$ e $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z} = \langle x \rangle$ possiamo scrivere:

$$\varphi : \langle y \rangle \longrightarrow \text{Aut}(\langle x \rangle) (\cong \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}^* \cong \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}) : y \longmapsto \varphi_y$$

con $\varphi_y : \langle x \rangle \longrightarrow \langle x \rangle : x \longmapsto x^l$. Per definire φ su $\langle y \rangle$ (un dominio ciclico) basta assegnare φ_y con la condizione $\text{ord } \varphi_y \mid \text{ord } y = p$, inoltre, $\varphi_y \in \text{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z} \implies \text{ord } \varphi_y \mid q-1$, quindi $\text{ord } \varphi_y \mid (p, q-1)$. Distinguiamo due casi:

- Se $p \nmid q-1$, si ha che $\text{ord } \varphi_y \mid 1 \implies \varphi_y = id$, dunque l'unico automorfismo possibile di $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ è l'identità, pertanto si ha un prodotto diretto tra $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ e quindi esiste ed è unico il gruppo di ordine pq , $\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$.
- Se $p \mid q-1$, allora o $\text{ord } \varphi_y = 1$ e quindi ancora $\varphi_y = id$; oppure $\text{ord } \varphi_y = p$, e poiché ci sono $p-1$ elementi di ordine p in $\mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$, abbiamo $p-1$ scelte per φ_y che danno un prodotto semidiretto.

Si osserva che $\text{ord } \varphi_y = \text{ord}_{\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}^*}(\bar{l})$ e:

$$\varphi_y(x) = x^l \implies (\varphi_y(x))^k = x^{lk}$$

quindi $\text{ord } \varphi_y = p \iff l^p \equiv 1 \pmod{q} \iff \text{ord } l = p$. Le $p-1$ scelte per φ_y danno tutti gruppi isomorfi, quindi se $p \mid q-1$ ci sono esattamente due gruppi di ordine pq a meno di isomorfismo. Infatti, detti:

$$G_1 = \langle x \rangle \rtimes_{\varphi} \langle y \rangle \quad \text{e} \quad G_2 = \langle x \rangle \rtimes_{\psi} \langle y \rangle$$

con $\varphi_y(x) = x^l$, $\text{ord } l = p$ e $\psi_y(x) = x^{\lambda}$, $\text{ord } \lambda = p$, pertanto $\langle l \rangle = \langle \lambda \rangle$ se e solo se $l = \lambda^r$, con $0 < r < p$. Possiamo scrivere l'applicazione:

$$\mathcal{F} : G_1 \longrightarrow G_2 : x \longmapsto x, y \longmapsto y^r$$

che definisce un isomorfismo tra i due gruppi:

$$G_1 = \langle x, y \mid x^q = y^p = 1, yxy^{-1} = x^l \rangle \quad \text{e} \quad G_2 = \langle x, y \mid x^q = y^p = 1, yxy^{-1} = x^{\lambda} \rangle$$

Per mostrare che è un isomorfismo basta osservare che:

$$\mathcal{F}(x^q) = (\mathcal{F}(x))^q = id \quad \text{in quanto } x^q = id$$

e anche:

$$\mathcal{F}(y^p) = (\mathcal{F}(y))^p = id \quad \text{in quanto } y^p = id$$

ed infine:

$$\mathcal{F}(yxy^{-1}) = \mathcal{F}(x^l)$$

in quanto:

$$\mathcal{F}(yxy^{-1}) = \mathcal{F}(y)\mathcal{F}(x)\mathcal{F}(y^{-1}) = \underbrace{y^r xy^{-r}}_{\in G_2} = x^{\lambda^r} = x^l = \mathcal{F}(x^l)$$

ciò garantisce che \mathcal{F} ottenuto estendendo l'assegnamento $x \longmapsto x, y \longmapsto y^r$ è un omomorfismo, segue banalmente che è anche una bigezione e quindi è un isomorfismo.

6

⁶Quest'ultima pagina non è in versione definitiva e necessita di ulteriori revisioni.

§1.13 Teorema di struttura per i gruppi abeliani finiti

Teorema 1.85 (Teorema Di Struttura Dei Gruppi Abeliani Finiti)

Sia G un gruppo abeliano finito, allora G è prodotto diretto di gruppi ciclici, cioè:

$$G \cong \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/n_s\mathbb{Z}$$

Inoltre tale scrittura è unica se $n_{i+1} \mid n_i, \forall i \in \{1, \dots, s-1\}$.

Osservazione 1.86 (Schema della dimostrazione) — Sia:

$$G(p) = \{g \in G \mid \text{ord}(g) = p^k, k \in \mathbb{N}\}$$

$G(p)$ prende il nome di **p -componente** o componente di **p -torsione**. Si osserva che:

- $G(p)$ è un sottogruppo di G perché G è abeliano, dunque:

$$\text{ord}(xy) \mid [\text{ord}(x), \text{ord}(y)] \quad \forall x, y \in G$$

quindi se x ed y hanno per ordine una potenza di p , anche il prodotto ha per ordine una potenza di p , quindi $xy \in G(p)$, ed essendo G finito allora $G(p)$ è un sottogruppo. ^a

- $G(p)$ è un sottogruppo caratteristico di G (ciò segue dal fatto che gli automorfismi conservano l'ordine degli elementi, e quindi $G(p)$ viene mandato in $G(p)$).

^aSi osserva che le p -componenti sono p -gruppi.

Teorema 1.87 (I gruppi abeliani sono prodotto loro delle p -componenti)

Sia G un gruppo abeliano, con $|G| = n = p_1^{e_1} \dots p_s^{e_s}$, con i primi $p_i \neq p_j, \forall i \neq j$, allora:

$$G \cong G(p_1) \times \dots \times G(p_s)$$

Inoltre la decomposizione di G come prodotto di p -gruppi di ordine tra loro coprimi è unica.

Teorema 1.88 (I p -gruppi si spezzano come prodotto di p -gruppi ciclici)

Sia G un p -gruppo abeliano. Esistono e sono univocamente determinati r_1, \dots, r_s tali che $r_1 \geq r_2 \geq \dots \geq r_t$ ^a, per i quali:

$$G \cong \mathbb{Z}/p^{r_1}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p^{r_t}\mathbb{Z}$$

^aL'ordine degli esponenti assicura l'unicità della fattorizzazione.

Segue la dimostrazione del [Teorema Di Struttura Dei Gruppi Abeliani Finiti](#):

Dimostrazione. **Esistenza:** Dato il gruppo G , abeliano e finito, per il [Teorema 1.87](#) si ha:

$$G \cong G(p_1) \times \dots \times G(p_s)$$

possiamo applicare il [Teorema 1.88](#) ad ognuno dei fattori $G(p_i)$ ed ottenere:

$$\begin{aligned} G &\cong G(p_1) \times \dots \times G(p_s) \cong \\ &\cong (\mathbb{Z}/p_1^{r_{11}}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p_1^{r_{1t_1}}\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/p_s^{r_{s1}}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p_s^{r_{st_s}}\mathbb{Z}) \end{aligned}$$

con $r_{i1} \geq \dots \geq r_{it_i}$. Per il Teorema Cinese del Resto possiamo rimettere assieme i termini formati da primi distinti in modo da mantenere la relazione di divisibilità (e quindi unicità) richiesta dal teorema:

$$\underbrace{\mathbb{Z}/(p_1^{r_{11}} \dots p_s^{r_{s1}})\mathbb{Z}}_{n_1} \times \dots \times \underbrace{\mathbb{Z}/(p_1^{r_{1t}} \dots p_s^{r_{st}})\mathbb{Z}}_{n_t}$$

dove $t = \max\{t_1, \dots, t_s\}$ e poniamo $r_{ih} = 0$ se $h > t_i$. Si osserva che, per come abbiamo riscritto la fattorizzazione si ha: $n_t \mid n_{t-1} \mid \dots \mid n_1$.

Unicità: Segue dall'unicità del [Teorema 1.87](#) e del [Teorema 1.88](#), infatti se ci fossero due decomposizioni di G diverse con ordini che si dividono in catena, ripercorrendo gli isomorfismi, avremmo all'inizio due diverse decomposizioni per $G(p)$ (o per G come prodotto di p -componenti). \square

Esempio 1.89

Sia $G \cong \mathbb{Z}/100\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, e raggruppando in base all'ordine degli elementi otteniamo i p -sottogruppi:

$$G \cong \underbrace{(\mathbb{Z}/2^3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})}_{G(2)} \times \underbrace{(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z})}_{G(3)} \times \underbrace{(\mathbb{Z}/5^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z})}_{G(5)}$$

e per il [Teorema Di Struttura](#) possiamo riscrivere il prodotto in ordine decrescente (rimettendo assieme p -gruppi cicli di ordine massimo):

$$G \cong \mathbb{Z}/(2^3 \cdot 3 \cdot 5^2)\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/(2^2 \cdot 3 \cdot 5)\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

Esempio 1.90

Classificare i gruppi abeliani di ordine 1000. Per fare ciò osserviamo che $1000 = 2^3 \cdot 5^3$, allora:

$$G = G(2) \times G(5)$$

con $|G(2)| = 2^3$, e $|G(5)| = 5^3$ pertanto le p -componenti possono essere scritti come prodotto di gruppi ciclici nei seguenti modi:

$$G(2) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/2^3\mathbb{Z} \\ \mathbb{Z}/2^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \end{cases} \quad \text{e} \quad G(5) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/5^3\mathbb{Z} \\ \mathbb{Z}/5^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \\ \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \end{cases}$$

Dunque i gruppi abeliani di ordine 1000 (a meno di isomorfismo) sono $3 \cdot 3 = 9$, in quanto per il [Teorema di Struttura](#) abbiamo una fattorizzazione unica come prodotto di gruppi cicli finiti, e per tale fattorizzazione abbiamo 3 scelte per la 2-componente e 3 scelte per la 5-componente.

Dimostriamo ora il [Teorema 1.87](#)

Dimostrazione. Esistenza: Sia $|G| = n$, con $n = p_1^{e_1} \dots p_s^{e_s}$, procediamo per induzione su s . Nel caso in cui $s = 1$, si ha $|G| = p_1^{e_1} \implies G = G(p_1)$. Supponiamo la tesi vera $\forall m : 2 \leq m < n$, possiamo scrivere $n = mm'$ con $(m, m') = 1$ e $m, m' < n$, allora (in notazione additiva) vogliamo verificare che:

$$G \cong mG \times m'G$$

È facile verificare che $mG, m'G < G$ (basta vedere la chiusura per l'operazione), ed essendo G abeliano si ha anche $mG, nG \triangleleft G$; si osserva inoltre che, essendo $(m, m') = 1$, allora $\exists h, k \in \mathbb{Z}$:

$$mh + m'k = 1 \implies m(gh) + m'(gk) = g \quad \forall g \in G \implies G \subseteq mG + m'G$$

il contrario è ovvio, dunque:

$$mG + m'G = G$$

Inoltre, sia $x \in mG \cap m'G$, ovvero $x = mg = m'g'$, allora si osserva che $m'x = m'mg = nx = 0$ e $mx = mm'g' = nx = 0$, dunque:

$$\text{ord}(x) \mid m \quad \text{e} \quad \text{ord}(x) \mid m' \implies \text{ord}(x) \mid (m, m') = 1 \implies x = 0$$

Quindi $mG \cap m'G = \{e\}$, pertanto sono verificate ipotesi del [Teorema 1.72](#), dunque è vero che $G \cong mG \times m'G$. Osserviamo che:

$$mG = G_{m'} = \{g \in G \mid m'g = 0\} \quad \text{e} \quad m'G = \{g \in G \mid mg = 0\}$$

Verifichiamo (WLOG) $m'G = G_m$ mostrando la doppia inclusione tra insiemi; $m'G \subseteq G_m$, ovvero $m'x \in G_m$, perché $mm'x = nx = 0$, viceversa, preso $x \in G_m$, ovvero $mx = 0$, per quanto visto sopra abbiamo che:

$$\underbrace{mx}_{=0}h + m'kx = x \implies x = m'(kx) \implies x \in m'G$$

quindi $G_m \subseteq m'G \implies m'G = G_m$. Pertanto possiamo scrivere:

$$G \cong G_m \times G_{m'}$$

Poiché $|G_m|, |G_{m'}| < |G|$, perché G_m contiene tutti e soli gli elementi di G di ordine che divide m , inoltre $G_m \neq \{0\}$ (per [Cauchy](#), dato che $1 < m < n$), quindi $G_{m'} \not\leq G$ e viceversa. Possiamo quindi applicare l'ipotesi induttiva e scrivere:

$$G_m = \prod_{i \in I} G(p_i) \quad \text{e} \quad G_{m'} = \prod_{j \in J} G(p_j)$$

con $I \cup J = \{1, \dots, s\}$ e $I \cap J = \emptyset$ (poiché $(m, m') = 1$).

Unicità: La scrittura come prodotto di p -componenti è unica, perché se G fosse anche isomorfo ad altri p -gruppi:

$$G \cong H_1 \times \dots \times H_n \quad \text{con } H_i \text{ } p_i\text{-gruppo e } H_i < G$$

allora $H_i \subseteq G(p_i)$ (in quanto $G(p_i)$ contiene tutti gli elementi di ordine potenze di p_i), ma:

$$|G| = |H_1| \dots |H_s| = |G(p_1)| \dots |G(p_s)| \implies |H_i| = |G(p_i)| \quad \forall i \in \{1, \dots, s\}$$

quindi segue che $H_i = G(p_i)$, $\forall i \in \{1, \dots, s\}$. □

Lemma 1.91

Sia G un p -gruppo abeliano, e sia x_1 un elemento di ordine massimo in G , preso $\bar{x} \in G/\langle x_1 \rangle$ esiste $y \in \pi^{-1}(\bar{x})$: $\text{ord}_G(y) = \text{ord}_{G/\langle x_1 \rangle}(\bar{x})$.

Dimostrazione. Osserviamo che $\pi^{-1}(\bar{x}) = x + \langle x_1 \rangle$, dunque $y \in \pi^{-1}(\bar{x})$ è della forma:

$$y = x + ax_1$$

Sappiamo che $\pi(y) = \pi(x) = \bar{x}$, allora $p^r = \text{ord}(\pi(y)) = \text{ord}(\bar{x}) \mid \text{ord}(y)$ (per le proprietà di omomorfismo), scegliamo y (cioè a) in modo che:

$$0 = p^r y = p^r x + p^r a x_1 \iff p^r x = -p^r a x_1$$

dove $\text{ord}(\bar{x}) = p^r \implies p^r x \in \langle x_1 \rangle \implies p^r x = b x_1$, tuttavia, dato che x_1 ha ordine massimo p^{r_1} , deve essere che $r \leq r_1$, ma:

$$0 = p^{r_1} x = p^{r_1-r} p^r x = p^{r_1-r} b x_1$$

ma $\text{ord}(x_1) = p^{r_1} \implies p^r \mid b \implies b = p^r b_1$. Scegliendo $a = -b_1$ si ha:

$$p^r y = p^r x - p^r b_1 x_1 = b x_1 - \underbrace{p^r b_1}_{=b} x_1 = 0$$

□

Dimostriamo ora il [Teorema 1.88](#):

Dimostrazione. Esistenza: Sia G un p -gruppo, $|G| = p^n$, proviamo la tesi per induzione su n . Per $n = 1$ si ha che $|G| = p \implies G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, e quindi la tesi è verificata. Supponiamo la tesi vera per $1 \leq m < n$ e proviamola per n ; sia $x_1 \in G$ un elemento di ordine massimo, $\text{ord}(x_1) = p^{r_1}$:

- Se $r_1 = n$, allora G è ciclo $\implies G \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$.
- Se $r_1 < n$, poiché G è abeliano si ha $\langle x_1 \rangle \triangleleft G$, quindi possiamo considerare $G/\langle x_1 \rangle$ che ha ordine $p^{n-r_1} < p^n$, dunque vale l'ipotesi induttiva ed il gruppo quoziente può essere fattorizzato come prodotto di gruppi ciclici:

$$G/\langle x_1 \rangle \cong \langle \overline{x_2} \rangle \times \dots \times \langle \overline{x_t} \rangle^7$$

sia $\text{ord}(\overline{x_i}) = p^{r_i}$, e supponiamo di aver scritto il prodotto diretto in modo ordinato, con $r_2 \geq \dots \geq r_t$. Consideriamo la proiezione al quoziente:

$$\pi : G \longrightarrow G/\langle x_1 \rangle \cong \langle \overline{x_2} \rangle \times \dots \times \langle \overline{x_t} \rangle^8$$

per il [Lemma 1.91](#) esistono $x_2, \dots, x_t \in G$ tali che $\text{ord}_G(x_i) = \text{ord}_{G/\langle x_1 \rangle}(\overline{x_i}) = p^{r_i}$. Vogliamo mostrare allora che:

$$H = \langle x_2, \dots, x_t \rangle \cong \langle x_2 \rangle \times \dots \times \langle x_t \rangle$$

ovvero che il sottogruppo di G finitamente generato da x_2, \dots, x_t è isomorfo al prodotto diretto dei singoli sottogruppi ciclici generati dai medesimi elementi. Consideriamo di nuovo la proiezione al quoziente modulo $\langle x_1 \rangle$, ma ristretta ad H :

$$\pi|_H : H \longrightarrow G/\langle x_1 \rangle \cong \langle \overline{x_2} \rangle \times \dots \times \langle \overline{x_t} \rangle : a_2x_2 + \dots + a_tx_t \longmapsto (a_2\overline{x_2}, \dots, a_t\overline{x_t})$$

è un isomorfismo, infatti π è un omomorfismo, è surgettivo (in quanto si possono mandare tutti i generatori x_i di H nelle t -uple di generatori di $G/\langle x_1 \rangle$); per l'iniettività si osserva che gli elementi del nucleo sono del tipo:

$$\pi(a_2x_2 + \dots + a_tx_t) = (a_2\overline{x_2}, \dots, a_t\overline{x_t}) = (0, \dots, 0) \iff a_i\overline{x_i} = 0 \quad \forall i \in \{2, \dots, t\}$$

cioè se e solo se $\text{ord}_{G/\langle x_1 \rangle}(\overline{x_i}) = p^{r_i} \mid a_i$, $\forall i \in \{2, \dots, t\}$. Segue che $\pi|_H$ è un isomorfismo e si ha:

$$H \cong \langle \overline{x_2} \rangle \times \dots \times \langle \overline{x_t} \rangle \cong \langle x_2 \rangle \times \dots \times \langle x_t \rangle$$

Dove l'ultimo isomorfismo deriva dal fatto che abbiamo scelto elementi di ordini uguali, che quindi generano gli stessi gruppi ciclici a meno di isomorfismo. Mostriamo che $G \cong \langle x_1 \rangle \times H (\cong \langle x_2 \rangle \times \dots \times \langle x_t \rangle)$ e per farlo verifichiamo che le ipotesi del [Teorema 1.72](#) siano soddisfatte.

Per mostrare che l'intersezione è banale, consideriamo un elemento in quest'ultima, ovvero un elemento che può essere scritto come:

$$a_1x_1 = a_2x_2 + \dots + a_tx_t$$

⁷Dunque si ha $|\langle \overline{x_2} \rangle \times \dots \times \langle \overline{x_t} \rangle| = p^{n-r_1}$.

⁸L'isomorfismo tra i due gruppi è quello che manda $(G/\langle x_1 \rangle \ni) \bar{g} = a_2\overline{x_2} + \dots + a_t\overline{x_t}$ (poiché $G/\langle x_1 \rangle$ è finito è anche finitamente generato) in $(a_2\overline{x_2}, \dots, a_t\overline{x_t}) \in \langle \overline{x_2} \rangle \times \dots \times \langle \overline{x_t} \rangle$.

applicando π alle due scritture si ha:

$$\bar{0} = a_2\bar{x}_2 + \dots + a_t\bar{x}_t \iff (a_2\bar{x}_2, \dots, a_t\bar{x}_t) = (\bar{0}, \dots, \bar{0})$$

in quanto $G/\langle x_1 \rangle \cong \prod_{i=2}^t \langle \bar{x}_i \rangle$, dunque l'unica possibilità di annullare la somma scritta è che $a_i \equiv 0 \pmod{p^{r_1}}$ (ovvero a_i è multiplo dell'ordine di \bar{x}_i), $\forall i \in \{2, \dots, t\}$, da ciò segue che anche nel gruppo di partenza $a_i = 0$ e quindi $a_1x_1 = 0$, pertanto $\langle x_1 \rangle \cap H = \{0\}$. Per mostrare che $\langle x_1 \rangle + H = G$, osserviamo che $\langle x_1 \rangle + H \subseteq G$ e che la sua cardinalità è:

$$|\langle x_1 \rangle + H| = \frac{|\langle x_1 \rangle| |H|}{|\langle x_1 \rangle \cap H|} = \frac{p^{r_1} \cdot p^{n-r_1}}{1} = p^n$$

Le ipotesi sono soddisfatte e quindi $G \cong \langle x_1 \rangle \times H \cong \langle x_1 \rangle \times \dots \times \langle x_t \rangle$.

Unicità: Sia $|G| = p^n$ e procediamo ancora per induzione su n . Per $n = 1$ segue sempre $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ e quindi la tesi è verificata. Supponiamo la tesi vera per $m < n$ e proviamola per n ; sia:

$$G \cong \mathbb{Z}/p^{r_1}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p^{r_t}\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/p^{k_1}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p^{k_s}\mathbb{Z}$$

dove supponiamo $r_1 \geq \dots \geq r_t$ e $k_1 \geq \dots \geq k_s$. Deve essere necessariamente che $t = s$, perché, considerando:

$$G_p = \{g \in G \mid pg = 0\}$$

con G_p gruppo caratteristico (poiché gli isomorfismi conservano gli ordini degli elementi) e quindi:

$$G_p \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^t \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^s \implies t = s$$

Quindi le lunghezze delle fattorizzazioni sono uguali, per concludere ci basta utilizzare l'ipotesi induttiva al gruppo pG (con $|pG| = p^{n-t}$):

$$pG \cong \frac{p\mathbb{Z}}{p^{r_1}\mathbb{Z}} \times \dots \times \frac{p\mathbb{Z}}{p^{r_t}\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/p^{r_1-1}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p^{r_t-1}\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/p^{k_1-1}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p^{k_t-1}\mathbb{Z}$$

quindi G_p ha decomposizione unica, da cui:

$$r_1 - 1 = k_1 - 1, \dots, r_t - 1 = k_t - 1 \iff r_1 = k_1, \dots, r_t = k_t$$

□

Osservazione 1.92 — Il [Lemma 1.91](#) non vale in generale per quozienti qualsiasi, ad esempio:

$$\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} / \langle p \rangle \cong \frac{\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}}{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

e con la proiezione:

$$\pi : \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \longrightarrow \frac{\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}}{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} : 1 \longmapsto \bar{1}$$

con $\bar{1}$ che ha ordine p nel gruppo di arrivo, mentre:

$$\pi^{-1}(\bar{1}) = \{1 + kp\}_{k=1, \dots, p-1}$$

con $1 + kp$ che ha ordine p^2 , $\forall k : 1 \leq k \leq p$, dunque stiamo quozientando per un elemento che non ha ordine massimo; nelle condizioni del lemma, invece, stiamo quozientando per un elemento di ordine massimo.

§1.14 Teorema di Sylow

Osservazione 1.93 — Dato un gruppo G finito cosa possiamo dire dell'esistenza di elementi e sottogruppi di un certo ordine? Riepiloghiamo di seguito i principali risultati visti:

- $H \leq G \implies |H| \mid |G|$ (Teorema Di Lagrange).
- $\forall p$ primo tale che $p \mid |G|$, $\exists x \in G : \text{ord}_G(x) = p$ (Teorema Di Cauchy).
- Se G è ciclico, $\forall d \mid |G|$, $\exists x \in G : \text{ord}_G(x) = d$ (per definizione di gruppo ciclico).
- G è ciclico se e solo se $d = |G|$.
- Se G è abeliano $\forall d \mid |G|$, $\exists H \leq G$ tale che $|H| = d$ (Lemma Di Ranieri).

L'ultimo fatto può essere ricavato (alternativamente) dal Teorema di Struttura, infatti:

$$G = G_{p_1} \times \dots \times G_{p_r}$$

con $|G| = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$, se $d = p_1^{a_1} \dots p_r^{a_r}$, bisogna verificare che per ogni i esiste $H_{p_i} \leq G_{p_i}$ tale che $|H_{p_i}| = p^{a_i}$. Poiché:

$$G = \mathbb{Z}/p^{n_1}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p^{n_s}\mathbb{Z} \quad \text{con} \quad \sum n_i = e$$

possiamo costruire sottogruppi di ogni ordine⁹; inoltre, dato che G è abeliano il prodotto di sottogruppi è un sottogruppo:

$$H_{p_1} \dots H_{p_r} < H$$

e inoltre:

$$H_{p_1} \dots H_{p_r} \cong H_{p_1} \times \dots \times H_{p_r}$$

poiché $H_{p_i} \cap H_{p_j} = \{e\}$, dunque:

$$|H_{p_1} \dots H_{p_r}| = \prod |H_{p_i}| = \prod p^{a_i} = d$$

e quindi otteniamo il sottogruppo di ordine d voluto.

Osservazione 1.94 — Se G non è abeliano e $d \mid |G|$ non è detto che G abbia sottogruppi di ordine d .

⁹Ad esempio $|H_p| = p^{72}$, preso $G_p = \mathbb{Z}/p^{30}\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p^{30}\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p^{30}\mathbb{Z}$, può essere ottenuto come $H_p = \mathbb{Z}/p^{30}\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p^{30}\mathbb{Z} \times p^{18}\mathbb{Z}/p^{30}\mathbb{Z}$.

Esempio 1.95 (\mathcal{A}_4 non contiene sottogruppi di ordine 6)

Sappiamo che $|\mathcal{A}_4| = 4!/2 = 12$, se $\exists H < \mathcal{A}_4$ di ordine 6, allora $H \triangleleft \mathcal{A}_4$; per [Cauchy](#) $\exists x \in H : \text{ord}(x) = 2$, con $x = (a\ b)(c\ d)$, deve essere quindi che:

$$\mathcal{C}\ell_{\mathcal{A}_4}(x) \subset H$$

poiché $H \triangleleft \mathcal{A}_4$ e per definizione è unione di classi di coniugio in \mathcal{A}_4 . Sappiamo che:

$$\mathcal{C}\ell_{\mathcal{A}_4}(x) = \{(1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$$

Visto che $|\mathcal{C}\ell_{\mathcal{A}_4}((a\ b)(c\ d))| = 3$, allora $\mathcal{C}\ell_{\mathcal{A}_4}((a\ b)(c\ d)) = \mathcal{C}\ell_{S_4}((a\ b)(c\ d))$, dunque se $H \triangleleft \mathcal{A}_4 \implies H \supset \{e, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\} = V$ ^a, allora $V < H$, ma $4 \nmid 6 \implies$ assurdo.

^a V prende il nome di [gruppo di Klein](#) o [Klein 4-group](#).

Lemma 1.96

Sia G un p -gruppo e $H \leq G$, allora $H \leq N_G(H)$.

Dimostrazione.

□

Definizione 1.97. Dato G un gruppo finito e p un primo, tali che $|G| = p^n m$, con $p^n \parallel |G|$ ¹⁰ e $n \geq 1$ e $(m, p) = 1$, allora un sottogruppo di G di ordine p^n prende il nome di [p-sottogruppo di Sylow](#) ([p-Sylow](#)).¹¹

¹⁰Il simbolo \parallel indica la divisibilità esatta, ovvero p^n è la massima potenza di p che divide $|G|$.

¹¹I p -sottogruppi di Sylow possono anche essere pensati come p -sottogruppi di ordine massimale.

Teorema 1.98 (Teorema Di Sylow)

Sia G un gruppo finito, con $|G| = p^n m$, con p primo, $n \geq 1$ e $(m, p) = 1$ ^a, allora:

- (1) $\forall \alpha : 0 \leq \alpha \leq n, \exists H \leq G : |H| = p^\alpha$. (Esistenza)
- (2) $\forall \alpha : 0 \leq \alpha \leq n - 1$, ogni sottogruppo di ordine p^α è contenuto in un sottogruppo di ordine $p^{\alpha+1}$. In particolare, ogni p -sottogruppo è contenuto in un p -sottogruppo di Sylow. (Inclusione)
- (3) Due qualunque p -sottogruppi di Sylow di G sono coniugati (quindi tutti i p -sottogruppi di ordine massimale sono isomorfi). (Coniugio)
- (4) Sia n_p il numero di p -sottogruppi di Sylow di G , allora: (Numero)

$$n_p \mid |G| \quad \text{e} \quad n_p \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{e} \quad n_p = [G : N_G(S)]^b$$

^aOvvero $p^n \parallel |G|$, o anche $\nu_p(|G|) = n$ (dove con ν_p intendiamo la **valutazione p -adica**).

^bCon S ci si riferisce a un qualsiasi p -Sylow, per un p fissato.

Dimostrazione. Dimostriamo tutte le affermazioni del teorema:

- (1) Dimostriamo che $\forall \alpha : 0 \leq \alpha \leq n$ esiste almeno un sottogruppo di ordine p^α ; sia $\mathcal{M} = \{X \subset G \mid |X| = p^\alpha\}$, allora:

$$|\mathcal{M}| = \binom{|G|}{p^\alpha} = \binom{p^n m}{p^\alpha} = \frac{p^n m (p^n m - 1) \dots (p^n m - p^\alpha + 1)}{p^\alpha (p^\alpha - 1) \dots (p^\alpha - p^\alpha + 1)}^{12}$$

Possiamo riscrivere il prodotto dei termini nel modo seguente:

$$\prod_{i=0}^{p^\alpha-1} \frac{p^n m - i}{p^\alpha - i} = p^{n-\alpha} m \prod_{i=1}^{p^\alpha-1} \frac{p^n m - i}{p^\alpha - i}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo raccolto il primo termine, $p^{n-\alpha} m$, e lo abbiamo portato fuori dalla produttoria.

Osserviamo a questo punto che $p^{n-\alpha}$ è la più grande potenza di p che divide $|\mathcal{M}|^{13}$, infatti, si osserva che $p \nmid \prod_{i=1}^{p^\alpha-1} \frac{p^n m - i}{p^\alpha - i}$, cioè $\forall i \in \{1, \dots, p^\alpha - 1\}$ si ha che $p \nmid \frac{p^n m - i}{p^\alpha - i}$, come si osserva infatti:

$$\nu_p(p^n m - i) = \nu_p(p^\alpha - i) = \nu_p(i)$$

dunque, se $p \nmid i \implies p^n m - i$ e $p^\alpha - i$ non sono divisibili per p ; se fosse $i = p^k j$, con $(j, p) = 1$, allora $p^\alpha - i = p^\alpha - p^k j = p^k (p^{\alpha-k} - j)$, con $k < \alpha$, (analogamente

non divisibile per p

per $p^n m - i$), per quanto abbiamo detto deve essere necessariamente che:

$$p^{n-\alpha} \parallel |\mathcal{M}|$$

ovvero $p^{n-\alpha}$ è l'esatta potenza di p che divide $|\mathcal{M}|$. Consideriamo $M \in \mathcal{M}$, allora $gM \in \mathcal{M}, \forall g \in G$, dunque possiamo considerare l'azione:

$$\phi : G \longrightarrow S(\mathcal{M}) : g \longmapsto \varphi_g$$

¹²Si osserva che abbiamo semplificato al numeratore e al denominatore il termine $(p^n m - p^\alpha)!$.

¹³O anche $p^{n-\alpha} \parallel |\mathcal{M}|$, o ancora $\nu_p(|\mathcal{M}|) = n - \alpha$.

dove $\varphi_g : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M} : M \longmapsto gM$ è una bigezione. Data l'azione ϕ sappiamo che:

$$\mathcal{M} = \bigcup_{i=1}^s \text{Orb}(M_i) \implies |\mathcal{M}| = \sum_{i=1}^s |\text{Orb}(M_i)| = \sum_{i=1}^s \frac{|G|}{|\text{St}(M_i)|}$$

unendo ciò a quanto detto si ha che $p^{n-\alpha} \parallel \sum_{i=1}^s \frac{|G|}{|\text{St}(M_i)|}$, quindi non tutte le orbite possono essere divisibili per una potenza maggiore di $p^{n-\alpha}$, ovvero esiste almeno un i tale per cui $p^{n-\alpha+1} \nmid |\text{Orb}(M_i)|$ (ovvero non può essere diviso per una potenza più grande di quanto detto), da ciò segue: $p^{n-\alpha+1} \nmid |\text{Orb}(M_i)| = \frac{|G|}{|\text{St}(M_i)|} = \frac{p^n m}{|\text{St}(M_i)|}$, pertanto deve essere necessariamente che:

$$p^\alpha \mid |\text{St}(M_i)| = t$$

cioè, affinché il rapporto non sia divisibile per p^α , al denominatore deve esserci una potenza di p maggiore o uguale ad α . D'altra parte, sia $x \in M_i$, la funzione:

$$\varphi_x : \text{St}(M_i) \longrightarrow M_i : y \longmapsto yx$$

è iniettiva¹⁴, dunque $t = |\text{St}(M_i)| \leq |M_i| = p^\alpha$, segue quindi $t = p^\alpha$, pertanto $\text{St}(M_i)$ è il sottogruppo di ordine p^α cercato.

- (2) Sia S un p -sottogruppo di Sylow di G , con $|S| = p^n$, e sia $H \leq G$, con $|H| = p^\alpha$; consideriamo l'insieme $G/S = X$ dato dalle classi laterali di S in G , allora:

$$|X| = [G : S] = \frac{p^n m}{p^n} = m$$

Consideriamo l'azione di H su X data da:

$$\varphi : H \longrightarrow S(X) : h \longmapsto \varphi_h$$

con $\varphi_h : X \longrightarrow X : gS \longmapsto hgS$ bigezione; per la formula delle classi si ha:

$$m = |X| = \sum_{i=1}^r |\text{Orb}(g_i S)| = \sum_{i=1}^r \frac{|H|}{|\text{St}(g_i S)|} = \sum_{i=1}^r p^{a_i}$$

(essendo p -gruppi). Poiché per ipotesi $p \nmid m$, allora esiste i tale che $a_i = 0$ (dunque c'è un 1 nella fattorizzazione che impedisce la divisibilità di m per p) $\implies \text{Orb}(g_i S) = \{g_i S\} \implies \text{St}(g_i S) = H$ (ovvero per tale i si ha una classe laterale $g_i S$ la cui orbita è solo se stessa, e quindi il suo stabilizzatore è tutto H). Da ciò segue che $\forall h \in H$:

$$hg_i S = g_i S \iff hg_i \in g_i S \iff h \in g_i S g_i^{-1} \iff H \subset g_i S g_i^{-1}$$

dove $|g_i S g_i^{-1}| = |S|$ dunque $g_i S g_i^{-1}$ è un p -Sylow ed H di ordine p^α è contenuto in un p -Sylow. Questo dimostra il punto (3), ovvero due p -Sylow di G sono coniugati, infatti la relazione trovata vale per ogni α ed in particolare prendendo $|H| = p^n \implies H \leq g_i S g_i^{-1}$ ma i due sottogruppi hanno lo stesso ordine, quindi $H = g_i S g_i^{-1}$; pertanto, tutti i p -Sylow per ogni p sono coniugati tra loro in G .

Per completare la dimostrazione del punto (2) utilizziamo il risultato del [Lemma 1.95](#), considerando $|H| = p^\alpha$, con $\alpha \leq n-1$ e $H \leq S$, dunque $H \leq N_S(H)$ ¹⁵, sia

¹⁴Si vede che $\varphi_x(y) = \varphi_x(z) \iff yx = zx \iff y = z$.

¹⁵Si noti che abbiamo preso il normalizzatore di H in S .

ora $\frac{N_S(H)}{H}$, esso è un p -gruppo non banale e per il [Teorema di Cauchy](#) esiste una classe laterale $\bar{x}(=xH)$ di ordine p , infine, per il Teorema di Corrispondenza ¹⁶, $\pi_H^{-1}(\langle \bar{x} \rangle)$ è un sottogruppo di $N_S(H)$ che contiene H (sempre per il Teorema Di Corrispondenza) ed ha ordine $p^{\alpha+1}$ (poiché stiamo considerando la controimmagine di un sottogruppo con p elementi, ciascuno dei quali fatto da classi laterali di p^α elementi, dunque la cardinalità della controimmagine si ottiene moltiplicando la fibra di ciascun elemento, che appunto ha ordine p^α , per il numero di elementi p).

- (4) Sia n_p il numero dei p -sottogruppi di Sylow, per quanto detto al punto (3) i p -sottogruppi di Sylow sono tutti coniugati, dunque per ciò che abbiamo visto sul numero di coniugi rispetto all'azione di coniugio si ha $n_p = |\mathcal{C}\ell(S)| = [G : N_G(S)]$, da cui:

$$n_p = \frac{|G|}{|N_G(S)|} \implies |G| = n_p |N_G(S)| \implies n_p \mid |G|$$

Sia X l'insieme dei p -Sylow di G , consideriamo l'azione di coniugio:

$$\phi : S \longrightarrow S(X) : s \longmapsto \varphi_s$$

con $\varphi_s : X \longrightarrow X : H \longmapsto sHs^{-1}$ bigezione; ϕ ha un'unica orbita banale, ovvero quella del gruppo S , $\text{Orb}(S) = \{S\}$, infatti, per ogni altra orbita si ha:

$$\text{Orb}(H) = \{sHs^{-1} \mid s \in S\} = \{H\} \iff sHs^{-1} = H \quad \forall s \in S$$

ovvero:

$$S \subset N_G(H)$$

ma sappiamo anche che $H \subsetneq N_G(H)$, pertanto si deve avere che:

$$HS < N_G(H)$$

(poiché S normalizza H il prodotto di sottogruppi da un sottogruppo), ma questo è assurdo se $S \neq H$, perché avremmo:

$$|SH| = \frac{|S||H|}{|S \cap H|} = \frac{p^n \cdot p^n}{p^k} \stackrel{17}{=} p^{2n-k} \nmid |G|$$

Quindi esiste un'unica orbita banale e applicando la formula delle classi otteniamo:

$$n_p = |X| = \sum_{i=1}^r \underbrace{|\text{Orb}(H_i)|}_{p^{\alpha_i} \neq 1} + \underbrace{|\text{Orb}(S)|}_{=1} = pf + 1 \quad f \in \mathbb{Z}$$

o equivalentemente $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.

□

¹⁶Tra i sottogruppi di $\frac{N_S(H)}{H}$ ed i sottogruppi di $N_S(H)$ che contengono H .

¹⁷ $k < n$.

Corollario 1.99

Sia G un gruppo abeliano finito, $\forall p$ primo tale che $p \mid |G|$, $G(p)$ è l'unico p -Sylow di G . Inoltre G è il prodotto diretto dei suoi p -Sylow:

$$G \cong G(p_1) \times \dots \times G(p_r)$$

con $|G| = \prod p_i^{e_i}$.

Dimostrazione.

□

Esempio 1.100 (Classificazione dei gruppi di ordine 12)

Poiché $12 = 2^2 \cdot 3$, per Sylow, sappiamo che $\exists P_2, P_3$, con P_2 2-Sylow, P_3 3-Sylow e $|P_2| = 4$, $|P_3| = 3$; abbiamo che $P_2 \cap P_3 = \{e\}$ poiché p -gruppi distinti, dunque $G = P_2 P_3$, in quanto:

$$|P_2 P_3| = \frac{|P_2| |P_3|}{|P_2 \cap P_3|} = \frac{4 \cdot 3}{1} = 12$$

inoltre, almeno uno tra P_2 e P_3 è normale. Se $P_3 \triangleleft G$ allora abbiamo un sottogruppo normale; se $P_3 \not\triangleleft G$, allora osserviamo che, per quanto detto al punto (4) del [Teorema Di Sylow](#), possiamo avere solo che $n_3 = 1, 4$, ma non essendo P_3 normale n_3 non può essere 1, dunque $n_3 = 4$; da ciò segue che in G ci sono 8 elementi di ordine 3^a e 4 elementi di ordine diverso da 4, che quindi formano l'unico 2-Sylow, equivalentemente $n_2 = 1$, e quindi P_2 è normale. Osserviamo che supponendo invece $P_2 \not\triangleleft G$, si arriva simmetricamente a concludere che $P_3 \triangleleft G$, pertanto uno dei due sottogruppi di Sylow è necessariamente normale e in entrambi i casi sono soddisfatte le ipotesi del [Teorema 1.78](#), segue che G è un prodotto semidiretto tra P_2 e P_3 . Studiamo separatamente i due casi.

^a $4 \cdot 3 - 4 = 8$.

Esempio 1.101 ($G \cong P_2 \rtimes_{\varphi} P_3$)

Se $P_2 \triangleleft G$, allora $G \cong P_2 \rtimes_{\varphi} P_3$. P_2 ha ordine 4, dunque è $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, mentre P_3 è necessariamente $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$; nel primo caso abbiamo:

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \quad \text{con} \quad \varphi : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

in questo caso l'unica possibilità è $[1]_3 \mapsto id$, dunque il prodotto semidiretto è in realtà sempre un prodotto diretto, dunque il primo gruppo trovato è:

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$$

nel secondo caso abbiamo:

$$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \quad \text{con} \quad \varphi : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong S_3$$

a questo punto, possiamo o mandare $[1]_3 \mapsto id$ ottenendo il prodotto diretto:

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

oppure mandare $[1]_3$ in un altro elemento il cui ordine divida 3 (in questo caso uno dei due 3-cicli), dunque abbiamo due scelte per $\varphi([1]_3)$; entrambe le scelte danno origine a due prodotti semidiretti isomorfi^a. Osserviamo che abbiamo:

$$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = G \hookrightarrow S_4$$

infatti, G agisce per coniugio sull'insieme $\{P_3, P'_3, P''_3, P'''_3\}$ dei quattro 3-Sylow di G , pertanto abbiamo l'azione transitiva $\phi : G \longrightarrow S(X) \cong S_4$, con $\ker \phi = \{id\}$ (dunque è un'azione fedele). Si verifica facilmente che l'unica possibilità è che G sia isomorfo al gruppo alternante di 4 elementi, dunque abbiamo ottenuto il gruppo:

$$\mathcal{A}_4$$

^aCome nel caso dei gruppi di ordine pq .

Esempio 1.102 ($G \cong P_3 \rtimes_{\varphi} P_2$)

Se $P_3 \triangleleft G$, allora $G \cong P_3 \rtimes_{\varphi} P_2$. Analogamente a quanto visto prima P_2 ha ordine 4, dunque è $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, e P_3 è $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Il primo prodotto che abbiamo è:

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \quad \text{con} \quad \varphi : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

dunque $[1]_4 \mapsto id, -id$, nel primo caso riotteniamo il prodotto diretto e $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, nel secondo caso invece otteniamo un prodotto semidiretto che ci dà il gruppo:

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

L'ultimo prodotto possibile è:

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \quad \text{con} \quad \varphi : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

se mandassimo tutti gli elementi nell'identità otterremmo un prodotto semidiretto, alternativamente, riscrivendo $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ come $\langle x \rangle \times \langle y \rangle$ (i cui elementi saranno $\{e, x, y, xy\}$), abbiamo due elementi di ordine 2 che vanno in $-id$ e l'elemento neutro e un altro elemento di ordine 2 che vanno in id . Possiamo dunque costruire tre prodotti semidiretti che danno origine a gruppi isomorfi, supponiamo (WLOG) che:

$$\varphi_x = id \quad \varphi_y = -id \quad \varphi_{xy} = -id$$

dunque abbiamo:

$$\langle x \rangle \times \langle y \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad \text{e} \quad \langle z \rangle \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

possiamo osservare che:

$$\varphi_x(z) = xzx^{-1} = id(z) = z \implies x \text{ commuta con } z$$

similmente:

$$\varphi_y(z) = yzy^{-1} = -id(z) = -z$$

dunque il sottogruppo generato da y e z è:

$$\langle y, z | y^2 = 1, z^3 = 1, yzy^{-1} = z^{-1} \rangle \cong D_3$$

quindi il gruppo che si ottiene con i tre prodotti semidiretti è $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times D_3$ (il prodotto diretto deriva dal fatto che x commuta sia con y che con z), ovvero:

$$D_6$$

Abbiamo quindi classificato tutti i gruppi di ordine 12:

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \quad \mathcal{A}_4 \quad \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \quad D_6$$

§1.15 Gruppo dei Quaternioni

Definizione 1.103. Si definisce gruppo dei **quaternioni** il gruppo con la seguente presentazione:

$$Q_8 = \langle i, j \mid i^4 = 1, i^2 = j^2, ij = j^3i \rangle$$

Osservazione 1.104 (Ordini di i e j) — Osserviamo che $\text{ord}(i) = 4$, per la definizione che ne abbiamo dato, da ciò si ricava che, essendo $j^2 = i^2$, allora $j^4 = 1 \implies \text{ord}(j) \mid 4$, ciò unito al fatto che:

$$\text{ord}(j^2) = \frac{\text{ord}(j)}{(2, \text{ord}(j))} = \text{ord}(i^2) = 2$$

implica che $\text{ord}(j) = 4$. Dunque abbiamo due gruppi ciclici di ordine 4, $\langle i \rangle$ e $\langle j \rangle$, con $\langle i \rangle \cap \langle j \rangle = \{1, i^2 = j^2\}$.

Dalla presentazione del gruppo, sappiamo che $Q_8 = \langle i \rangle \langle j \rangle$ dunque possiamo stabilire l'ordine:

$$|Q_8| = |\langle i \rangle \langle j \rangle| = \frac{|\langle i \rangle| |\langle j \rangle|}{|\langle i \rangle \cap \langle j \rangle|} = \frac{4 \cdot 4}{2} = 8$$

quindi il gruppo dei quaternioni ha 8 elementi, dati da:

$$Q_8 = \{1, i, j, i^2 = j^2, i^3, j^3, ij, i^3j\}$$

Osservazione 1.105 — Q_8 non è abeliano perché:

$$ij = j^3i = j^{-1}i \neq ji$$

Osservazione 1.106 — Osserviamo che $\langle i \rangle, \langle j \rangle \triangleleft Q_8$ perché hanno indice 2, inoltre $\langle i^2 \rangle, \langle j^2 \rangle \triangleleft Q_8$ (per verifica diretta).

Ricordando che un sottogruppo di ordine 2 è normale se e solo se è un sottogruppo di $Z(G)$ ¹⁸, possiamo osservare che:

Osservazione 1.107 — $\langle i^2 \rangle = Z(Q_8)$, infatti, per quanto detto si deve avere che $\langle i^2 \rangle \leq Z(Q_8)$, inoltre Q_8 è un p -gruppo non abeliano, ed essendo $|Q_8| = p^3$ segue che:

$$|Z(Q_8)| = \begin{cases} 1 & \text{assurdo per quanto detto sui } p\text{-gruppi} \\ p & \text{ma allora } Q_8/Z(Q_8) \text{ ciclico} \implies Q_8 \text{ abeliano} \\ p^3 & \implies Z(Q_8) = Q_8, \text{ assurdo} \end{cases}$$

ovvero $|Z(Q_8)| = 2$ e quindi è proprio $\langle i^2 \rangle$.

Posto convenzionalmente $ij = k$, gli elementi si possono riscrivere anche come:

$$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$$

con $i^2 = -1, i^3 = -i, j^2 = -1, j^3 = -j$.

¹⁸Infatti, preso $H = \{e, h\} \leq G$, allora $ghg^{-1} = H, \forall g \in G$, ovvero $ghg^{-1} \in H \iff ghg^{-1} = h \iff gh = hg, \forall g \in G$, dunque $h \in Z(G)$ (nel caso in cui $ghg^{-1} = e$, allora $h = e$, e ovviamente appartiene al centro), pertanto $H \leq Z(G)$.

Osservazione 1.108 (Prodotto in Q_8) — I prodotti tra gli elementi di Q_8 seguono il 3-ciclo:



che percorso in senso orario ci dà i prodotti:

$$ij = k \quad jk = i \quad ki = j$$

ed in senso antiorario:

$$ji = -k \quad ik = -j \quad kj = -i$$

Le operazioni fatte in questo modo sono equivalenti a quelle che si ottengono con le regole di commutazione della presentazione, ad esempio:

$$k^2 = (ij)^2 = ijij = ijj^3i = i^2$$

Osservazione 1.109 (Ordine degli elementi) — Dunque in Q_8 1 ha ordine 1, -1 ha ordine 2, mentre $i, -i, j, -j, k, -k$ hanno ordine 4.

Abbiamo visto che Q_8 è un gruppo di ordine 8 non è abeliano, e per quanto detto $Q_8 \not\cong D_4$, poiché Q_8 ha sei elementi di ordine 4, mentre D_4 ne ha soltanto uno.

Osservazione 1.110 (Sottogruppi di Q_8) — Per quanto riguarda i sottogruppi di Q_8 osserviamo in primis che $\langle -1 \rangle = Z(Q_8)$ ed è caratteristico (perché è il centro oppure perché è l'unico sottogruppo di ordine 2); $\langle i \rangle, \langle j \rangle, \langle k \rangle$ sono sottogruppi di ordine 4, dunque sono normali. Abbiamo quindi dimostrato che tutti i sottogruppi (incluso ovviamente quelli banali) di Q_8 sono normali.

Concludiamo la discussione su Q_8 osservando che non può essere prodotto semidiretto di due suoi sottogruppi, infatti $\forall H_1, H_2 \leq Q_8$ si ha $H_1 \cap H_2 \neq \{1\}$, infatti, l'intersezione contiene sempre il sottogruppo $\{1, -1\}$.

Esercizio 1.111. Dimostrare che $Q_8 \hookrightarrow GL_2(\mathbb{C})$.

Soluzione.

□

A questo punto siamo pronti per classificare tutti i gruppi di ordine 8:

Esempio 1.112 (Classificazione dei gruppi di ordine 8)

Distinguiamo innanzitutto i gruppi in base all'abelianità:

- Se G è abeliano, allora per il nel [Teorema di Struttura](#) abbiamo che $G \cong G(2)$ e per la 2-componente abbiamo le seguenti possibilità:

$$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \quad \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

- Se G non è abeliano, allora ha almeno un elemento di ordine 4 (se avesse tutti elementi di ordine 2 sarebbe isomorfo a $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$), sia $a \in G$ tale che $\text{ord}(a) = 4$, allora $\langle a \rangle \triangleleft G$ e:

$$G/\langle a \rangle = \{\langle a \rangle, b\langle a \rangle\} \quad b \in G \setminus \langle a \rangle$$

dove deve essere $b^2\langle a \rangle = \langle a \rangle$, infatti se fosse $b^2\langle a \rangle = b\langle a \rangle \implies b\langle a \rangle = \langle a \rangle \implies b \in \langle a \rangle$, che è assurdo, dunque:

$$b^2\langle a \rangle = \langle a \rangle \implies b^2 \in \{e, a, a^2, a^3\}$$

ma non può essere che $b^2 = a, a^3$, altrimenti b avrebbe ordine 8, dunque rimangono soltanto i casi $b^2 = 1$ e $b^2 = a^2$.

- (1) Se $a^4 = 1$ e $b^2 = 1$, allora $G = \{1, a, a^2, a^3, b, ba, ba^2, ba^3\}$ da cui (si verificano facilmente le ipotesi del [Teorema 1.78](#)) segue:

$$G \cong \langle a \rangle \rtimes_{\varphi} \langle b \rangle \cong D_4$$

dove $\varphi : \langle b \rangle \longrightarrow \text{Aut}(\langle a \rangle) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} : b \longmapsto \varphi_b$ e $\varphi_b : \langle a \rangle \longmapsto \langle a \rangle : a \longmapsto a^{-1}$ (ovvero $\varphi_b = -id$, se avessimo scelto l'identità avremmo ottenuto uno dei prodotti diretti già visti sopra).

- (2) Se $a^4 = 1$ e $b^2 = a^2$, osserviamo che $bab^{-1} \in \langle a \rangle$ (essendo il generato da a normale in G), inoltre non può essere che $bab^{-1} = 1$ (altrimenti $a = 1$) o $bab^{-1} = a^2$ (poiché il coniugio conserva l'ordine degli elementi) e non può nemmeno essere che $bab^{-1} = a$ (poiché abbiamo supposto che G non sia commutativo). Pertanto abbiamo necessariamente $bab^{-1} = a^3 \iff ba = a^3b$, da cui segue:

$$G \cong Q_8$$

dove l'isomorfismo manda $a \longmapsto i$ e $b \longmapsto j$.

Dunque i gruppi di ordine 8 sono:

$$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \quad \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad D_4 \quad Q_8$$

Esercizio 1.113. Determinare il minimo n tale che $Q_8 \hookrightarrow S_n$.

Soluzione. Osserviamo inizialmente che per il [Teorema di Cayley](#) $n \leq 8$ e che per quello di Lagrange l'ordine dell'immagine di Q_8 deve dividere quello di S_n , pertanto $n \geq 4$, dunque abbiamo un numero finito di possibilità:

$$S_4, S_5, S_6, S_7, S_8$$

Se Q_8 si immergesse in S_4 , con $|S_4| = 2^3 \cdot 3$, sarebbe un suo 2-Sylow; poiché D_n si immerge sempre in S_n ¹⁹, sappiamo che $D_4 \hookrightarrow S_4$, ed in particolare D_4 è un 2-Sylow di S_4 , ma ciò significa che Q_8 non è in S_4 , poiché non è un coniugato di D_4 .

Si ragiona in maniera analoga per S_5 , infatti $|S_5| = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ e $D_4 \subset S_4 \subset S_5$, dunque i due 2-Sylow di S_4 sono isomorfi a quelli di S_5 , ed ancora una volta ciò significa che Q_8 non si immerge nel gruppo.

Sia $|S_6| = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$, detto P_2 un 2-Sylow di S_6 , osserviamo che se fosse $Q_8 \hookrightarrow S_6$, dovremmo avere:

$$i \mapsto \sigma \quad j \mapsto \rho \quad k \mapsto \sigma\rho = \eta$$

con $\text{ord}(\sigma) = \text{ord}(\rho) = 4$ e $\sigma^2 = \rho^2 = \eta^2$, dove $\text{ord}(\sigma^2) = \text{ord}(\rho^2) = \text{ord}(\eta^2) = 2$. Osserviamo che le permutazioni di ordine 4 in S_6 possono essere soltanto 4-cicli o 4-cicli uniti a 2-cicli, mentre le permutazioni di ordine 2 sono prodotto di trasposizioni (al più tre, essendo in S_6).

Osservazione 1.114 — Osserviamo che una permutazione è un quadrato se e solo se i cicli di lunghezza pari compaiono a coppie. Infatti:

- Se η è un k -ciclo, con k dispari, η è un quadrato di un k -ciclo, ovvero:

$$\eta = \eta^{k+1} = \left(\eta^{\frac{k+1}{2}} \right)^2$$

Se η è un k -ciclo, con k pari, allora si verifica che:

$$(a_1 \dots a_k)(b_1 \dots b_k) = (a_1 b_1 \dots a_k b_k)^2$$

- Se $x^2 = (\eta_1 \dots \eta_2)^2 = \eta_1^2 \dots \eta_s^2$, allora otteniamo cicli di lunghezza dispari e coppie di cicli.

Ad esempio, in S_6 , una coppia di 3-cicli può essere sia un quadrato di un ciclo di lunghezza pari, sia il quadrato di altri due 3-cicli:

$$(1 \ 2 \ 3)(4 \ 5 \ 6) = (1 \ 4 \ 2 \ 5 \ 3 \ 6)^2 = ((1 \ 2 \ 3)(4 \ 5 \ 6))^2$$

mentre in S_4 una coppia di cicli di lunghezza pari può essere soltanto il quadrato di un 4-ciclo:

$$(1 \ 2)(3 \ 4) = ((1 \ 4 \ 2 \ 3))^2 = ((1 \ 3 \ 2 \ 4))^2$$

Dunque il fatto che $\sigma^2 = \rho^2 = \eta^2$ hanno ordine 2 (quindi sono fatte da sole trasposizioni) e che sono quadrati (quindi i cicli di lunghezza pari compaiono a coppie), ci dice che le trasposizioni sono prodotti di un numero pari di trasposizioni, pertanto l'unica possibilità è che:

$$\sigma^2 = \rho^2 = \eta^2 = (a \ b)(c \ d)$$

¹⁹In tal caso infatti basta mandare $x \in D_4$ nella corrispondente permutazione dei vertici.

Risolvendo $x^2 = (1\ 2)(3\ 4)$, otteniamo:

$$x_1 = (1\ 3\ 2\ 4) \quad x_2 = (1\ 4\ 2\ 3) \quad x_3 = (1\ 3\ 2\ 4)(5\ 6) \quad x_4 = (1\ 4\ 2\ 3)(5\ 6)$$

abbiamo quindi 4 soluzioni in S_6 , mentre in Q_8 ne avevamo 6, pertanto nemmeno S_6 contiene una copia isomorfa di Q_8 .

Q_8 non si immerge nemmeno in S_7 perché i 2-Sylow di S_7 sono isomorfi a quelli di S_6 , e quindi siamo nello stesso caso di prima.

Dunque per esclusione deve essere necessariamente che:

$$Q_8 \hookrightarrow S_8 \implies n = 8$$

Per Cayley l'immersione è di Q_8 in $S(Q_8)$, dunque la mappa che realizza ciò è data da:

$$i \mapsto \varphi_i \quad \text{con} \quad \varphi_i : Q_8 \rightarrow Q_8 : x \mapsto ix$$

in particolare con la notazione dei cicli abbiamo che l'immagine di φ_i di Q_8 è data da:

$$(1\ i\ -1\ i)(j\ k\ -j\ -k)$$

analogamente per $\varphi_j(Q_8)$:

$$(1\ j\ -1\ -j)(i\ -k\ -i\ k)$$

e numerando in qualsiasi ordine gli elementi di Q_8 possiamo scrivere le permutazioni corrispondenti in S_8 :

$$i \mapsto (1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7\ 8) \quad j \mapsto (1\ 5\ 2\ 6)(3\ 8\ 4\ 7)$$

□

Esempio 1.115 (Classificazione dei gruppi di ordine 30)

Osserviamo che $|G| = 2 \cdot 3 \cdot 5$ e distinguiamo due casi:

- Se G è abeliano, allora per il [Teorema di Struttura](#) $G \cong G(2) \times G(3) \times G(5)$, dunque l'unica possibilità è che il gruppo sia ciclico:

$$G \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$$

- Se G non è abeliano, osserviamo che (in generale) $30 = 2d$, con d dispari, dunque G ha un sottogruppo di ordine 15, che è normale in quanto ha indice 2 ed è ciclico, in quanto è un gruppo di ordine pq con $p \nmid q - 1$, pertanto G contiene una copia isomorfa di $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$. Per [Cauchy](#) esiste un elemento di ordine 2 e quindi anche una copia isomorfa a $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ in G (in particolare potevamo prendere direttamente il 2-Sylow), dunque i due gruppi verificano le ipotesi del [Teorema 1.78](#), da cui: ^a

$$G \cong \mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

con:

$$\varphi : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}^* \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}^* \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

dove abbiamo che $[1]_2 \mapsto \varphi_y$, e adottando la notazione moltiplicativa, $\varphi_y : \mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}/15\mathbb{Z} : \bar{x} \mapsto \bar{x}^l$, abbiamo $\text{ord}(\varphi_y) \mid 2$, dunque ci sono due possibilità, o $\varphi_y = id$ (quindi $l = 1$), o $\varphi_y^2 = id \implies \varphi_y^2(x) = (x^l)^l = x^{l^2} = x$, da cui segue (essendo x un generatore di $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$):

$$l^2 \equiv 1 \pmod{15} \implies x \equiv \pm 1, \pm 4 \pmod{15}$$

Dunque, per $l = 1$ otteniamo il prodotto diretto già trovato sopra, per gli altri tre possibili l invece otteniamo 3 gruppi non isomorfi di ordine 30, infatti, per $l = -1$, abbiamo:

$$\varphi_y(x) = x^{-1} \iff yxy^{-1} = x^{-1} \implies \mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong D_{15}$$

Per $l = 4$ invece si ottiene $D_5 \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ e per $l = -4$ si ottiene $D_3 \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ ^b, i quali sono gruppi non isomorfi, ad esempio perché hanno centri diversi:

$$Z(D_{15}) = \langle id \rangle \quad Z(D_5 \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) = Z(D_5) \times Z(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

$$Z(D_3 \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

^aLa direzione del prodotto semidiretto è data dal fatto che $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ è l'unico normale tra i due sottogruppi.

^bAndrebbe aggiunto il perché ma non è chiarissimo dalle note della Del Corso.

I gruppi di ordine 30 sono quindi:

$$\mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \quad D_{15} \quad D_5 \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \quad D_3 \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

§2 Anelli

§2.1 Riepilogo sugli anelli

Definizione 2.1. Un **anello** è un insieme non vuoto munito di due operazioni $(A, +, \cdot)$ tali che:

- $(A, +)$ è un gruppo abeliano.
- \cdot è associativa.
- Valgono le leggi distributive a destra e sinistra:

$$a(b + c) = ab + ac \quad \text{e} \quad (a + b)c = ac + bc \quad \forall a, b, c \in A$$

Esempio 2.2 (Anelli)

Esempi di anelli:

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- Dato un anello A , $A[x]$, l'insieme dei polinomi a coefficienti in A è un anello.
- $M_{m \times m}(K)$.
- $\text{End}(G) = \text{Hom}(G, G)$, con G gruppo abeliano e le operazioni di somma e composizione.

Riepiloghiamo brevemente ²⁰ le definizioni che riguardano gli anelli: ²¹

Definizione 2.3. Un anello A si dice **commutativo** se l'operazione \cdot è commutativa.

Definizione 2.4. Un anello A si dice **con identità** se esiste $1 \in A$ elemento neutro per il prodotto.

Definizione 2.5. Un anello $(A, +, \cdot)$ si dice **campo** se $(A \setminus \{0\}, \cdot)$ è un gruppo abeliano.

Definizione 2.6. Un anello $(A, +, \cdot)$ si dice **corpo** se $(A \setminus \{0\}, \cdot)$ è un gruppo.

Definizione 2.7. Dato un anello A , $x \in A$ si dice **divisore di zero** se $\exists y \in A, y \neq 0$ tale che $xy = yx = 0$.

Definizione 2.8. Dato un anello A , $x \in A$ si dice **nilpotente** se $\exists n \in \mathbb{N}$ tale che $x^n = 0$.

Definizione 2.9. Dato un anello A , $x \in A$ si dice **invertibile** se $\exists y \in A$ tale che $xy = yx = 1$.

Definizione 2.10. Un anello A si dice **dominio d'integrità** se:

$$D(A) = \{x \in A \mid x \text{ è un divisore di } 0\} = \{0\}$$

Definiamo inoltre l'insieme degli elementi invertibili di A :

$$A^* = \{x \in A \mid x \text{ è invertibile}\}$$

e dei nilpotenti:

$$\mathcal{N} = \{x \in A \mid x \text{ è nilpotente}\}$$

²⁰In caso di dubbi sulle definizioni si può fare riferimento alle **dispense di Aritmetica** dove sono state trattate più ampiamente.

²¹Per convenzione adotteremo lo 0 per indicare l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ e l'1 per indicare l'elemento neutro rispetto all'operazione \cdot .

Esercizio 2.11. Calcolare i divisori di zero, gli invertibili ed i nilpotenti di:

$$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

Soluzione.

□

Proposizione 2.12

Dato A un anello commutativo con identità:

- (1) (A^*, \cdot) è un gruppo abeliano.
- (2) $A^* \cap D(A) = \emptyset$.
- (3) Se A è un anello finito, allora $A = D(A) \cup A^*$. In particolare, un dominio d'integrità finito è un campo.

Dimostrazione. Proviamo le affermazioni:

- (1) Per provare che (A^*, \cdot) è un gruppo abeliano, è sufficiente verificare le proprietà richieste dalla definizione:
 - (a) Chiusura: osserviamo che $\forall x, y \in A^*$, allora $\exists x^{-1}y^{-1} \in A$, pertanto $xy \in A^*$, poiché $y^{-1}x^{-1} \in A^*$.
 - (b) Associatività: poiché $A \subseteq A^*$, allora, essendo A associativo rispetto al \cdot , allora anche gli elementi di un suo qualsiasi sottoinsieme saranno associativi tra loro.
 - (c) Elemento Neutro: $1 \in A$, infatti, l'inverso di 1 è se stesso, quindi 1 è invertibile.
 - (d) Inverso: Segue per la stessa definizione di A^* che ogni suo elemento debba avere inverso moltiplicativo nel gruppo, $\forall x \in A, \exists x^{-1} \in A$:

$$x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1 \quad \forall x \in A$$

- (e) L'abelianità segue immediatamente dall'abelianità di A (infatti $A^* \subset A$, dunque l'abelianità vale in particolare per gli elementi di A^*).
- (2) Supponiamo per assurdo che $D(A) \cap A^* \neq \emptyset$, e consideriamo $x \in D(A) \cap A^*$, poiché $x \in D(A)$, allora $\exists z \in A, z \neq 0$, tale per cui:

$$xz = zx = 0$$

d'altra parte, poiché $x \in A^*$, allora $\exists x^{-1}$ tal per cui:

$$xy = yx = 1$$

da cui segue:

$$(zx)y = z(xy) \implies 0 \cdot y = z \implies z = 0$$

ma ciò è assurdo, pertanto l'ipotesi $D(A) \cap A^*$ è vuoto.

- (3) Il contenimento $D(A) \cup A^* \subseteq A$ è ovvio in quanto i primi due sono sottoinsiemi del primo, ci resta da verificare quello opposto. Sia $x \in A$, se $x \in D(A)$ abbiamo concluso, se $x \in A \setminus D(A)$, allora possiamo definire l'omomorfismo di gruppi:

$$\varphi_x : A \longrightarrow A : a \longmapsto xa$$

con:

$$\ker \varphi_x = \{y \in A \mid \varphi_x(y) = xy = 0\} = \{0\}$$

infatti, non essendo x un divisore di zero, l'unica possibilità, in base all'annullamento del prodotto è che $y = 0 \implies xy = 0$. Poiché $|A| < +\infty$ l'omomorfismo è anche surgettivo, dunque è una bigezione, pertanto $1 \in \text{Im} \varphi_x \implies \exists a \in A$ tale che $\varphi_x(a) = xa = 1 \implies x \in A^*$.

□

Definizione 2.13. Dato $B \subset A$ non vuoto, si dice che B è un **sottoanello** di A se è chiuso rispetto alle operazioni $+$ e \cdot ristrette a B .

Definizione 2.14. Dato $I \subset A$, con A anello commutativo, si dice che I è un **ideale** di A se:

- $(I, +) < (A, +)$.
- Vale la **proprietà di assorbimento** a destra e sinistra:²²

$$aI \subset I \quad \text{e} \quad Ia \subset I \quad \forall a \in A$$

Osservazione 2.15 — Per verificare che un sottoinsieme di un anello commutativo con identità è un ideale ci basta verificare soltanto che $(I, +)$ è chiuso per l'operazione $+$ e che valga la proprietà di assorbimento, infatti, da ciò segue che $(-1)a \in I$, dove (-1) esiste in A è un gruppo rispetto al $+$.^a

^aDa questo momento in poi, anche se non specificato assumiamo di star operando sempre in un anello commutativo con identità.

Esempio 2.16 (Ideali)

Gli ideali vanno ricercati tra i sottogruppi di un anello, ad esempio:

- Considerando l'anello \mathbb{Z} , abbiamo gli ideali dati da $\{n\mathbb{Z}\}_{n \in \mathbb{N}}$, infatti:

$$xn\mathbb{Z} \subset n\mathbb{Z} \quad \forall x \in \mathbb{Z}$$

ed essendo \mathbb{Z} abeliano, abbiamo un ideale.

- I sottogruppi $\{0\}$ (ideale **banale**) e A (ideale **improprio**) sono ideali dell'anello A .

Esercizio 2.17. Dato l'anello delle matrici $A = M_{n \times n}(K)$ dimostrare che non ha ideali bilateri diversi da $\{0\}$ e A .

Soluzione. Sia $J \subseteq A$ un ideale non banale e $M \in J$ non nulla. Osserviamo che l'Algoritmo di Gauss applicato ad M può essere espresso come moltiplicazione di M a sinistra e a destra per opportuni elementi di A . Dunque, se $k = \text{rk } M > 0$, la matrice

$$N = \left(\begin{array}{c|c} I_k & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$$

²²Se A non è un anello commutativo e $(I, +) < (A, +)$, possono valere separatamente le proprietà di assorbimento, nel caso in cui valga $aI \subset I, \forall a \in A$, si parla di **ideale sinistro**, mentre nel caso $Ia \subset I, \forall a \in A$, si parla invece di **ideale destro**.

appartiene a J . Allora anche

$$N' = N \left(\frac{1}{0} \middle| \frac{0}{0} \right) = \left(\frac{1}{0} \middle| \frac{0}{0} \right)$$

è elemento di J . Coniugando N' per matrici di permutazione di base troviamo nell'ideale matrici diagonali con diagonale nulla tranne per un 1 nella i -esima riga per ogni i , e sommando tutte queste matrici otteniamo $I_n \in J$, ovvero $J = A$.²³ \square

Definizione 2.18. Dato un sottoinsieme non vuoto di un anello $S \subset A$, si definisce **ideale generato** da S in A :

$$(S) := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i s_i \middle| a_i \in A, s_i \in S, n \in \mathbb{N} \right\}$$

Osserviamo che se $S = \{x\}$ possiamo definire l'ideale generato da un elemento:

$$(x) = \{ax \mid a \in A\} = Ax$$

in tal caso l'ideale prende anche il nome di **ideale principale**.

Proposizione 2.19

L'ideale generato da un sottoinsieme S di un anello A è un ideale.

Dimostrazione. Per verificare che un ideale generato sia effettivamente un ideale, bisogna verificare che sia un sottogruppo del gruppo abeliano $(A, +)$ e che valga la proprietà di assorbimento (bilaterale in questo caso, poiché stiamo operando nel caso di anelli commutativi). Presi $x, y \in S$, ovvero della forma:

$$x = \sum_{i=1}^n a_i s_i \quad \text{e} \quad y = \sum_{j=1}^m \alpha_j \sigma_j \quad a_i, \alpha_j \in A \quad s_i, \sigma_j \in S$$

si osserva che:

$$x + y = \sum_{i=1}^n a_i s_i + \sum_{j=1}^m \alpha_j \sigma_j \in (S)$$

dunque I è chiuso per la somma. Infine, per ogni $a \in A$ si ha:

$$ax = a \sum_{i=1}^n a_i s_i = \sum_{i=1}^n \underbrace{aa_i}_{\in A} s_i \in (S)$$

dunque (S) è un ideale. \square

Esempio 2.20 (Ideali generati)

Alcuni esempi di ideali generati possono essere:

- $n\mathbb{Z} = (n)$, con $n \in \mathbb{Z}$.
- Dato $K \subset F$ e $\alpha \in F$ algebrico su K , sia $\mu_\alpha(x) \in K[x]$ il polinomio minimo di α , sappiamo che:

$$(\mu_\alpha(x)) = \{p(x) \in K[x] \mid p(\alpha) = 0\}$$

²³Dimostrazione proposta da Davide Ranieri.

§2.2 Operazioni tra ideali

Proposizione 2.21 (Operazioni tra ideali)

Dato A un anello commutativo e $I, J \subset A$ ideali, abbiamo che:

- $I \cap J$ è un ideale.
- $I + J = (I, J) = \{i + j | i \in I, j \in J\}$ è un ideale.
- $IJ = (\{xy | x \in I, y \in J\})$ è un ideale.
- $\sqrt{I} = \{x \in A | \exists n \in \mathbb{N} : x^n \in I\}$ è un ideale. In particolare $\sqrt{0} = \mathcal{N}$ è un ideale.
- $(I : J) = \{x \in A | xJ \subseteq I\}$ è un ideale.

Dimostrazione. Verifichiamo tutte le affermazioni:

- $I \cap J$ è un sottogruppo di A e, $\forall x \in I \cap J$ si ha:

$$ax \in I \quad \text{e} \quad ax \in J \quad \forall a \in A$$

dunque $I \cap J$ assorbe e quindi è un ideale (bilatero in quanto abbiamo supposto l'anello commutativo).

- Dato $I + J = \{i + j | i \in I, j \in J\}$, presi $x, y \in I + J$, ovvero:

$$x = i_1 + j_1 \quad \text{e} \quad y = i_2 + j_2 \implies x + y = \underbrace{(i_1 + i_2)}_{\in I} + \underbrace{(j_1 + j_2)}_{\in J} \in I + J$$

inoltre, $\forall a \in A$ si ha che:

$$ax = \underbrace{ai_1}_{\in I} + \underbrace{aj_1}_{\in J} \in I + J \quad \forall x \in I + J$$

dunque $I + J$ è un ideale. Verifichiamo che $I + J = (I, J)$; osserviamo che ovviamente:

$$\forall i + j \in I + J, i + j \in (I, J) \implies I + J \subseteq (I, J)$$

per verificare l'altro contenimento bisogna verificare che $I, J \subset I + J$ e da queste inclusioni e dal fatto che $I + J$ è un ideale segue che $I + J$ contiene il più piccolo ideale di A che contiene sia I che J (e quindi contiene il loro generato). Osserviamo innanzitutto che in generale:

$$(S) = \bigcap_{\substack{S \subseteq X \subseteq A \\ X \text{ ideale}}} X$$

dove l'intersezione è appunto il più piccolo ideale di A che contiene S . Dobbiamo dimostrare ora quanto detto; osserviamo che (S) è contenuto nell'intersezione in quanto è uno dei termini di quest'ultima; il contenimento opposto segue dal fatto che $\forall x \in S$ si ha $x = \sum a_i s_i \in X$ (poiché X è un ideale che contiene S , per come l'abbiamo definito), d'altra parte, per vedere che un ideale generato (S) è contenuto a sua volta in un ideale \mathcal{I} di A , basta vedere che $S \subset \mathcal{I}$ (ed è ciò che abbiamo appena fatto con S). A questo punto, tornando all'inclusione iniziale, ci basta

verificare che, come abbiamo anticipato, $I + J$ contenga sia I che J ; essendo $0 \in J$ abbiamo:

$$I \subset I + J$$

infatti basta considerare sempre $j = 0$ per ottenere tutti gli elementi di I ; in maniera simmetrica si dimostra la stessa cosa per J , dunque $I, J \subset I + J \implies (I, J) \subset I + J \implies I + J = (I, J)$.

- $IJ = (\{xy | x \in I, y \in J\})$ è un ideale per definizione.
- Verifichiamo che $\sqrt{I} = \{x \in A | x^n \in I, n \in \mathbb{N}\}$ è un ideale, presi $x, y \in \sqrt{I}$, ovvero $x^n, y^m \in I$, $n, m \in \mathbb{N}$, vogliamo provare che $x + y \in \sqrt{I}$ (ovvero che esiste $d \in \mathbb{N}$ tale che $(x + y)^d \in I$), osserviamo che:

$$(x + y)^{n+m} = \sum_{i=0}^{n+m} \binom{n+m}{i} x^i y^{n+m-i}$$

dove $\forall i \in \{0, \dots, n+m\}$ si ha che $i \geq n \implies x^i \in I$, oppure che $n+m-i \geq m \implies y^{n+m-i} \in I$, dunque tutti i termini di $(x + y)^{n+m}$ stanno in I e quindi $x + y \in \sqrt{I}$. Osserviamo che $\forall a \in A$ si ha che:

$$(ax)^n = a^n \underbrace{x^n}_{\in I} \in I \implies ax \in \sqrt{I}$$

- Dato $(I : J) = \{x \in A | xJ \subseteq I\}$ e presi $x, y \in (I : J)$ si ha che:

$$(x + y)J = \underbrace{xJ}_{\subseteq I} + \underbrace{yJ}_{\subseteq I} \implies x + y \in (I : J)$$

inoltre, $\forall a \in A$ abbiamo:

$$axJ = a(xJ) \subseteq aI \subseteq I \implies ax \in (I : J) \quad \forall x \in (I : J)$$

□

Osservazione 2.22 ($I \cup J$) — $I \cup J$ in generale non è un ideale.

Osservazione 2.23 ($IJ \subset I \cap J$) — Osserviamo che $IJ \subset I \cap J$, infatti presi $x \in I$ e $y \in J$ si ha dalla proprietà di assorbimento che:

$$\underbrace{x}_{\in I} \underbrace{y}_{\in A} \in I \quad \text{e} \quad \underbrace{x}_{\in A} \underbrace{y}_{\in J} \in J \implies xy \in I \cap J$$

Osservazione 2.24 ($IJ = I \cap J$) — Se $I + J = A$, allora $IJ = I \cap J$. Dall'ipotesi possiamo dedurre che:

$$i + j = 1$$

vogliamo verificare che $\forall x \in I \cap J$ si ha $x \in IJ$ (dall'osservazione precedente sappiamo già che $IJ \subset I \cap J$, quindi stiamo verificando il contenimento opposto), possiamo scrivere:

$$x \cdot 1 = x(i + j) = \underbrace{xi}_{\in IJ} + \underbrace{xj}_{\in IJ} \in IJ$$

dove l'appartenenza segue dal fatto che stiamo considerando la somma di due elementi in IJ (che è un gruppo additivo).

Esempio 2.25 (Operazioni tra ideali in \mathbb{Z})

Osserviamo che presi ad esempio gli elementi nell'intersezione degli ideali $m\mathbb{Z}$ e $n\mathbb{Z}$, questi sono i multipli comuni sia ad m che ad n in \mathbb{Z} , ovvero:

$$m\mathbb{Z} \cap n\mathbb{Z} = [m, n]\mathbb{Z}$$

Mentre, il prodotto tra i due ideali contiene gli interi multipli sia di m che di n :

$$m\mathbb{Z} \cdot n\mathbb{Z} = mn\mathbb{Z}$$

Osserviamo poi che la somma è data da tutti gli interi multipli del loro M.C.D.:

$$m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = (m, n)\mathbb{Z}$$

infatti, per l'identità di Bézout, si ha:

$$m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = \{am + bn | a, b \in \mathbb{Z}\} = \{dx | x \in \mathbb{Z}\}$$

Consideriamo ora $n = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$, possiamo considerare:

$$\sqrt{n\mathbb{Z}} = p_1 \dots p_r \mathbb{Z}$$

poiché:

$$\sqrt{n\mathbb{Z}} = \{x \in \mathbb{Z} | x^k \in n\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}\} = \{x \in \mathbb{Z} | n \mid x^k, k \in \mathbb{Z}\}$$

ma $n \mid x^k \implies p_i \mid x^k, \forall i \in \{1, \dots, r\}$, ovvero $p_1 \dots p_r \mid x \implies x \in p_1 \dots p_r \mathbb{Z}$. Viceversa $x = p_1 \dots p_r m \in \sqrt{n\mathbb{Z}}$ perché, detto $e = \max e_i$:

$$x^e = p_1^e \dots p_r^e m^e = ny \in n\mathbb{Z}$$

quindi ad esempio:

$$\sqrt{100\mathbb{Z}} = 10\mathbb{Z}$$

Infine, osserviamo che:

$$(m\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}) = \frac{m}{(m, n)}\mathbb{Z}$$

quindi ad esempio:

$$(75\mathbb{Z} : 18\mathbb{Z}) = \frac{75}{(75, 18)} = 25\mathbb{Z}$$

questo poiché:

$$(75\mathbb{Z} : 18\mathbb{Z}) = \{x \in \mathbb{Z} | 18x\mathbb{Z} \subset 75\mathbb{Z}\} = 25\mathbb{Z}$$

infatti $18x\mathbb{Z} \subset 75\mathbb{Z} \iff 75 \mid 18x \iff 25 \mid 6x \iff 25 \mid x$.

Proposizione 2.26 (Proprietà ideali propri)

Valgono i seguenti fatti:

- (1) Dato $I \subset A$ ideale, I è un **ideale proprio** ($I \subsetneq A$) se e solo se $I \cap A^* = \emptyset$.
- (2) A è un campo se e solo se gli unici ideali di A sono $\{0\}$ e A .

Dimostrazione. Dimostriamo singolarmente i fatti:

- (1) Se $I \cap A^* = \emptyset$, poiché vale sempre che $1 \in A^*$, allora c'è almeno un elemento di A che non sta nell'ideale, quindi $I \subsetneq A$. Viceversa, sia I ideale proprio e supponiamo $x \in I \cap A^*$, allora x è invertibile, dunque $\exists y \in A$ tale che $xy = 1$, ma:

$$1 = \underbrace{x}_{\in I} \underbrace{y}_{\in A} \in I \implies a \cdot 1 \in I^{24} \quad \forall a \in A \implies A \subset I$$

che è assurdo in quanto avevamo supposto $I \subsetneq A$, dunque $I \cap A^* = \emptyset$.

- (2) A è un campo se e solo se $A^* = A \setminus \{0\}$, ma per il punto (1) l'unico elemento fuori da A^* è 0, dunque $I = \{0\}$ e $I = A$ sono gli unici ideali che possiamo avere.

□

²⁴In pratica se c'è l'identità in I c'è esattamente ogni elemento dell'anello che contiene l'ideale.

§2.3 Anelli quoziente e omomorfismi di anelli

Definizione 2.27. Dati A e B anelli, $f : A \longrightarrow B$ è un **omomorfismo di anelli** se:

- $f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2), \forall a_1, a_2 \in A.$
- $f(a_1 a_2) = f(a_1) f(a_2), \forall a_1, a_2 \in A.$

Osservazione 2.28 — Se A e B sono anelli commutativi con identità in genere si richiede anche:

$$f(1_A) = 1_B$$

poiché tale condizione non è già implicata da altro; ad esempio:

$$f(a) = f(1_A a) = f(1_A) f(a) \implies f(a) - f(1_A) f(a) = (1_B - f(1_A)) f(a) = 0$$

ma non abbiamo la legge di cancellazione in quanto non è detto che A sia un dominio d'integrità. Se B è un dominio e $f(a) \neq 0$, allora, da quanto detto sopra segue $f(1_A) = 1_B$, ma se $f(A) \subset D(B)$ non è detto che $f(1_A) = 1_B$.

Definizione 2.29. Sia A un anello e $I \subseteq A$ un suo ideale, il gruppo quoziente $(A/I, +)$ ha anche una struttura di anello con l'operazione:

$$(a + I) \cdot (b + I) \stackrel{\text{def}}{=} ab + I$$

Osservazione 2.30 — Si verifica facilmente che l'operazione è ben definita, infatti, presi:

$$a + I = a' + I \quad \text{e} \quad b + I = b' + I$$

segue:

$$(a' + I) \cdot (b' + I) = a'b' + I = (a + I)(b + I) + I = ab + I$$

Osservazione 2.31 — Si verifica facilmente che $(A/I, +, \cdot)$ è un anello.

Osservazione 2.32 — Possiamo definire una proiezione all'anello quoziente:

$$\pi_I : A \longrightarrow A/I : a \longmapsto a + I$$

con π_I omomorfismo di anelli surgettivo e $\ker \pi_I = I$.

Proposizione 2.33

Gli ideali sono tutti e soli i nuclei degli omomorfismi di anello definiti su A .

Dimostrazione. Sia $\varphi : A \longrightarrow B$ un omomorfismo di anelli, allora $\ker \varphi$ è un ideale di A , infatti $\ker \varphi < A$ perché φ è in particolare un omomorfismo di gruppi, inoltre, $\forall a \in A$ si ha che:

$$ax \in \ker \varphi \quad \forall x \in \ker \varphi$$

in quanto $\varphi(ax) = \varphi(a)\varphi(x) = \varphi(a) \cdot 0 = 0$; dunque i nuclei degli omomorfismi di anelli sono ideali. Viceversa, tutti gli ideali sono nuclei degli omomorfismi di proiezione al quoziente π_I . \square

Teorema 2.34 (Teorema di Omomorfismo di Anelli)

Dati A, B anelli e $f : A \longrightarrow B$ omomorfismo (di anelli), esiste un unico omomorfismo (di anelli) φ che fa commutare il diagramma:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \pi \downarrow & \curvearrowright \varphi & \nearrow \\ A/\ker f & & \end{array}$$

cioè tale che $f = \varphi \circ \pi$, con φ iniettivo e $\text{Im } \varphi = \text{Im } f$.

Dimostrazione. Per il Teorema di Omomorfismo i gruppi, essendo f in particolare un omomorfismo di gruppi, posto $I = \ker f$, sappiamo che esiste ed è unico l'omomorfismo:

$$\varphi : A/I \longrightarrow B$$

tale che $f = \varphi \circ \pi_I$, con φ è iniettivo e $\text{Im } \varphi = \text{Im } f$. Non ci resta altro da fare che verificare che φ è anche un omomorfismo di anelli:

$$\varphi((a+I)(b+I)) = \varphi(ab+I) = f(ab) \quad \forall a, b \in A$$

viceversa:

$$f(ab) = f(a)f(b) = \varphi(a+I)\varphi(b+I) \quad \forall a, b \in I$$

dove la seconda uguaglianza è vera per ipotesi. \square

Lemma 2.35 (Gli ideali si comportano come i sottogruppi normali con gli omomorfismi)

Dato $f : A \longrightarrow B$ omomorfismo di anelli vale che:

- (1) $\forall J \subset B$ ideale si ha $f^{-1}(J)$ è un ideale di A .
- (2) Se f è surgettiva $\forall I \subset A$ ideale si ha $f(I)$ ideale di B

Dimostrazione. Dimostriamo le proposizioni:

- (1) Sappiamo già che $f^{-1}(J)$ è un sottogruppo di A , verifichiamo che valga la proprietà di assorbimento, ovvero:

$$af^{-1}(J) \subset f^{-1}(J) \quad \forall a \in A$$

sia $x \in f^{-1}(J) \implies f(x) \in J$, allora:

$$\underbrace{f(a)}_{\in B} \underbrace{f(x)}_{\in J} = f(ax) \in J \quad \forall x \in f^{-1}(J)$$

da cui $ax \in f^{-1}(J)$.

- (2) Sappiamo che $f(I)$ è un sottogruppo di B , verifichiamo l'assorbimento, sia $b \in B$, poiché f è surgettiva esiste $a \in A$ tale che $b = f(a)$, dunque:

$$bf(x) = f(a)f(x) = f(\underbrace{ax}_{\in I}) \in f(I)$$

□

Teorema 2.36 (Teorema di Corrispondenza tra Ideali)

Sia $I \subset A$ un ideale e π_I la proiezione all'anello quoziente modulo I , π_I induce una corrispondenza biunivoca tra gli ideali di A/I e gli ideali di A che contengono I , e tale corrispondenza preserva l'ordinamento.

Dimostrazione. Per il Teorema di Corrispondenza tra sottogruppi abbiamo già la bigezione tra questi, dobbiamo tuttavia verificare che restringendo la corrispondenza agli ideali questa associ ancora un ideale di A ad un ideale di A/I e viceversa, cioè l'immagine e la controimmagine di un ideale mediante π_I è ancora un ideale (in particolare, per la Corrispondenza tra Sottogruppi sappiamo già che le controimmagini contengono l'ideale per il quale si quozienta). Siano:

$$X = \{J \subseteq A \text{ ideale} \mid I \subset J\} \quad \text{e} \quad Y = \{\mathcal{J} \subset A/I \mid \mathcal{J} \text{ ideale}\}$$

per il [Lemma 2.35](#), essendo π_I surgettivo, si ha che le immagini e la controimmagini via π_I :

$$J \mapsto \pi_I(J) \quad \text{e} \quad \mathcal{J} \mapsto \pi_I^{-1}(\mathcal{J})$$

sono ideali, e ciò conclude la dimostrazione. □

Esempio 2.37

Se nel [Lemma 2.35](#) f non fosse surgettiva, allora l'immagine di un ideale non sarebbe un ideale, ad esempio presa:

$$f : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} : (2) \mapsto 2\mathbb{Z}$$

con $2\mathbb{Z}$ che non è un ideale di \mathbb{Q} perché \mathbb{Q} è un campo e quindi i suoi ideali sono soltanto $\{0\}$ e \mathbb{Q} .

Definizione 2.38. Dato un omomorfismo di anelli $f : A \longrightarrow B$ e un ideale $I \subset A$ definiamo **estensione** di I a B via f l'ideale generato in B da $f(I)$:

$$(f(I)) = f(I)B = IB$$

Definizione 2.39. Dato un omomorfismo di anelli $f : A \longrightarrow B$ e un ideale $J \subset B$ definiamo **contrazione** di J ad A via f l'ideale $f^{-1}(J)$.

Osservazione 2.40 — Gli omomorfismi sono sostanzialmente inclusioni a meno di isomorfismo, conoscendo la corrispondenza tra ideali indotta da π_I osserviamo che:

$$A \hookrightarrow B : I \mapsto IB$$

che manda ogni ideale nella propria estensione ad un **sovranello** e:

$$J \mapsto J \cap A$$

che manda ogni ideale di B nella propria contrazione ad un **sottoanello** fanno sì che l'applicazione:

$$\varphi : A \hookrightarrow B \longrightarrow B/J$$

sia tale che:

$$\ker \varphi = \{a \in A \mid \varphi(a) = a + J = J\} = \{a \in A \mid a \in J\} = J \cap A = \pi_I^{-1}(J)$$

da cui si ha anche che:

$$\frac{A}{J \cap A} \hookrightarrow B/J$$

per il Primo Teorema di Omomorfismo.

Osservazione 2.41 — Dal **Teorema di Omomorfismo di Anelli** si deducono anche il secondo ed il terzo teorema di omomorfismo, ovvero:

$$\frac{A/I}{J/I} \cong A/J \quad \text{e} \quad \frac{I+J}{J} \cong \frac{I}{I \cap J}$$

dove in entrambi i casi gli isomorfismi sono di anelli.

§2.4 Prodotto diretto di anelli

Definizione 2.42. Dati gli anelli A, B il prodotto cartesiano $A \times B$ può essere dotato di una struttura di anello con le operazioni:

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2) \quad \text{e} \quad (a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 \cdot a_2, b_1 \cdot b_2)$$

$\forall a_1, a_2 \in A, \forall b_1, b_2 \in B$, l'insieme $A \times B$ con queste operazioni si dice **prodotto diretto** di anelli.

Teorema 2.43 (Teorema Cinese Del Resto Per Anelli)

Dato A anello commutativo con unità, I, J suoi ideali, allora la mappa di doppia proiezione:

$$f : A \longrightarrow A/I \times A/J : a \longmapsto (a + I, a + J)$$

è un omomorfismo di anelli, con $\ker f = I \cap J$. Inoltre, $I + J = A$ se e solo se f è surgettiva, ed in tal caso si ottiene:

$$A/IJ \cong A/I \times A/J$$

Dimostrazione. Verifichiamo in primis che f sia un omomorfismo di anelli:

$$f(a+b) = ((a+b) + I, (a+b) + J) = (a + I, a + J) + (b + I, b + J) = f(a) + f(b) \quad \forall a, b \in A$$

dove la terza uguaglianza è assicurata dalla struttura di anello del quoziente; analogamente:

$$f(ab) = (ab + I, ab + J) = (a + I, a + J)(b + I, b + J) = f(a)f(b) \quad \forall a, b \in A$$

Osserviamo ora che:

$$\ker f = \{a \in A \mid f(a) = (a + I, a + J) = (I, J)\} = \{a \in A \mid a \in I, a \in J\} = I \cap J$$

Verifichiamo separatamente le due implicazioni della seconda parte del teorema:

- Supponiamo che $I + J = A$, ovvero che esistono i e j tali che $i + j = 1$ ²⁵, e verifichiamo che f è surgettiva. Per verificare che f è surgettiva dobbiamo far vedere che:

$$\forall a, b \in A, \exists x \in A : f(x) = (a + I, b + J)$$

per ipotesi sappiamo che $x \in A \implies x \in I + J$ quindi possiamo prendere $x = bi + aj \in A$, per $i \in I$ e $j \in J$, dunque:

$$f(x) = (\underbrace{bi}_{\in I} + aj + I, bi + \underbrace{aj}_{\in J} + J) = (aj + I, bi + J)$$

da cui, osservando che $j = 1 - i$ e $i = 1 - j$ per ipotesi abbiamo:

$$(aj + I, bi + J) = (a(1 - i) + I, b(1 - j) + J) = (a + I, b + J)$$

e pertanto abbiamo ottenuto $f(x) = (a + I, b + J)$.

²⁵Poiché l'identità è in $I + J$, allora per la proprietà di assorbimento ogni altro elemento di A è in $I + J$.

- Supponiamo ora che f sia surgettiva e proviamo che $I + J = A$. Se f è surgettiva abbiamo che:

$$\exists i \in A : f(i) = (I, 1 + J)$$

dunque per tale i si ha che:

$$i \in I \quad \text{e} \quad i \equiv 1 \pmod{J}$$

da cui si ricava che: $\underbrace{i}_{\in I} = 1 + \underbrace{j}_{\in J} \implies 1 \in I + J \implies I + J = A$.

Per il Primo Teorema di Omomorfismo abbiamo a questo punto che se f è surgettiva (ed equivalentemente $I + J = A$), allora:

$$\frac{A}{\ker f} \cong A/I \times A/J \implies \frac{A}{I \cap J} \cong A/I \times A/J$$

D'altra parte, per l'Osservazione 2.24, essendo $I + J = A$, allora $I \cap J = IJ$, da cui la tesi:

$$A/IJ \cong A/I \times A/J$$

□

Osservazione 2.44 — Per il Teorema Cinese Del Resto tra gruppi sapevamo che:

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff (m, n) = 1$$

per il Teorema Cinese Del Resto tra anelli ora sappiamo che:

$$f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

con $\ker f = m\mathbb{Z} \cap n\mathbb{Z} = [m, n]\mathbb{Z}$, da cui:

$$\mathbb{Z}/[m, n]\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

avevamo visto che f è surgettiva se e solo se $(m, n) = 1$, ed in questo modo $[m, n] = mn$ (o equivalentemente $n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z} = (n, m)\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$), dunque:

$$\mathbb{Z}/[m, n]\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

pertanto la nuova versione del Teorema Cinese del Resto è una generalizzazione della precedente.

§2.5 Ideali primi e massimali

Definizione 2.45. Sia (\mathcal{F}, \leq) un insieme parzialmente ordinato e sia $X \subset \mathcal{F}$ un suo sottoinsieme, diciamo che $M \in \mathcal{F}$ è un **maggiorante** per X se:

$$A \leq M \quad \forall A \in X$$

Definizione 2.46. Sia (\mathcal{F}, \leq) un insieme parzialmente ordinato, diciamo che $A \in \mathcal{F}$ è un elemento **massimale** per \mathcal{F} se:

$$\forall B \in \mathcal{F} : A \leq B \implies A = B$$

Definizione 2.47. Sia (\mathcal{F}, \leq) un insieme parzialmente ordinato, diciamo che $A \in \mathcal{F}$ si dice **massimo** per \mathcal{F} se:

$$\forall B \in \mathcal{F} : B \leq A$$

Definizione 2.48. Sia (\mathcal{F}, \leq) un insieme parzialmente ordinato, una **catena** di \mathcal{F} è un sottoinsieme di \mathcal{F} totalmente ordinato.

Definizione 2.49. Sia (\mathcal{F}, \leq) un insieme parzialmente ordinato, (\mathcal{F}, \leq) si dice **induttivo** se ogni catena di \mathcal{F} ammette un maggiorante in \mathcal{F} .

Lemma 2.50 (Lemma di Zorn)

Sia (\mathcal{F}, \leq) un insieme non vuoto, parzialmente ordinato e induttivo, allora \mathcal{F} contiene elementi massimali.

Osservazione 2.51 — Spesso il **Lemma di Zorn** viene usato su famiglie \mathcal{F} di ideali ordinati secondo la relazione di inclusione \subseteq .

Definizione 2.52. Dato un ideale proprio $I \subsetneq A$, I si dice **primo** se:

$$xy \in I \implies x \in I \vee y \in I \quad \forall x, y \in A$$

ovvero se ogni volta che contiene un prodotto, contiene uno dei due fattori.

Definizione 2.53. Un ideale I si dice **massimale** se è un elemento massimale della famiglia \mathcal{F} di tutti gli ideali propri di A , ovvero:

$$I \text{ è massimale} \iff \forall J \subsetneq A : I \subseteq J \implies I = J$$

Esempio 2.54 (Ideali primi di \mathbb{Z})

Gli ideali primi di \mathbb{Z} sono (p) con p primo, infatti:

$$xy \in (p) \iff p \mid xy \iff p \mid x \vee p \mid y$$

ovvero se $x \in (p)$ o $y \in (p)$. Se consideriamo invece (m) , con m non primo, dunque riducibile $m = ab$, con $1 < a < m$ e $1 < b < m$, allora:

$$ab \in (m) \quad \text{ma} \quad a \notin (m) \quad \text{e} \quad b \notin (m)$$

dunque (m) non è primo.

Proposizione 2.55 (Proprietà degli Ideali Massimali)

Dato un anello A allora:

- (1) Ogni ideale proprio di A è contenuto in un ideale massimale.
- (2) Ogni elemento non invertibile di A è contenuto in un ideale massimale.

Dimostrazione. Verifichiamo le affermazioni:

1. Sia $I \subsetneq A$ un ideale proprio e sia \mathcal{F} la famiglia di tutti gli ideali propri che lo contengono:

$$\mathcal{F} = \{J \subsetneq A \mid I \subseteq J\}$$

osserviamo che $I \in \mathcal{F} \implies \mathcal{F} \neq \emptyset$, inoltre (\mathcal{F}, \subseteq) è induttivo, infatti, detta \mathcal{C} una catena, essa sarà un sottoinsieme di \mathcal{F} totalmente ordinato della forma:

$$\mathcal{C} = \{J_n\}^{26} \subseteq \mathcal{F}$$

allora posta $\bigcup J_n^{27} = J \in \mathcal{F}$, verifichiamo che J è maggiorante di \mathcal{C} . Si ha che:

- $\forall J_n \in \mathcal{C} : J_n \subseteq J$, segue ovviamente da come abbiamo definito J , avendolo costruito come l'unione di tutti i J_n .
- $J \in \mathcal{F}$, poiché $I \subset J_n \subset J$, $\forall J_n \in \mathcal{F}$, e infine J è un ideale proprio, infatti, se per assurdo fosse $1 \in J = \bigcup J_n \implies \exists n$ tale che $1 \in J_n \subsetneq A$ che è assurdo (se un ideale contenesse l'identità del prodotto, allora conterrebbe tutti gli elementi dell'anello).

Dunque ogni catena \mathcal{C} di \mathcal{F} ammette maggiorante²⁸, pertanto \mathcal{F} è induttivo e vale il [Lemma di Zorn](#), per il quale la famiglia \mathcal{F} ammette almeno un elemento massimale M .

Resta da verificare che tale elemento massimale M sia un ideale massimale dell'anello (poiché abbiamo dimostrato che è massimale per la famiglia \mathcal{F} degli ideali che ne contengono uno proprio, la quale ovviamente non è la famiglia di tutti gli ideali propri di A), ciò segue subito osservando che, supponendo $L \subsetneq A$ ideale proprio con $M \subseteq L$, allora:

$$I \subseteq M \subseteq L \implies L \in \mathcal{F}$$

dunque L è un elemento della famiglia \mathcal{F} , e per la massimalità di M in \mathcal{F} , segue che $M = L$.

2. Segue immediatamente dal punto (1), infatti, sia $x \in A \setminus A^*$, allora per la [Proposizione 2.26](#) l'ideale generato da x è proprio, $(x) \subsetneq A$, e quindi vale il punto (1) appena dimostrato:

$$(x) \subseteq M \implies x \in M$$

con M ideale massimale di A .

□

²⁶I vari J_i sono contenuti tutti uno dentro l'altro "in catena".

²⁷Andrebbe dimostrato che l'unione di ideali in catena, analogamente a quanto accade per i sottogruppi, è un ideale.

²⁸Abbiamo verificato addirittura che tale maggiorante sia un massimo della catena.

Proposizione 2.56 (Caratterizzazione degli ideali primi e massimali)

Dato un ideale proprio di $I \subsetneq A$, allora:

- (1) I è primo se e solo se A/I è un dominio.
- (2) I è massimale se e solo se A/I è un campo.

Dimostrazione. Verifichiamo le affermazioni:

- (1) Presi $x, y \in A$, per definizione abbiamo che I è primo se e solo se $xy \in I \implies x \in I$ o $y \in I$, d'altra parte, A/I è un dominio se e solo se:

$$(x + I)(y + I) = xy + I = I \iff xy \in I \implies x \in I \text{ o } y \in I$$

ovvero se e solo se, quando un prodotto di elementi si annulla (quindi fa la classe laterale neutra in questo caso) uno dei due elementi è già nella classe laterale neutra dell'anello quoziente (quindi è già l'unico elemento neutro del prodotto, come richiesto dal fatto che l'anello sia un dominio), ma come si vede ciò è equivalente a dire che I è primo.

- (2) Per il (2) della [Proposizione 2.26](#) A/I è un campo se e solo se gli unici ideali che contiene sono quelli impropri, $\overline{(0)}$ e A/I , dunque per il [Teorema di Corrispondenza](#) ciò è equivalente a dire che gli ideali di A che contengono I sono soltanto A ed I stesso²⁹, ovvero I è un ideale massimale di A .

□

Corollario 2.57 (Caratterizzazione degli ideali primi e massimali 2)

Dato A un anello si ha:

- (1) A è un dominio se e solo se (0) è un ideale primo.
- (2) A è un campo se e solo se (0) è un ideale massimale.
- (3) I massimale $\implies I$ primo.

Dimostrazione. Proviamo le affermazioni:

- (1) Per l'(1) della [Proposizione 2.56](#) sappiamo che (0) è primo se e solo se $A/(0)$ è un dominio, ma:

$$A/(0) \cong A$$

da cui segue che A è un dominio.

- (2) Per il punto (2) della [Proposizione 2.56](#) sappiamo che (0) è massimale se e solo se $A/(0)$ è un campo, ma:

$$A/(0) \cong A$$

da cui segue che A è un campo.

²⁹Infatti si ha che $\pi_I^{-1}(A/I) = A$ e $\pi_I^{-1}(\overline{(0)}) = I$.

- (3) Per quanto detto nel (2) della [Proposizione 2.56](#), I è massimale se e solo se A/I è un campo, in particolare ciò significa che A/I è un dominio d'integrità, ma per l'(1) della [Proposizione 2.56](#) ciò è equivalente a dire che I sia primo.

□

Esempio 2.58 (\mathbb{Z} è un dominio ma non un campo)

Si osserva che l'ideale (0) è un ideale primo (poiché $xy \in (0) \iff xy = 0 \implies x \in (0) \text{ o } y \in (0)$, poiché \mathbb{Z} è un dominio), ma non massimale, infatti:

$$(0) \subset (m) \quad \forall m \in \mathbb{Z}$$

Corollario 2.59

La corrispondenza biunivoca tra ideali per mezzo della proiezione:

$$\pi_I : A \longrightarrow A/I$$

conserva ideali primi e massimali.^a

^aOvviamente gli ideali considerati devono contenere I , altrimenti non c'è nulla da preservare in arrivo.

Dimostrazione. Osserviamo preliminarmente che si ha $I \subseteq J \subseteq A$, dunque nella proiezione π_I si ha che:

$$J \longmapsto \pi_I(J) = J/I$$

Dobbiamo dimostrare che J è primo (massimale) in A se e solo se J/I è primo (massimale) in A/I . Per quanto detto nella [Proposizione 2.56](#) J primo (massimale) è equivalente al fatto che A/J sia un dominio (campo), e, ugualmente deve essere che $\frac{A/I}{J/I}$ è un dominio (campo) ma dal Secondo Teorema di Omomorfismo di Anelli si ha:

$$\frac{A/I}{J/I} \cong A/J$$

che in entrambi i casi verifica la tesi.

□

§2.6 Anello delle frazioni di un dominio

Definizione 2.60. Consideriamo un anello commutativo con identità A , che sia un dominio di integrità. Sia $S \subset A$ con le seguenti proprietà:

- $0 \notin S$.
- $1 \in S$.
- S è moltiplicativamente chiuso: $xy \in S, \forall x, y \in S$.

Il sottoinsieme S con queste proprietà si dice **parte moltiplicativa** di A .

Definizione 2.61. Dato un anello commutativo con identità A , che sia un dominio di integrità, e S la sua parte moltiplicativa, allora possiamo definire l'insieme delle **frazioni di un dominio**:

$$S^{-1}A = \left\{ \frac{a}{s} \mid a \in A, s \in S \right\} / \sim = \frac{A \times S}{\sim}$$

con la relazione \sim data da $\frac{a}{s} \sim \frac{b}{t} \iff at = bs$.³⁰

Osservazione 2.62 — La relazione \sim usata nella definizione precedente è una relazione di equivalenza, infatti:

- \sim è riflessiva in quanto $\frac{a}{s} \sim \frac{a}{s} \iff as = sa$, che è vero in quanto abbiamo supposto A commutativo.
- \sim è simmetrica in quanto $\frac{a}{s} \sim \frac{b}{t} \iff at = bs \iff \frac{b}{t} \sim \frac{a}{s}$.
- \sim è transitiva in quanto, dati $\frac{a}{s} \sim \frac{b}{t}$ e $\frac{b}{t} \sim \frac{c}{u}$ abbiamo che:

$$at = bs \quad \text{e} \quad bu = tc$$

da cui, moltiplicando la prima per u si ha:

$$aut = bus = tcu \implies aut = cts \iff t(au - cs) = 0$$

essendo per ipotesi A un dominio^a e $t \in S$ (dunque $t \neq 0$) segue:

$$au = cs \iff \frac{a}{s} \sim \frac{c}{u}$$

^aÈ importante notare che qui stiamo usando il fatto che A è un dominio.

³⁰Alternativamente possiamo scrivere la relazione come: $(a, s) \sim (b, t) \iff at = bs$, ed indicare con $\frac{a}{s}$ la classe di equivalenza dei due elementi.

Proposizione 2.63 (Anello delle frazioni di un dominio)

L'insieme delle frazioni di un dominio munito con le operazioni di:

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st} \quad \text{e} \quad \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st}$$

è un anello commutativo con identità.^a

^aCon l'identità data dall'elemento $1/1$.

Dimostrazione. Bisogna verificare in primis che le operazioni sono ben definite (in quanto le abbiamo definite tra classi di equivalenza), consideriamo $\frac{a}{s} \sim \frac{a'}{s'}$ e $\frac{b}{t} \sim \frac{b'}{t'}$, vogliamo verificare che le due somme:

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st} \quad \text{e} \quad \frac{a'}{s'} + \frac{b'}{t'} = \frac{a't' + b's'}{s't'}$$

diano lo stesso risultato; per ipotesi sappiamo che $as' = a's$ e $bt' = b't$, osserviamo che l'uguaglianza tra le due somme è vera se e solo se:

$$(at + bs)s't' = (a't' + b's')st$$

sviluppando l'LHS otteniamo:

$$att's' + bss't' = a'st't' + b'tss' = (a't' + b's')st$$

che dimostra che l'operazione $+$ è ben definita.³¹ □

Esempio 2.64 (Anello delle frazioni di \mathbb{Z})

Preso $A = \mathbb{Z}$ e $S = \{10^k\}_{k \geq 0}$ (si verifica facilmente che S rispetta le tre proprietà richieste dalla definizione) abbiamo che l'anello delle frazioni di \mathbb{Z} è dato da:

$$S^{-1}A = \left\{ \frac{z}{10^k} \mid z \in \mathbb{Z}, k \geq 0 \right\}$$

con ad esempio $\frac{5}{10} = \frac{1}{2} \in S^{-1}A$.

Osservazione 2.65 — Nel caso dell'esempio precedente si osserva che $\frac{2}{1} \in S^{-1}$ ed è invertibile:

$$\frac{2}{1} \cdot \frac{5}{10} = \frac{1}{1}$$

Proposizione 2.66 ($S^{-1}A$ come estensione di A)

Dato un anello A e il suo anello delle frazioni, l'applicazione:

$$f : A \longrightarrow S^{-1}A : a \longmapsto \frac{a}{1}$$

è un omomorfismo iniettivo di anelli.^a

^aDunque $A \subset S^{-1}A$, cioè $S^{-1}A$ è un'estensione di A .

³¹Le restanti (lunghe e noiose) 9 verifiche verranno aggiunte in seguito :).

Dimostrazione. Verifichiamo che f sia un omomorfismo di anelli:

$$f(a+b) = \frac{a+b}{1} = \frac{a}{1} + \frac{b}{1} = f(a) + f(b) \quad \forall a, b \in A$$

e analogamente:

$$f(ab) = \frac{ab}{1} = \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} = f(a)f(b) \quad \forall a, b \in A$$

Per l'iniettività studiamo il nucleo:

$$\ker f = \left\{ a \in A \mid f(a) = \frac{a}{1} = \frac{0}{1} \right\}^{32} = \{a \in A \mid a \cdot 1 = 0 \cdot 1 = 0\} = \{0\}$$

dunque l'omomorfismo è iniettivo. \square

Osservazione 2.67 ($S = A \setminus \{0\}$) — Se A è un dominio, allora $S = A \setminus \{0\}$ ^a è una parte moltiplicativa, infatti, $\forall x, y \in S$, ovvero $x \neq 0$ e $y \neq 0$, dunque $xy \in S$, $xy \neq 0$.

^aSarebbe A^* se A fosse finito.

Definizione 2.68. Dato un dominio A , definiamo **campo dei quozienti** di A :

$$S^{-1}A = Q(A)$$

l'anello delle frazioni con parte moltiplicativa $S = A \setminus \{0\}$.

Proposizione 2.69 ($A \subset Q(A)$)

Dato A dominio e la sua parte moltiplicativa $S = A \setminus \{0\}$, l'anello delle frazioni $S^{-1}A = Q(A)$ è il più piccolo campo che contiene A .

Dimostrazione. Verifichiamo prima che $Q(A)$ è un campo e poi la tesi:

- Per verificare che $Q(A)$ sia un campo, ci basta verificare che esistono gli inversi moltiplicativi, e ciò segue immediatamente dal fatto che $\forall a \in A$, $a \neq 0$, allora $\frac{1}{a} \in Q(A)$ (in questo modo tutti gli elementi di A , eccetto lo 0, possono essere scritti come $\frac{1}{a}$) ed è tale per cui:

$$\frac{a}{1} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{1}$$

- Per la [Proposizione 2.66](#) sappiamo già che $A \subset S^{-1}A$, ed ora abbiamo dimostrato che $S^{-1}A$ è un campo, ci resta da verificare che $S^{-1}A (= Q(A))$ sia effettivamente il più piccolo campo che contiene A . Sia K è un campo tale che $A \subset K$, allora $\frac{1}{a} \in K$, $\forall a \in A \setminus \{0\}$, ovvero K contiene tutti gli inversi degli elementi di A , allora, $\forall b \in A$, $\forall a \in A \setminus \{0\}$, cioè K contiene tutti gli elementi di $S^{-1}A$:

$$\frac{b}{a} \in K \implies Q(A) = S^{-1}A \subset K$$

pertanto, essendo contenuto in ogni campo che contiene A , e contenendolo a sua volta, $Q(A)$ è il più piccolo campo che contiene A . \square

³²Ricordiamo che $0/1$ è l'elemento neutro di $S^{-1}A$.

Esempio 2.70

Vediamo alcuni esempi di anelli delle frazioni di domini e campi quoziente:

- Consideriamo $A = \mathbb{Z}$, $S_1 = \{10^k\}_{k \geq 0}$ e $S_0 = A \setminus \{0\}$, allora si ha che:

$$\mathbb{Z} \subset S_1^{-1}\mathbb{Z} \subset S_0^{-1}\mathbb{Z} = Q(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$$

- Considerando $A = K[x]$ si ha che:

$$Q(A) = K(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f(x), g(x) \in K[x], g(x) \neq 0 \right\}$$

- Sia A un dominio e $P \subset A$ un suo ideale primo, possiamo considerare $S = A \setminus P$ che è una parte moltiplicativa, in quanto $0 \notin S$, $1 \in S$ e $\forall x, y \in S$ si ha:

$$x, y \notin P \implies xy \notin P$$

poiché P è primo, dunque $xy \in A \setminus P = S$. In questo caso indichiamo $S^{-1}A = A_P$ e prende il nome di **localizzato** dell'anello A all'ideale P .

Osservazione 2.71 — Dato il localizzato di A a P , A_P , si osserva che esso è un **anello locale**, ovvero un anello che ha un unico ideale massimale.

Esempio 2.72 (Localizzato di un ideale primo)

Se consideriamo $A = \mathbb{Z}$ e $P = 2\mathbb{Z}$, allora la parte moltiplicativa è data da $S = \mathbb{Z} \setminus 2\mathbb{Z}$ (i numeri dispari), da cui abbiamo che:

$$S^{-1}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{(2)} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \equiv 1 \pmod{2} \right\}$$

Esercizio 2.73. Dati $A = \mathbb{Z}$, $P = 2\mathbb{Z}$ e $S = \mathbb{Z} \setminus 2\mathbb{Z}$, verificare che l'ideale $(2)\mathbb{Z}_{(2)}$ è l'unico ideale massimale di $\mathbb{Z}_{(2)}$.

Soluzione. La tesi è equivalente a mostrare che $\mathbb{Z}_{(2)}^* = \mathbb{Z}_{(2)} \setminus (2)\mathbb{Z}_{(2)}$. Infatti, sappiamo già che $(2)\mathbb{Z}_{(2)}$ è un ideale, mentre qualunque ideale non contenuto in esso contiene necessariamente un elemento invertibile ed è perciò non proprio. Se $\frac{a}{b} \notin (2)\mathbb{Z}_{(2)}$ allora sia a che b sono dispari, dunque $\frac{b}{a} \in \mathbb{Z}_{(2)}$ ed è chiaramente l'inverso di $\frac{a}{b}$. Viceversa se $\frac{a}{b}$ è invertibile esiste $\frac{c}{d} \in \mathbb{Z}_{(2)}$ tale che $\frac{ac}{bd} = 1$, cioè $ac = bd$. Se uno tra a e c fosse pari lo sarebbe anche bd , e poiché 2 è primo uno tra b e d sarebbe pari, contraddicendo la definizione di $\mathbb{Z}_{(2)}$. Dunque $\frac{a}{b} \in \mathbb{Z}_{(2)} \setminus (2)\mathbb{Z}_{(2)}$.³³ \square

³³Dimostrazione proposta da Davide Ranieri.

Osservazione 2.74 (Elementi invertibili di $S^{-1}A$) — Osserviamo che gli invertibili dell'anello $S^{-1}A$ sono:

$$(S^{-1}A)^* = \left\{ \frac{a}{s} \mid \frac{s}{a} \in S^{-1}A \right\}$$

ovvero esistono $b \in A$ e $t \in S$ tali che $\frac{s}{a} = \frac{b}{t} \iff st = ab \in S$ (cioè esiste una scrittura di questo tipo in $S^{-1}A$, ma poiché non è detto che a appartenga ad S , sappiamo che, per quanto scritto, almeno un suo multiplo c'è), dunque:

$$(S^{-1}A)^* = \left\{ \frac{a}{s} \mid \exists b \in A \text{ t.c. } ab \in S \right\}$$

Ad esempio, nel caso di $A = \mathbb{Z}$ e $S = \{10^k\}_{k \geq 0}$, abbiamo che:

$$\frac{5}{10} = \frac{1}{2} \in (S^{-1}A)^* \quad \text{ma} \quad 2 \notin S$$

dunque $2 \in (S^{-1}A)^*$, poiché il suo inverso, $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$, ha una scrittura che rispetta la proprietà richiesta dall'insieme (e tale scrittura è appunto un multiplo di quella iniziale).

Osservazione 2.75 (Ideali di $S^{-1}A$) — Sia $I \subset A$ un ideale di A , possiamo costruire l'insieme:

$$S^{-1}I = \left\{ \frac{x}{s} \in S^{-1}A \mid x \in I, s \in S \right\} \cong \frac{I \times S}{\sim}$$

per tale insieme valgono le proprietà espresse dalla proposizione seguente.

Proposizione 2.76 (Ideali di $S^{-1}A$)

Sia $I \subset A$ e sia $S^{-1}A$ l'insieme costruito come sopra, allora:

- (1) $S^{-1}I$ è un ideale di $S^{-1}A$.
- (2) $\forall J \subset S^{-1}A, \exists I \subset A$ tale che $J = S^{-1}I$ (cioè ogni ideale di $S^{-1}A$ si ottiene da un ideale di A , considerandone il relativo anello delle frazioni).
- (3) $S^{-1}I$ è un ideale proprio di $S^{-1}A$ se e solo se $I \cap S = \emptyset$.
- (4) Sia P un ideale primo di A , con $P \cap S = \emptyset$, allora $S^{-1}P$ è un ideale primo di $S^{-1}A$.

Dimostrazione. Dimostriamo le singole affermazioni:

- (1) Per verificare che $S^{-1}I$ sia un ideale verifichiamo prima la chiusura per somma:

$$\frac{x}{s} + \frac{y}{t} = \frac{\overbrace{xt + ys}^{\in I}}{\underbrace{st}_{\in S}} \in S^{-1}I \quad \forall x, y \in I$$

dove l'appartenenza del numeratore deriva dal fatto che x, y siano elementi di un ideale. Per verificare la proprietà di assorbimento osserviamo che:

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{x}{t} = \frac{\overbrace{ax}^{\in I}}{\underbrace{st}_{\in S}} \in S^{-1}I \quad \forall \frac{a}{s} \in S^{-1}A$$

- (2) Sia $J \subset S^{-1}A$ un ideale, per quanto detto nella [Proposizione 2.66](#), sappiamo che $S^{-1}A$ è un'estensione di A , inoltre se consideriamo $f^{-1}(J)$, che per il [Lemma 2.35](#), sappiamo essere un ideale, ed in particolare una contrazione di J ad A , abbiamo che:

$$f^{-1}(J) = J \cap A = I \subset A$$

vogliamo mostrare che vale $J = S^{-1}I$. Osserviamo che $\forall x \in I$ si ha $f(x) = \frac{x}{1} \in J$, dunque:

$$\underbrace{\frac{1}{s}}_{\in S^{-1}A} \cdot \frac{x}{1} = \frac{x}{s} \in J \implies S^{-1}I \subseteq J$$

cioè per assorbimento di J ci sono tutti gli elementi di $S^{-1}I$. Viceversa si ha che $\forall \frac{x}{s} \in J$ possiamo scrivere:

$$\frac{x}{1} = \frac{x}{s} \cdot \frac{s}{1} \in J \implies x = f^{-1}\left(\frac{x}{1}\right) \in I$$

ovvero il numeratore di ogni elemento in $S^{-1}J$ è un elemento di I , dunque considerando l'anello delle frazioni $S^{-1}I$ esso contiene tutte quelle di $S^{-1}J$, da cui si conclude $\frac{x}{s} \in S^{-1}I \implies J \subseteq S^{-1}I$.

- (3) Dimostriamo la negazione³⁴, ovvero $S^{-1}I$ non proprio equivale a $S^{-1}I = S^{-1}A$, ma essendo il primo un ideale questo è vero se e solo se:

$$\frac{1}{1} \in S^{-1}I \iff \exists x \in I, \exists s \in S : \frac{1}{1} = \frac{x}{s}$$

che, per la relazione definita sugli anelli di frazioni è equivalente a chiedere che $I \ni x = s \in S \iff I \cap S \neq \emptyset$.

- (4) Sia P un ideale primo, se fosse $P \cap S \neq \emptyset$, allora per quanto visto al punto (3) non sarebbe proprio (e dunque nemmeno primo), viceversa, se $P \cap S = \emptyset$ vogliamo dimostrare che $S^{-1}P$ primo in $S^{-1}A$; consideriamo:

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} \in S^{-1}P$$

ciò è equivalentemente al fatto che $\exists \sigma \in S$ e $\exists p \in P$ tali per cui:

$$\frac{ab}{st} = \frac{p}{\sigma} \iff ab\sigma = \underbrace{p}_{\in P} st \in P \implies ab\sigma \in P$$

ma, essendo per ipotesi che $\sigma \in P$ e $P \cap S = \emptyset$, allora $ab \in P$, e poiché P è primo si deve avere $a \in P$ o $b \in P$, e quindi la frazione di uno dei due deve essere quella in $S^{-1}P$: $\frac{a}{s} \in S^{-1}P$ o $\frac{b}{t} \in S^{-1}P$ e quindi $S^{-1}P$ primo.

□

³⁴Poiché trattandosi di un'equivalenza logica va bene lo stesso.

§2.7 Divisibilità nei domini

Definizione 2.77. Sia A un dominio e siano $a, b \in A$, con $a \neq 0$, si dice che $a \mid b$ (a divide b) se:

$$\exists c \in A : b = ac$$

Osservazione 2.78 — Osserviamo che $a \mid b \iff (a) \subseteq (b)$, infatti:

$$a \mid b \iff \exists c \in A : b = ac \iff b \in (a) \iff (b) \subseteq (a)$$

Definizione 2.79. Dato A dominio e a, a' , diciamo che a ed a' sono **associati**, $a \sim a'$, se vale una delle seguenti tre condizioni equivalenti:

- (i) $a \mid a'$ e $a' \mid a$.
- (ii) $\exists u \in A^*$ tale che $a = ua'$.
- (iii) $(a) = (a')$.

Osservazione 2.80 (Equivalenza delle condizioni) — Osserviamo che le tre condizioni date sono equivalenti, infatti, per quanto riguarda (i) e (iii) si ha:

$$a \mid a' \iff (a') \subseteq (a) \quad \text{e} \quad a' \mid a \iff (a) \subseteq (a')$$

dunque se sono vere entrambe le condizioni (i) e (iii) sono equivalenti. Dobbiamo da verificare che (i) \implies (ii), dalle due divisibilità segue che:

$$a' = xa \quad \text{e} \quad a = ya' \implies a = yxa \implies a(1 - xy) = 0$$

poiché $a \neq 0$, ed A dominio per ipotesi si ha che $xy = 1 \implies y \in A^*$, ovvero la (ii). Viceversa, assumiamo (ii) e deduciamo (iii):^a

$$a = ua' \implies a \in (a') \implies (a') \subseteq (a)$$

con $u \in A^*$, pertanto $\exists v \in A^*$ tale che $uv = vu = 1$, moltiplicando la prima relazione per v si ottiene:

$$a' = va \implies a' \in (a) \implies (a) \subseteq (a')$$

e si conclude $(a) \subseteq (a')$.

^aA questo punto sappiamo che già che (i) e (iii) sono equivalenti, quindi non è necessario fare verifiche distinte.

Definizione 2.81. Dati $a, b \in A$ dominio, non entrambi nulli, diciamo che $d \in A$ è un **massimo comun divisore** per a e b se:

- (1) $d \mid a$ e $d \mid b$.
- (2) $\forall x \in A$ tale che $x \mid a$ o $x \mid b$, allora $x \mid d$.

Proposizione 2.82 (Gli M.C.D. di due elementi in un dominio sono associati)

Dati $d, d' \in A$, essi sono due massimi comun divisori di una stessa coppia di elementi a e b di A , $d = (a, b)$ e $d' = (a, b)$, se e solo se sono associati, $d \sim d'$.

Dimostrazione. Se d e d' sono due massimi comun divisori di a e b , allora vale che:

$$d \mid a \wedge d \mid b \quad \text{e} \quad x \mid a \wedge x \mid b \implies x \mid d$$

e contemporaneamente:

$$d' \mid a \wedge d' \mid b \quad \text{e} \quad x \mid a \wedge x \mid b \implies x \mid d'$$

dunque, considerando d , esso deve essere diviso da d' in quanto massimo comune divisore:

$$d = ud'$$

e simmetricamente:

$$d' = vd$$

da cui, sfruttando il fatto che A è un dominio segue:

$$d = ud' = uvd \implies d(1 - uv) = 0 \implies uv = 1 \implies u, v \in A^*$$

e quindi $d \sim d'$ per definizione. □

Definizione 2.83. Dato un dominio A e $x \in A$, con $x \notin A^* \cup \{0\}$, x si dice **primo** se $\forall a, b \in A$:

$$x \mid ab \implies x \mid a \vee x \mid b$$

Definizione 2.84. Dato un dominio A e $x \in A$, con $x \notin A^* \cup \{0\}$, x si dice **irriducibile** se $\forall a, b \in A$:

$$x = ab \implies a \in A^* \vee b \in A^*$$

Proposizione 2.85 (primo \implies irriducibile)

Dato A dominio, se x è primo, allora è irriducibile.

Dimostrazione. Supponiamo che:

$$x = ab$$

essendo x primo, allora $x \mid a$ o $x \mid b$, assumiamo (WLOG) che $x \mid a$, allora:

$$a = xc \implies x = bcx \implies x(1 - bc) = 0$$

poiché A è un dominio, e poiché $x \neq 0$ per ipotesi segue che:

$$bc = 1 \implies b, c \in A^*$$

in particolare ciò significa che x è irriducibile, in quanto scrivendolo come $x = ab$, abbiamo verificato che $b \in A^*$. □

Proposizione 2.86 (Caratterizzazione di primi ed irriducibili in domini)

Dato un dominio A si ha che:

- (1) x è primo se e solo se (x) è un ideale primo non nullo.
- (2) x è irriducibile se e solo se (x) è un ideale massimale nell'insieme degli ideali principali.

Dimostrazione. Verifichiamo entrambe le proprietà:

- (1) Sia (x) un ideale primo, ovvero:

$$ab \in (x) \iff a \in (x) \vee b \in (x)$$

ciò è equivalente al richiedere che $x \mid a$ o $x \mid b$, ovvero che x sia primo in A .

- (2) Dimostriamo separatamente le due implicazioni. Sia x irriducibile e supponiamo che sia $(x) \subseteq (y) \subsetneq A$, dunque $\exists z \in A$ tale che $x = yz$, sappiamo che $y \notin A^*$ (altrimenti sarebbe l'ideale contenebbe l'identità e avremmo $(y) = A$), poiché x deve essere irriducibile segue necessariamente che $z \in A^*$ e quindi $x \sim y$, cioè:

$$(x) = (y)$$

pertanto (x) è massimale tra gli ideali principali. Per il viceversa dimostriamo la contronominale; sia x riducibile, allora:

$$x = yz \quad \text{con } y, z \notin A^*$$

e per quanto detto segue che:

$$(x) \subsetneq (y) \subsetneq A$$

dove la seconda inclusione non può essere un'uguaglianza in quanto $y \notin A^* \implies 1 \notin (y)$, mentre la prima segue dal fatto che $z \notin A^*$ (e quindi x e y non sono associati), pertanto (x) non è massimale tra gli ideali principali.

□

Esempio 2.87

Osserviamo che se x è primo nel dominio d'integrità $A = K[x, y]$, allora:

$$A/(x) \cong K[y]$$

che sappiamo essere un dominio, dunque per la [Proposizione 2.56](#) (x) è primo. Poiché x è primo è anche irriducibile, quindi (x) è massimale tra gli ideali principali di A , ma non è un ideale massimale di A in quanto $K[y]$ non è un campo, infatti:

$$(x) \subsetneq (x, y) \subsetneq A$$

ovvero (x) non è massimale in quanto è contenuto nell'ideale proprio (x, y) .

§2.8 Domini euclidei (ED)

Definizione 2.88. Un dominio di integrità A si dice **dominio euclideo** (ED) se esiste una funzione:

$$d : A \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{N}$$

detta **grado**, con le seguenti proprietà:

- (i) $d(x) \leq d(xy)$, $\forall x, y \in A \setminus \{0\}$.
- (ii) $\forall x \in A$, $\forall y \in A \setminus \{0\}$, $\exists q, r \in A$ tali che:

$$x = yq + r$$

con $d(r) < d(y)$ ³⁵ oppure $r = 0$.

Osservazione 2.89 — In un dominio euclideo ogni elemento si può "ben approssimare" con un multiplo di ogni altro elemento. La funzione grado serve per dire cosa significa esattamente "approssimare bene".

Esempio 2.90 (Domini Euclidei)

Vediamo alcuni esempi di domini euclidei:

- (1) $(\mathbb{Z}, |\cdot|)$ è un dominio euclideo, infatti sappiamo che per le proprietà del valore assoluto vale che:

$$|xy| = |x||y| \geq |x| \quad \forall y \neq 0$$

ed esiste la divisione euclidea con il resto:

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}, \exists q, r \in \mathbb{Z} : x = qy + r$$

con $|r| < |y|$ oppure $r = 0$, la prima condizione posta non ci assicura l'unicità (infatti possiamo approssimare sia dal basso che dall'alto prendendo anche resti negativi), ma poiché sappiamo che in realtà vale:

$$0 \leq r < |y|$$

allora tale scrittura è unica.

- (2) $(K[x], \deg)$ è un dominio euclideo, infatti:

$$\deg(f(x)g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x) \geq \deg f(x)$$

e vale la divisione euclidea tra polinomi con resto:

$$\forall f(x), g(x) \in K[x], \exists q(x), r(x) \in K[x] : f(x) = g(x)q(x) + r(x)$$

con $\deg r(x) < \deg g(x)$ oppure $\deg r(x) = 0$.

- (3) $(\mathbb{Z}[i], N)$, l'anello degli **interi di Gauss**, $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib | a, b \in \mathbb{Z}\}$, con la norma data da:

$$N : \mathbb{Z}[i] \longrightarrow \mathbb{N} : (a + ib) \alpha \longmapsto N(\alpha) = \alpha \bar{\alpha} = a^2 + b^2$$

³⁵Ciò non assicura l'unicità di q ed r , ma non è richiesto dalla definizione.

Osserviamo che $\mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{Q}(i) \subset \mathbb{C}$, dunque $\mathbb{Z}[i]$ è un dominio. Osserviamo inoltre che valgono le proprietà richieste dalla definizione di dominio euclideo per la norma definita in precedenza:

$$N(\alpha\beta) = |\alpha\beta|^2 = |\alpha|^2|\beta|^2 \geq |\alpha|^2 = N(\alpha)$$

che è vera in quanto $|\beta|^2 = x^2 + y^2 \geq 1$. Per la proprietà (ii), vorremmo che $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, con $\beta \neq 0$, si può "approssimare" α con un multiplo di β ; abbiamo che $\frac{\alpha}{\beta} \in \mathbb{C}$, ma in generale non in $\mathbb{Z}[i]$, se $\frac{\alpha}{\beta} \in \mathbb{Z}[i]$, vogliamo trovare semplicemente il valore del rapporto in $\mathbb{Z}[i]$ (ed abbiamo che $r = 0$), se $\frac{\alpha}{\beta} \notin \mathbb{Z}[i]$, allora vogliamo scrivere:

$$\alpha = \beta q + r \quad \text{con} \quad N(r) < N(\beta)$$

Osserviamo il reticolo formato dai multipli di β nel piano complesso:³⁶




Figura 1: Reticolo dei multipli interi di β nel piano complesso.

Come si osserva α cade in un quadrato (compreso il bordo) e del quale $q\beta$ è il multiplo di β più vicino ad α , pertanto, scelto $q\beta$ abbiamo:

$$r = \alpha - q\beta$$

con $N(r) < \frac{1}{2}$ diagonale quadrato < lato = $N(\beta)$.

Proposizione 2.91 (Algoritmo di Euclide)

Dato un dominio euclideo A , $\forall a, b \in A$ non entrambi nulli esiste l'MCD (a, b) , determinato mediante l'algoritmo di euclide.

Dimostrazione. Poiché in un dominio euclideo esiste una funzione grado (che è appunto il caso generale del valore assoluto) ed è possibile la divisione euclidea con resto per definizione, allora vale l'Algoritmo di Euclide con la stessa dimostrazione già vista per \mathbb{Z} , e con in questo caso l'applicazione grado generica al posto del valore assoluto:

³⁶Immagine provvisoria, non appena ho tempo la disegno in TikZ.

- **L'algoritmo termina:** L'algoritmo termina perché la successione dei resti r_n è una successione a termini in \mathbb{N} strettamente decrescente, pertanto è definitivamente costante (in questo caso 0).
- **Correttezza dell'algoritmo:** Si dimostra l'algoritmo per induzione sul numero degli N passi richiesti. Sia $\mathcal{P}(n)$: "Se l'algoritmo termina in N passi, allora funziona.", per $N = 1$, si ha che:

$$a = qb + 0$$

con $b = r_0$ (ovvero $b \mid a$), e quindi $(a, b) = r_0$. Supponiamo per ipotesi induttiva che l'Algoritmo di Euclide funzioni per ogni numero di passi $m \leq N - 1$ e proviamo che è vero per N . Sia:

$$\begin{cases} a = qb + r_1 & 0 \leq r_1 < |b| \\ r_0 = q_1 r_1 + r_2 & 0 \leq r_2 < r_1 \\ \vdots \\ r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n & 0 \leq r_n < r_{n-1} \\ r_{n-1} = q_n r_n + 0 \end{cases}$$

possiamo applicare l'algoritmo di Euclide per (r_0, r_1) (in tal modo si ha una sequenza di $N - 1$ passi) ed ottenere $r_n = (b, r_1)$:

$$\begin{cases} r_0 = q_1 r_1 + r_2 & 0 \leq r_2 < r_1 \\ \vdots \\ r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n & 0 \leq r_n < r_{n-1} \\ r_{n-1} = q_n r_n + 0 \end{cases}$$

da cui $r_n = (b, r_1) = (b, a - q_0 b) = (a, b)$, dove l'ultima uguaglianza è giustificata dalla proprietà dell'M.C.D.

□

Proposizione 2.92 (Elementi invertibili)

Dato un dominio euclideo A , gli elementi di grado minimo sono gli elementi di A^* .

Dimostrazione. Consideriamo $d(A \setminus \{0\}) \subset \mathbb{N}$, ovvero l'immagine del dominio euclideo mediante l'applicazione grado, tale immagine è non vuota³⁷ ed è un sottoinsieme di \mathbb{N} , pertanto, per il Principio del Minimo ammette elemento minimo d_0 , sia $x \in A \setminus \{0\}$ un elemento nella controimmagine di d_0 , quindi tale che $d(x) = d_0$, tale elemento è quindi di grado minimo, vediamo che è invertibile. Sappiamo che $\forall y \in A \setminus \{0\}$ possiamo fare la divisione euclidea per x :

$$y = qx + r$$

ed in questo caso non può essere che $d(r) < d(x) = d_0$, in quanto abbiamo supposto d_0 minimo, dunque l'unica possibilità è che $r = 0$ e $y = qx$, in particolare, per $y = 1$, $\exists q \in A$ tale che:

$$1 = qx \implies x \in A^*$$

³⁷Praticamente è ovvio, altrimenti non avrebbe nemmeno senso parlare di A come dominio.

Viceversa, sia $x \in A^*$, allora $(x) = A$ (poiché in (x) vi è 1), pertanto, $\forall a \in A$:

$$a = qx \quad q \in A$$

inoltre, sappiamo per le proprietà del grado che $d(x) \leq d(qx)$, $\forall q \in A \setminus \{0\}$, ovvero:

$$d(x) \leq d(a) \quad \forall a \in A$$

quindi x è un elemento di grado minimo. □

Proposizione 2.93 (Ideali di un dominio euclideo)

Dato un dominio euclideo A , tutti gli ideali di A sono principali^a e generati da un elemento di grado minimo.

^aQuindi ogni dominio euclideo è un PID.

Dimostrazione. Sia $I \subset A$ un ideale, se $I = \{0\}$, allora è principale, altrimenti, preso $I \neq \{0\}$, vogliamo mostrare che I è generato da un singolo elemento di grado minimo. Sia $x \in I$ un elemento di grado minimo (esiste perché $d(I) \subset \mathbb{N}$ e non vuoto), allora è ovvio che $(x) \subseteq I$, viceversa, si ha che $\forall a \in A$ si può fare la divisione euclidea per x :

$$a = qx + r \quad d(r) < d(x) \vee r = 0$$

da cui segue che $r = a - qx \in I$ da cui $d(x) \leq d(r) \implies r = 0$, ovvero:

$$a = qx \in (a) \implies I \subseteq (a)$$

□

§2.9 Domini a ideali principali (PID)

Definizione 2.94. Un dominio A si dice a **ideali principali** (PID) se ogni ideale di A è principale:

$$\forall I \subseteq A, I \text{ ideale}, \exists x \in I : I = (x)$$

Proposizione 2.95 (Ideali primi di un PID)

Dato un dominio ad ideali principali A , gli unici ideali primi di A sono (0) e gli ideali massimali.

Dimostrazione. Dall'(1) del [Corollario 2.57](#) sappiamo che il fatto che A sia un dominio è equivalente al fatto che (0) sia un ideale primo, inoltre, dal (3) del [Corollario 2.57](#) sappiamo anche che tutti gli ideali massimali di un anello sono primi.

Viceversa, vogliamo dimostrare che gli ideali primi diversi da (0) di un dominio a ideali principali sono solo quelli massimali; sia P un ideale primo diverso da (0) , essendo in un PID si ha che $P = (x)$, verifichiamo che P è massimale osservando che, essendo A un dominio, per l'(1) della [Proposizione 2.86](#), P è primo se e solo se x è primo, e dunque x irriducibile (è vero in ogni dominio per la [Proposizione 2.58](#)). Essendo x irriducibile segue che (x) è massimale tra gli ideali principali di A (per il (2) della [Proposizione 2.86](#)), e poiché A è un PID (dunque tutti gli ideali sono principali), allora (x) è un ideale massimale per A . \square

Osservazione 2.96 (M.C.D. nei PID) — Se A è un PID e $x, y \in A$, non entrambi nulli, osserviamo che l'ideale generato da x e y deve essere tale che:

$$(x, y) = (d)$$

con d un M.C.D.^a di x e y . Infatti:

$$x \in (d) \quad \text{e} \quad y \in (d)$$

dunque $d \mid x$ e $d \mid y$, inoltre, se $c \mid x$ e $c \mid y$, allora $x, y \in (c)$, da cui:

$$(d) = (x, y) \subseteq (c) \implies d \in (c) \implies c \mid d$$

dunque d è un M.C.D. tra x ed y .

^aM.C.D. a meno di prodotto per elementi di A^* .

§2.10 Domini a fattorizzazione unica (UFD)

Definizione 2.97. Dato A un dominio, esso si dice **a fattorizzazione unica** (UFD) se $\forall x \in A$, $x \notin A^* \setminus \{0\}$ si scrive in modo unico, a meno dell'ordine di fattori e di moltiplicazione per elementi invertibili, come prodotto di elementi irriducibili.

Esempio 2.98 (Esempi di UFD)

Esempi noti di UFD sono il dominio degli interi \mathbb{Z} , e quello dei polinomi in un'ordinata a coefficienti in un campo $K[x]$.

Proposizione 2.99 (UFD $\Rightarrow \exists$ M.C.D.)

Sia A un dominio a fattorizzazione unica, allora presi $a, b \in A$, non entrambi nulli, esiste M.C.D. (a, b) .

Dimostrazione. Sia d il prodotto dei fattori irriducibili comuni fra a e b , presi con il minimo esponente con cui compaiono, allora per verifica diretta si mostra che d è l'M.C.D.³⁸ \square

Osservazione 2.100 — Osserviamo che nei tre tipi di domini analizzati esiste sempre l'M.C.D., ma con delle differenze:

- Se A è un dominio euclideo (ED): con l'algoritmo di Euclide si può determinare l'M.C.D. di due elementi:

$$d = (a, b) \quad a, b \in A$$

e i coefficienti $x_0, y_0 \in A$ per i quali vale l'identità di Bézout:

$$d = ax_0 + by_0$$

- Se A è un dominio a ideali principali (PID): sappiamo che presi due elementi si ha:

$$(a, b) = (d) \quad a, b, d \in A$$

con d che è l'M.C.D. tra a e b , ma non disponiamo di un algoritmo "facile" per poterlo determinare, tuttavia esistono $x_0, y_0 \in A$ tali che:

$$d = ax_0 + by_0$$

e ciò deriva semplicemente dal fatto che $d \in (a, b)$, dunque si può scrivere come loro combinazione lineare (ugualmente però non disponiamo di algoritmi "facili" per poter determinare x_0 e y_0).

- Se A è un dominio a fattorizzazione unica (UFD): allora $\forall a, b \in A$ non entrambi nulli, esiste $d = \text{M.C.D.}(a, b)$, ma **non è detto che** $(d) = (a, b)$ e quindi neppure che $d = ax_0 + by_0$. Infatti, sicuramente è vero che $(a, b) \subset (d)$, ma non

³⁸Si tratta praticamente solo di verifiche formali, pertanto conto di aggiungerla in seguito.

è detto che valga il contenimento opposto, il quale vale solo se $d = ax_0 + by_0$.
Ad esempio, preso l'UFD $\mathbb{Z}/[\mathbb{Z}x]$, l'ideale:

$$I = (2, x)$$

è tale che $\text{M.C.D.}(2, x) = 1$, ma $1 \notin (2, x)$, perché se non fosse così avremmo:

$$1 = 2a(x) + xb(x)$$

che per $x = 0$ porta a:

$$1 = 2a(0) + 0 \implies 2 \mid 1$$

che è assurdo.

Teorema 2.101 (Caratterizzazione degli UFD)

Dato un dominio A , sono fatti equivalenti:

- (1) A è un UFD.
- (2) Valgono le due condizioni seguenti:
 - (i) Ogni elemento irriducibile è primo.
 - (ii) Ogni catena discendente di divisibilità è stazionaria, ovvero se $\{a_i\} \subset A$, con:

$$a_{i+1} \mid a_i \quad \forall i \geq 0$$

allora $\exists n_0$ tale che $a_i \sim a_{n_0}$, $\forall i \geq n_0$.

Osservazione 2.102 — La condizione (i) permette di dimostrare che la fattorizzazione in primi è unica, dunque è equivalente a questo fatto; mentre, la condizione (ii) permette di dimostrare l'esistenza della fattorizzazione, e quindi vi è equivalente, pertanto il teorema dice che essere un UFD è equivalente al fatto che in un dominio valga il teorema di fattorizzazione unica.

Osservazione 2.103 — Osserviamo che la condizione (ii) può essere riformulata equivalentemente come: ogni catena ascendente di ideali principali è stazionaria, ovvero, considerata $\{(a_i)\}_{i \geq 0}$, catena ascendente di ideali di A :

$$(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq \dots$$

allora $\exists n_0$ tale che $(a_i) = (a_{n_0})$, $\forall i \geq n_0$.^a

^aTra l'altro ciò, estendendo la condizione di stazionarietà ad ogni catena di ideali (quindi non solo principali), definisce un **anello noetheriano**.

Corollario 2.104 ($A \text{ PID} \implies A \text{ UFD}$)

Se A è un dominio a ideali principali, allora è anche un dominio a fattorizzazione unica.

Dimostrazione. Per dimostrare il corollario ci basta verificare che per ogni PID valgono le condizioni (i) e (ii) del [Teorema 2.101](#), e ciò è equivalente al dire che ogni PID è un UFD. Sia A un PID, e sia $x \in A$ un elemento irriducibile, per quanto visto nella [Proposizione 2.95](#) l'ideale (x) è massimale in A , ma dalla (3) del [Corollario 2.57](#), sappiamo quindi che (x) è primo, e poiché siamo in un dominio vale la (1) della [Proposizione 2.86](#) che ci assicura che x è primo, dunque vale la (i).

Consideriamo ora una catena ascendente di ideali (principali):

$$(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq \dots$$

e sia:

$$I = \bigcup_{i \geq 0} (a_i)$$

tale unione di ideali in catena è un ideale³⁹ di A , ed è pertanto principale, dunque $I = (a)$. Osserviamo che a appartiene all'unione, per cui $a \in (a_{n_0})$, e quindi:

$$I = (a) \subseteq (a_{n_0})$$

ma d'altra parte avevamo detto che I è l'unione di tutti gli ideali principali di A , quindi $(a_{n_0}) \subseteq (a) = I$, dunque $I = (a_{n_0})$; a questo punto sappiamo che:

$$(a_i) \subset (a_{n_0}) \quad \forall i \geq 0$$

dove si ha $(a_i) = (a_{n_0})$ quando vi è anche il contenimento opposto, e ciò avviene, poiché stiamo considerando ideali in catena, $\forall i \geq n_0 \implies \{(a_i)\}$ è stazionaria e quindi è verificata la (ii). \square

Osservazione 2.105 — L'ultimo corollario ci permette di poter mettere in relazione i vari tipi di domini d'integrità:

$$\underbrace{\text{ED}}_{\text{Domini euclidei}} \subset \underbrace{\text{PID}}_{\text{Domini a ideali principali}} \subset \underbrace{\text{UFD}}_{\text{Domini a fattorizzazione unica}}$$

Esempio 2.106 (Anello senza la (ii))

Consideriamo l'estensione $K[\{x^{\frac{1}{n}}\}_{n \geq 1}]$, essa non è un UFD, in quanto non vale la (ii) dell'[Teorema 2.101](#):

$$x^{\frac{1}{2^{n+1}}} \mid x^{\frac{1}{2^n}} \mid \dots \mid x^{\frac{1}{4}} \mid x^{\frac{1}{2}} \mid x$$

dove tale catena non è definitivamente stazionaria (il successivo può sempre dividere il precedente) dunque non esiste la fattorizzazione di x .

³⁹Come già osservato in precedenza ciò andrebbe dimostrato.

Esempio 2.107 (Anello senza la (i))

Consideriamo l'anello $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{-5}) \subset \mathbb{C}$, tale anello non è un UFD poiché non vale la (i), infatti, ad esempio, 2 è irriducibile ma non primo in $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$:

$$2 = (a + b\sqrt{-5})(c + d\sqrt{-5}) \implies N(2) = (a^2 + 5b^2)(c^2 + 5d^2)$$

da cui possiamo dedurre che le uniche possibilità sono $a = \pm 2, c = \pm 1, b = 0, d = 0$ (oppure invertiti), pertanto 2 è irriducibile, ma non è primo perché:

$$2 \mid 6 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) \quad \text{ma} \quad 2 \nmid (1 + \sqrt{-5}), (1 - \sqrt{-5})$$

poiché, $\alpha = \frac{1 \pm \sqrt{-5}}{2} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{-5}}{2} \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. In $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ abbiamo quindi due fattorizzazioni distinte per 6:

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})^a$$

^aPer essere precisi dovremmo verificare che $2, 3, 1 \pm \sqrt{-5}$ sono irriducibili in $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$.

Osservazione 2.108 — $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ non essendo un UFD, non è neppure un PID, infatti, ad esempio, l'ideale $(2, 1 + \sqrt{-5})$ non è principale.

Teorema 2.109 (A UFD $\implies A[x]$ UFD)

Se A è un dominio a fattorizzazione unica, allora anche $A[x]$ è un anello a fattorizzazione unica.

Corollario 2.110 (A UFD $\implies A[x_1, \dots, x_n]$ UFD)

Se A un dominio a fattorizzazione unica, allora anche $A[x_1, \dots, x_n]$ è un anello a fattorizzazione unica.

Dimostrazione. Dal [Teorema 2.109](#) segue il caso base $A[x]$, per induzione si suppone vera la tesi per $A[x_1, \dots, x_{n-1}] = B$, e poi si considera $B[x_n]$, che è un UFD per il caso iniziale, dunque la tesi è vera per induzione. \square

Osservazione 2.111 (Schema della dimostrazione del Teorema 2.109) — La dimostrazione del [Teorema 2.109](#) si articola in tre tappe:

- (1) $A[x]$ dominio.
- (2) Ogni irriducibile di $A[x]$ è primo (condizione (i)).
- (3) Ogni catena discendente di divisibilità è stazionaria (condizione (ii)).

Da cui si conclude per il [Teorema di Caratterizzazione degli UFD](#).

Dimostrazione. Iniziamo quindi verificando i primi due punti come segue.

- (1) Siano $f(x), g(x) \in A[x] \setminus \{0\}$, e $\deg f(x) = n \geq 0$, $\deg g(x) = m \geq 0$, essendo $a_n, b_m \neq 0$, segue che $a_n b_m \neq 0$ poiché per ipotesi A un dominio di integrità, pertanto $f(x) \cdot g(x) \neq 0$ se $f(x), g(x) \neq 0 \implies A[x]$ è un dominio d'integrità.

Osservazione 2.112 — Osserviamo anche che da ciò discende che $(A[x])^* = A^*$, infatti, considerando $f(x) \in (A[x])^*$, $\exists g(x) \in A[x]$ tale che:

$$f(x)g(x) = 1 \implies \deg f(x) + \deg g(x) = 0$$

ovvero $\deg f(x) = \deg g(x) = 0$, per cui $f(x), g(x) \in A$, ed in particolare $f(x) = a$, $g(x) = b$, pertanto:

$$ab = 1 \implies f(x) \in A^*$$

□