

Препарат	Дія	Шлях введення	Доза 1-го введення	% препарату	К-ть в мл
Кетамін	знеболення	внутрішньовенно (в/в) внутрішньокістково (в/к)	20-30 мг	1	2-3 мл мл в/в; в/к
					5-10 мл в/м; і/н
		Внутрішньом'язево (в/м) Інтраназально (і/н)	50-100 мг	5	0,4-0,6 мл в/в; в/к
					1-2мл в/м; і/н
				10	0,2-0,3 мл в/в
					0,5-1 мл в/м; і/н
Фентаніл (льодяник)	знеболення	на слизову ротової порожнини	800 мкг	-	1 льодяник
Налоксон	антидот до опіоїдів	в/в; в/к; в/м; і/н	0,4 мг	0,04	1 мл
Ондансетрон	протиблювотний	в/в; в/к; в/м; ODT	4 або 8 мг	0,2	2 або 4 мл
ТХА	зменшення крововтрати	в/в; в/к;	2 гр (2000 мг)	5	40 мл
				10	20 мл
Ca ²⁺	«блокатор» цитрату натрія/фактор згортання крові	в/в; в/к;	1 гр (1000мг)	10	-глюконат 30мл
					-хлорид 10 мл
Ертапенем	антибіотик	в/в; в/к; в/м	1 гр (1000мг)	100	Попередньо розчинити фіз.розчином

	ПОЧАТОК ДІЇ у ХВИЛИНАХ	ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ у ХВИЛИНАХ	КАРДІО	АТ	ДИХАННЯ	НУДОТА / БЛЮВОТА	СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ	ВЧТ	ЗВОРОТНА ДІЯ	АНАЛЬГЕЗІЯ	ЗБЕРІГАННЯ
СУКЦИНІЛХОЛІН	<1	4–6 ХВ	↔	↔	↓↓↓ APN	↔	в/в, в/к	↑	ЧАС	НЕМАЄ	37°
ВЕКУРОНІЙ	2,5–3	45–60 ХВ	↔	↔	↓↓↓ APN	↔	в/в, в/к	↔	ЧАС	НЕМАЄ	КТ
КЕТАМІН	<1	20–30 ХВ	↑	↑	↓	↔	в/в, в/к, в/м, п/о, PR	↑	ЧАС	Є	КТ
ПРОПОФОЛ	<1	10–15 ХВ	↔	↓	↓↓	↔	в/в, в/к	↓	ЧАС	НЕМАЄ	КТ
ЕТОМІДАТ	1	3–5 ХВ	↔	↔	↓	↑↑	в/в, в/к	↔	ЧАС	НЕМАЄ	КТ
МІДАЗОЛАМ	1	60 ХВ	↔	↓	↓	↔	в/в, в/м, в/к	↓	ФЛУМАЗЕНІЛ	НЕМАЄ	КТ
ДІАЗЕПАМ	2–3	2–3 ГОД	↓	↓	↓	↔	в/в, в/к	↓	ФЛУМАЗЕНІЛ	НЕМАЄ	КТ
МОРФІН	5	2–4 ГОД	↓	↓	↓	↑	в/в, в/м, в/к	↔	НАЛАКСОН	Є	КТ
ФЕНТАНІЛ	1	1 ГОД	↔	↔	↓↓	↔	в/в, в/м, в/к, ОТ	↔	НАЛАКСОН	Є	КТ