## Seminarieuppgift 12, Analys 8

Ville Wassberg

May 2021

## 1 Analys 8

Bestäm alla lösningar till differentialekvationen;  $y'(x)cot^2x+tan(y(x))=0$ 

Eftersom att den här första ordningens differentialekvation endast kräver en homogen lösning som också kan lösas med separationsmetoden, så gör jag det:

$$\frac{dy}{dx} + \frac{tany}{\cot^2 x} = 0 \Leftrightarrow \int \frac{1}{tany} dy = -\int \frac{1}{\cot^2 x} dx \Leftrightarrow \int \cot y dy = -\int tan^2 x dx$$

$$VL = \int \cot y dy = \int \frac{\cos y}{\sin y} dy = \ln(\sin y) + C_1$$

$$HL = -\int tan^2 x dx = -\int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = -\int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx =$$

$$-\int (\frac{1}{\cos^2 x} - 1) dx = -(\tan x - x) + C_2$$

$$\Leftrightarrow \ln(\sin y) + C_1 = x - \tan x + C_2 \Leftrightarrow \ln(\sin y) = x - \tan x + D \Leftrightarrow$$

$$\sin y = e^{x - \tan x + D} = e^{x - \tan x} e^D, e^D = E$$

$$\Rightarrow \sin y = Ee^{x - \tan x} \Leftrightarrow y(x) = \arcsin(Ee^{x - \tan x})$$

Alltså är den allmänna lösningen till differentialekvationen;  $y'(x)cot^2x+tan(y(x))=0$   $y(x)=arcsin(Ee^{x-tanx})$  där E är en konstant.