

Rapport du Projet Statistique Multidimensionnelle

Groupe Info n°1

JOSSE Thomas, HUYLENBROECK Florent, DELFOSSE Charly

Année Académique 2018-2019
Bachelier en Sciences Informatiques

Faculté des Sciences, UMonS

9 juin 2019

Résumé

Ce rapport est écrit dans le cadre du cours de Statistique Multidimensionnelle dispensé par M. *Michel VOUE*. Ce projet consistait en l'application de l'Analyse en Composantes Principales vues au cours sur un cas concret, ainsi que la découverte d'une technique d'analyse non abordée au cours à savoir, l'Analyse Discriminante Linéaire ou ADL.

Table des matières

1	Question 1 : ACP sur un cas concret	3
1.1	Introduction	3
1.2	ACP	3
1.3	Le profil est-il stable dans le temps ?	8
1.4	Groupement des régions	8
2	Question 2 : Analyse Discriminante Linéaire	8
2.1	Utilité et	8


1 Question 1 : ACP sur un cas concret

1.1 Introduction

Pour cette question nous avons plusieurs sous-points à analyser : tout d'abord effectuer notre ACP des données à proprement dites, puis prédire à l'aide de notre analyse si le profil des données était stable et ensuite grouper les Provinces/Régions qui avaient des comportements similaires avec une méthode de classification hiérarchique ascendante.


1.2 ACP

D'abord, les données ont été extraites et analysées. Les données représente l'évolution du pourcentage de chercheurs employés par les différentes provinces de Belgique. Un boxplot a été effectué avant et après centrage et réduction des données.




On remarque que la moyenne et les quantiles ont tendance à augmenter au fil des années. Comme nous voulons utiliser l'analyse en composantes principales centrée réduite, nous devons centrer et réduire nos données, voici un boxplot des données après cette opération.

Boxplot des données centrées réduites




On peut déjà observer un aperçu du comportement des données d'une année à une autre.



On remarque que les données ont l'air de suivre un modèle linéaire dans le temps, nous verrons par la suite si c'est réellement le cas.

L'analyse en composante principale va permettre de mieux comprendre les données en réduisant le nombre de dimensions. Celle-ci va chercher un ou plusieurs axes ne passant plus forcément par l'origine qui maximisent la distance entre tous les individus (dans notre cas les provinces) sur cet axe c'est à dire : $Max(H)(\sum_i^n \sum_j^n d_H^2(i, j))$ où n est le nombre d'individu, H l'axe en question et $d_H^2(i, j)$ la distance euclidienne entre 2 individus i et j sur l'axe H . Si h_i est la projection de i sur l'axe H alors $d_H^2(i, j) = 2n \sum_i^n (h_i - \bar{h})^2$ où \bar{h} est la moyenne des projections de l'ensemble des individus sur H . On peut montrer que maximiser cette distance revient à maximiser la distance sur H entre tous les individus et le centre de gravité, on peut donc prendre celui-ci comme nouvelle origine et maximiser la distance des points à l'origine. Les nouvelles coordonnées des individus sont données par $x_{ij} = r_{ij} - \bar{r}_{ij}$. On décide ensuite de réduire nos données pour les mettre à l'échelle même si les variables ont les mêmes unités (pourcentages), on obtient donc les coordonnées centrées réduites : $x_{ij} = \frac{r_{ij} - \bar{r}_{ij}}{s_j \sqrt{n}}$ où s_j est l'écart type de j . Après cette étape, nous voulons

connaître les similarités ou assimilarités entre la façon dont les variables varient les unes par rapport aux autres, pour se faire, la matrice de corrélation est calculée. la voici :




On remarque que toutes les corrélations sont très proches de 1. Ceci s'explique par le fait que les données représentent l'évolution du pourcentage de chercheurs employés dans les différentes régions de Belgique au fil des ans. En effet, les valeurs de ce pourcentage d'une année à une autre sont fortement liées/correlées, la valeur de celui-ci à une année est basée sur sa valeur à l'année précédente et n'évolue pas drastiquement. La plus petite corrélation est entre l'année 2008 et 2014, celle-ci vaut 0.915, ceci s'explique par le fait qu'il y a sûrement eu une inversion de tendance entre ces 2 années, que certaines villes ont eu un pourcentage plus élevé et l'inverse pour d'autres, par exemple le brabant wallon est passé de 1.55% en 2008 à 3.1% en 2014, la majorité des autres villes n'ont pas eu une telle augmentation.


Pour déterminer les composantes principales, c'est à dire les axes donnant la direction de la plus grande variance des données (vecteurs propres), il faut déterminer la portion de variance expliquée par chaque axe, ce n'est rien d'autres que les valeurs propres de la matrice de corrélation. Les voici :

8.806	0.128	0.04	0.02	0.004	0.001	0.0005	0.0001	0.00004
-------	-------	------	------	-------	-------	--------	--------	---------

On remarque la première valeur propre est bien plus grande que les autres, en réalité le premier axe représente 97.8% du pourcentage de l'inertie, le 2e ne représente lui que 1.44%. Le graphe ci-dessous illustre ce fait.



Pour connaître le nombre de facteurs à retenir, il y a plusieurs critères possibles. Selon le critère de Kaiser, il faudrait retenir celle qui ont une valeur propre plus grande que 1, dans notre cas, il ne faudrait donc retenir que la première. Un autre critère dit qu'il faut garder la valeur avant le "coude" c'est à dire l'éboulement dans le graphe de l'inertie que voici :



On remarque que le coude s'effectue entre la première et la deuxième valeur, selon ce critère il faudrait donc aussi ne garder que le premier facteur.


Pour appliquer l'analyse par composantes principales, il a donc été décidé de ne garder qu'une composante.

On obtient donc la seule composante principale, voici un tableau présentant les nouvelles coordonnées des variables sur cette composante(droite) par rapport leurs directions dans les anciens axes.

Les coefficients de cette composante sont quasi identiques, ceci est le résultat du fait que toutes les variables sont fortement corrélées à celle-ci.

Variabes	Nouvelles coord	Anciens axes
X2006	-0.994	-0.335
X2007	-0.995	-0.335
X2008	-0.973	-0.328
X2009	-0.989	-0.333
X2010	-0.991	-0.334
X2011	-0.994	-0.335
X2013	-0.990	-0.333
X2014	-0.981	-0.330
X2015	-0.996	-0.336

Sur le graphique ci-dessous, on observe la droite de la première composante pour chaque variable, on remarque que celle-ci symbolise bien la direction de la plus grande variance dans les données, on voit même que les données suivent presque un modèle linéaire sur celle-ci.



DROITE CORRELATION Les nouvelles coordonnées des individus sur cette composante peuvent être obtenues par la formule : $N_i = \sum_j^n u_j x_{ij}$ où n est le nombre de variables, u_j est le j^{eme} coefficient de la composante dans les anciens axes et x_{ij} est j^{eme} coordonnée de l'individu i dans les anciens axes (centré et réduit). On peut aussi déterminer la contribution de chaque individu à l'inertie de la composante par : $Cr(i) = N_i^2$.

Individus	Coordonnées	Contribution(%)
Bruxelles/Brussels Gewest	-3.472	12.443
Antwerpen	-0.109	0.012
Limburg (BE)	2.45	6.2
Oost-Vlaanderen	-0.526	0.285
Vlaams-Brabant	-3.896	15.673
West-Vlaanderen	2.451	6.201
Brabant Wallon	-5.773	34.407
Hainaut	2.296	5.44
Liège	0.911	0.858
Luxembourg (BE)	3.793	14.852
Namur	1.875	3.629

1.3 Le profil est-il stable dans le temps ?

Le profil est stable car on a vu au point précédent que la matrice des corrélations avaient des coefficients très proches de 1, donc en général aucune année n'a vraiment un comportement différent d'une autre dans les données, on a pas des changements imprévus c'est à dire une province qui verrait son pourcentage augmenter ou diminuer de façon inhabituelle d'une année à une autre. Le profil est donc stable dans le sens où dans le temps, celui-ci garde globalement le même comportement.

1.4 Groupement des régions

2 Question 2 : Analyse Discriminante Linéaire

2.1 Utilité et