

TAI algèbre linéaire L1 groupes A et B.

EX1

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel, on considère (x_1, \dots, x_p) une famille libre de vecteurs de E , soit $y \in E$ montrer que (x_1, \dots, x_p, y) est liée si et seulement si $y \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_p)$.

EX2

Soit $\mathbb{R}_n[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à n .

On considère $f_1 = x^2 + x - 1$, $f_2 = 2x$, $f_3 = x^2 + 1$.

Montrer que $\text{Vect}(f_1, f_2, f_3) = \mathbb{R}_2[X]$.

EX3

On se place dans \mathbb{R}^3 et on considère les vecteurs : $v_1 = (1, 1, -1)$, $v_2 = (1, 2, 4)$, $v_3 = (3, -1, a)$, $v_4 = (2, 3, b)$. Déterminer a et b tels que $\text{Vect}(v_1, v_2) = \text{Vect}(v_3, v_4)$.

EX4

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(x, y, z) \mapsto (x + 2y, z - x, x + 4y + z)$. Déterminer une base de $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$.

EX5

Montrer que si (a, b, c) est une base de \mathbb{R}^3 alors $(a + b + c, a + b, 2a + b - c)$ est une base de \mathbb{R}^3 .

EX6

Déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire u dont la matrice standard est:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -4 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

EX7

Déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire v dont la matrice standard est:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

EX8

Déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire w dont la matrice standard est:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

EX9

On rappelle que $\mathbb{R}_3[X]$ est l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 3.

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, on considère $f: \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}, P \mapsto P(\alpha)$.

- 1) montrer que f est une application linéaire.
- 2) montrer qu'une famille de 3 polynômes de degré 0, 1 et 2 est libre dans $\mathbb{R}_2[X]$.
- 3) écrire $\text{Ker } f$ en extension grâce au principe utilisé habituellement pour les sous-espaces de \mathbb{R}^n .
- 4) donner une base de $\text{Ker } f$.

EX10

Soit $\varphi: \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X], P \mapsto P + (X - 1)P'$, où P' désigne le polynôme dérivé de P .

- 1) montrer que φ est linéaire.
- 2) après avoir rappelé la dimension de $\mathbb{R}_2[X]$, montrer que φ est bijectif.
- 3) déterminer la matrice de φ dans la base $B = (1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$.
- 4) déterminer la matrice de passage $P_{BB'}$, où B' est la base $(1, 2X, 3X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$.
- 5) en déduire la matrice de φ dans la base $B' = (1, 2X, 3X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$.

EX11

On note $(e_1, e_2, e_3, e_4, e_5)$ la base standard de \mathbb{R}^5 et (f_1, f_2, f_3) la base standard de \mathbb{R}^3 .

- 1) Soit $f: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(e_1) = f_1 + 2f_2 + f_3$, $f(e_2) = f_1 + f_2 + 2f_3$, $f(e_3) = -f_1 - 3f_3$, $f(e_4) = -f_1 - 4f_2 + f_3$, $f(e_5) = f_1 + 4f_2 - f_3$ donner la matrice standard de f .
- 2) mettre cette matrice sous forme échelonnée réduite.
- 3) en déduire une base de $\text{Ker } f$.
- 4) donner une base de $\text{Im } f$.

EX12

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}. \text{ a) Calculer } A^2, A^3 \text{ puis } A^n \text{ pour tout } n > 0. \text{ b) } A \text{ est-elle inversible?}$$

EX13

Trouver, à l'aide d'un déterminant, une condition sur m pour que le système suivant admette une infinité de solutions.

$$\begin{cases} x - 2y + z = mx \\ 3x - y - 2z = my \\ 3x - 2y - z = mz \end{cases}$$

EX14

Calculer $\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 \\ 1 & x_4 & x_4^2 & x_4^3 \end{vmatrix}$.

EX15

Soit $C = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & -d & c \\ c & d & -a & -b \\ d & -c & b & -a \end{pmatrix}$. Calculer le produit $C^t C$, en déduire $\det C$.

EX16

Soit A et B deux matrices carrées d'ordre $n > 1$ telles que $AB - BA = B$. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel p on a :

$$AB^p = B^p(A + pI_n) \quad \text{où } I_n \text{ désigne la matrice identité d'ordre } n.$$

FIN.