Al and Deep Learning

Linear Regression & Back-propagation (1)

Jeju National University Yung-Cheol Byun

여행, 그리고 회귀

회귀(Regression)

인류는 고향을 떠나도 나이가 들면 언젠가는 본래의 고향으로 회귀하고(돌아가고) 싶어한다. (인류학)




자연의 법칙, 섭리, 일종의 규칙

- 연어는 태어난 곳으로 돌아온다.
- 집은 클수록 비싸다.
- 젊을 때는 강하지만 나이가 들수록 약하다.
- 남자가 여자보다는 큰 편이다.
- 성적이 좋을 수록 취업이 잘된다.

반드시 그런 것은 아니지만 일반적으로 그런 경향이 있다.

이를 잘 표현하는 말, 용어 회귀(Regression)


회귀는 그래프로 표현하면 이해하기 쉬움. (집 크기와 가격의 관계)



Linear Regression

분포 형태가 직선(Line) 모양 일한 시간과 임금의 관계 집의 크기와 가격의 관계

www.desmos.com



뉴런의 능력



- y = wx
- 하나의 뉴런은 하나의 Linear Regression을 표현


가설(Hypothesis)

$$h = wx$$


$$h = wx + b$$

- 뉴런의 시냅스 w 값을 적절히 조절할 경우 Linear Regression 데이터를 잘 표현할 수 있음.
- 가설 : 아직 증명되지 않았으나 조절을 통하여 데이터를 표현할 수 있다고 생각되는 것

가중치 w와 바이어스 b 역할



(Q) 뉴런과 회귀



어떻게 w를 조정할 것인가?

- 모든 점을 지날 경우 오류(에러, 비용, loss)는 0
- 따라서 오류가 0이 되도록
 w 와 b 를 조정

오류 함수

$$E = |\mathbf{w}x - y|$$

데이터가 1개이고 (x, y)=(1,1)이라면?

$$E = |\mathbf{w} \cdot \mathbf{1} - \mathbf{1}|$$

에러가 \mathbf{OO} 되는 w = 찾자.

오류 함수


만일, 데이터가 3개라면

Х	У
1	1
2	2
3	3

$ y_i - y_i $


모두 더해서 평균

오류 함수 그래프 $E = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} |wx_i - y_i|$



오류 함수 그래프

$$E = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} (wx_i - y_i)^2$$



오류함수

데이터가 m개일 경우

(Q) 오류 그래프 모양은?

$$E = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} (wx_i - y_i)^2$$

Х	У
1	1
2	2
3	3

오류 그래프 생각하기

- w 가 변하면 오류 E도 변한다.
- 오류를 줄이고 싶으면 w를 적절히 바꾸면 된다.
- w 위치에 따라 w 를 조금만 변경해도
 오류가 많이 변하는 곳도 있고,
- 어떤 곳에서는 w를 바꾸어도 오류가 거의 변하지 않는 곳이 있다.

(Q) w 예상하기


- w = 조금 증가시켰더니 오류 E가 아주 급격하게 늘어났다. 현재 w 값은?
- w를 조금 증가시켰더니 오류는 급격하게 감소하였다. 어디인가?
- w 를 변경해 보았지만 오류는 거의 변하지 않았다. 어디인가?

현재 ₩가 어떤 값일 때


w변화가 오류 E에 미치는 영향

예를 들어, 현재 ₩가 4인 곳에서는 ₩가 조금만 늘려도 오류(분)는 아주 크게 늘어난다. "기울기가 아주 크다"


기울기로 표현된다.




기울기의미(w와 E 관계)




기울기 의미(w와 E 관계)




기울기의미(w와 E 관계)




기울기 의미(w와 E 관계)




기울기 의미(w와 E 관계)



오류 그래프에서 기울기





₩를 아주 조금만 크게 할 때 오류 ፫가 얼마나 증가하는 지로 기울기를 알 수 있다.

Numerical differentiation

(Q) 미치는 영향 구하기

$$E = (wx - y)^2$$

데이터 (x, y)가 (1, 1)일 때 w=3인 지점에서 w변화가 오류 E에 미치는 영향(기울기)를 구하라.

(Q) 미치는 영향 구하기

$$E = (w1 - 1)^2$$

w: 3 -> E: 4

 $w: 3.00001 \rightarrow E: 4.00004$

w가 0.00001 증가할 때 E는 0.00004 증가

 \mathbf{w} 가 1증가할 때 \mathbf{E} 는 4 증가함을 의미


따라서 미치는 영향(기울기)=4

기울기=미치는 영향

기울기에 대한 생각

- <u>기울기가 4</u> → w가 1만큼 증가하면
 오류 E는 4만큼 증가
- 따라서 오류를 줄이고 싶으면? w를 감소시켜야 함
- <u>기울기가 -5</u> → w가 1만큼 증가하면 오류는 5만큼 감소 뜻
- 따라서 오류를 줄이고 싶으면? w를 증가시켜야 함

₩를 변화시키면서(튜닝) 오류 ፫를 계속해서 줄이는 것 (학습, Learning)



어떻게 '자동으로'

• 오류 E를 최소화하는 w 값을 찾을까?

요 약

- 리그레션(회귀)을 이해한다.
- 가설과 오류 그래프를 이해한다.
- 오류 그래프를 해석할 수 있다.
- 가중치가 오류에 미치는 영향을 안다.
- 기울기의 의미를 안다.