

Neurales Timing & Segmentation

Behaviorale Engagement-Architektur — Sprachbasierte Kommunikationsplattform (anonymisiert)

WURUM ES GEHT

Engagement ist keine Frage des Volumens. Es ist eine Frage des Timings.

Eine vollständige Engagement-Architektur für eine sprachbasierte Kommunikationsplattform: Segmentierung nach Nutzerprofil, Timing-Optimierung basierend auf neuronalen Rezeptivitätsfenstern, signalgesteuertes Interventionsdesign und präventive Schutzmechanismen gegen Systemermüdung.

ARCHITEKTUR - ÜBERSICHT

4

SEGMENT-KLASSEN — JEWEILS
EIGENES TIMING-FENSTER UND
BUDGETANTEIL

T+24h

RETARGETING-FENSTER — EXAKT AUF
DEN BIORHYTHMUS DES NUTZERS
SYNCHRONISIERT

7,3×

PROJIZIERTER ROI DES ARCHITEKTUR-
MODELLS

1 · Die vier Segmente

Jedes Segment hat ein eigenes **neurales Rezeptivitätsfenster** — die Tageszeit, in der die Aufmerksamkeitsschwelle für Audio-Signale am niedrigsten und die Bindungsbereitschaft am höchsten ist.

SEGMENT	PROFIL	REZEPTIVITÄTSFENSTER	BUDGETANTEIL	LTV
Segment 01	Später Abend — hohe spontane Bindungsbereitschaft nach belastendem Tag	23:00 – 02:00	37 %	€ 45
Segment 02	Früher Abend — diskretionsorientiert, qualitätssuchend, hohe Loyalität nach Erstkontakt	20:00 – 22:00	47 %	€ 85
Segment 03	Übergang — digital affin, aber zu unruhig für reine Audio-Signale; dient als Algorithmus-Futter	18:30 – 20:00	4 %	€ 22
Segment 04	Retargeting — bewiesenes Interesse, letzte Interaktion T+24/T+48; Verlustangst-getrieben	Exakt T+24h	12 %	€ 40

2 · Das Timing-Prinzip

Signale außerhalb des Fensters sind Rauschen.

Ein perfekt gestaltetes Signal, das außerhalb des Rezeptivitätsfensters ankommt, wird ignoriert — das Budget ist verbrannt. Die Architektur zwingt daher jedes Signal, sein Fenster zu deklarieren, bevor es ausgesendet wird.

Der Biorhythmus ist der Taktgeber.

Die Budgetverteilung folgt nicht der Verfügbarkeit, sondern der neuronalen Empfänglichkeit — der Tageszeit, in der das Gehirn für den spezifischen Reiz am empfänglichsten ist.

Ermüdung ist rechnerisch.

Audio-Reize gewöhnen sich schnell. Die Architektur variiert Stimmlage, Pausen und Hintergrundgeräusche alle 48-72 Stunden, um die Klickrate konstant zu halten.

3 · Anwendung auf Telemedizin

Die Methode — **Segmentierung nach Rezeptivitätsprofil, Timing nach neuronalen Fenstern, Intervention erst nach Signalvalidierung** — ist direkt auf Patienten-Kommunikation übertragbar:

MARKETING - PRINZIP	TELEMEDIZIN - ANALOGON
Rezeptivitätsfenster	Der Zeitpunkt, zu dem ein Patient für eine Gesundheitsbotschaft am empfänglichsten ist — z. B. nach einer Konsultation, vor einer Nachsorge-Terminierung
Segment-Logik	Verschiedene Patientengruppen (chronisch vs. akut, präventiv vs. reaktiv) erhalten verschiedene Kommunikationsstrategien
Retargeting-Fenster	Nachsorge nach Konsultation — genau dann, wenn der Patient am empfänglichsten für Follow-up ist
Anti-Ermüdung	Kommunikationsinhalte rotieren systematisch, um Desensibilisierung zu verhindern

Anmerkung: Sämtliche Branchen-Identifikationsmerkmale wurden entfernt. Die Methode — Segmentation, Timing-Fenster, Retargeting-Logik, Anti-Ermüdung — ist original und auf jegliche kommunikationsbasierte Plattform übertragbar.