COVID-19 en Estados Unidos: qué pasó, dónde y qué aprender

Informe ejecutivo · Enero de 2020 a marzo de 2021 · 50 estados y Washington D. C. · Datos de The COVID Tracking Project


28,7 millones	514.000	3.334	≈ 3 semanas
casos notificados	muertes	muertes al día en el peor momento (01-2021)	entre los contagios y las muertes

En resumen

- Hubo **tres olas**, y la de otoño-invierno fue con diferencia la peor.
- Cada ola golpeó con más fuerza a **una zona distinta** del país.
- Las hospitalizaciones avisan de las muertes con **casi dos semanas** de antelación.
- Al principio de la pandemia solo se detectaba **una pequeña parte** de los contagios.


1. Tres olas, y la de otoño-invierno fue la peor

Entre octubre de 2020 y marzo de 2021 se notificaron 22,2 millones de casos y 328.000 muertes, más que en las dos olas anteriores juntas. En su peor momento, en enero de 2021, hubo unos 246.000 casos y 3.334 muertes al día.




2. Cada ola golpeó a una zona distinta

En la primavera de 2020, el **Noreste** (Nueva York, Nueva Jersey…) sumó el 53 % de las muertes con solo el 17 % de la población. En verano la ola se trasladó al **Sur** (55 % de las muertes). La de otoño-invierno se extendió a todo el país: cada región tuvo más o menos las muertes que le correspondían por población. Las barras muestran qué parte de las muertes de cada ola hubo en cada región; la marca negra, qué parte de la población vive en ella.



3. Los hospitales avisan casi dos semanas antes

Comparando cada estado consigo mismo, las hospitalizaciones siguen a los casos con unos 3 días de retraso, y las muertes llegan unos 11 días después de las hospitalizaciones: **unas tres semanas desde los contagios**. El desfase se ve sobre todo cuando una ola baja: en el invierno, los casos tardaron 26 días en caer a la mitad y las hospitalizaciones 40. Las muertes, a 7 de marzo de 2021, seguían en el 52 % de su máximo.



4. Al principio solo se veía la punta del iceberg

El pico de casos del invierno fue unas 8 veces el de la primavera, pero el pico de muertes de la primavera ya llegaba al 63 % del de invierno. La explicación son las pruebas: en la primavera de 2020 se hacían tan pocas que solo se analizaba a quien tenía síntomas claros, y una de cada cinco salía positiva. Por eso las muertes por cada 100 casos detectados eran mucho más altas: no tanto porque el virus fuera más letal, sino sobre todo porque muchos casos leves no se contaban.

	Primavera 2020	Verano 2020	Otoño-invierno 2020-21
Casos al día en el pico	31.064	66.341	246.419
Muertes al día en el pico	2.112	1.142	3.334
% de pruebas positivas en el pico	21,2 %	7,8 %	13,8 %
Muertes por cada 100 casos detectados	5,5	1,7	1,5

Recomendaciones

- **Usar las hospitalizaciones como señal de alarma.** Cuando suben, preparar camas de UCI y personal para las dos semanas siguientes, sin esperar a las muertes.
- **Aumentar las pruebas cuando más del 5 % sale positivo** (el umbral que recomendaba la OMS): es señal de que hay contagios sin detectar.
- **Planificar por regiones.** Las olas no llegan a la vez a todo el país, así que el material y el personal sanitario se pueden reforzar primero donde empieza la ola.
- **Comparar estados por habitante** antes de decidir dónde actuar: las cifras absolutas favorecen siempre a los estados grandes.

Limitaciones

- Las cifras son absolutas, no por habitante; los estados más poblados pesan más.
- En la primavera de 2020 se hacían pocas pruebas: los casos de la primera ola están muy por debajo de los reales.
- Cada estado contaba las pruebas y las hospitalizaciones a su manera, y algunos días incluyen datos atrasados de semanas anteriores.
- Los datos terminan el 7 de marzo de 2021, cuando el proyecto dejó de recogerlos.

Fuente: The COVID Tracking Project (The Atlantic), licencia CC BY 4.0. Población: censo de EE. UU. de 2020. Cifras de los 50 estados y Washington D. C.; medias de 7 días para suavizar el efecto de los fines de semana. Análisis completo en los notebooks del repositorio.