

Contents

1	Tipologia Esercizio 1	2
2	Tipologia Esercizio 2	8
3	Tipologia Esercizio 3	11
4	Tipologia Esercizio 4	13
5	Tipologia Esercizio 5	16
6	Tipologia Esercizio 6	20
7	Tipologia Esercizio 7	20
8	Tipologia Esercizio 8	20

1 Tipologia Esercizio 1

In particolare verranno trattati gli esercizi riguardanti:

- Caduta di un corpo da fermo
- Moto proiettile
- Moto Circolare Uniforme

Tema d'Esame di Gennaio 2015

Calcolare il minimo coefficiente di attrito statico tra asfalto e pneumatico in modo tale che un'auto che pesa $100kg$ riesca a percorrere una curva di raggio $850m$ a $60km/h$ senza sbandare



Tema d'Esame di Febbraio 2015

Calcolare la velocità massima alla quale un'automobile di $1t$ può percorrere una curva di raggio $900m$ e inclinata di $\pi/12$ sapendo che il coefficiente di attrito statico tra asfalto e pneumatico è 0.5

Tema d'Esame di Giugno 2015

Calcolare il minimo coefficiente di attrito statico tra un corpo di massa $3kg$ e il piano inclinato sui cui è appoggiato in modo che inclinando il piano di 45° il corpo rimanga fermo

Tema d'Esame di Luglio 2015

Un elicottero vola orizzontalmente a $200km/h$ e a una quota di $500m$ lancia un carico che deve toccare terra in un punto ben preciso. Trascurando la resistenza dell'aria a quale distanza orizzontale dal bersaglio l'equipaggio deve effettuare il lancio?

Tema d'Esame di Luglio 2015


Calcolare l'angolo massimo a cui si può inclinare un piano su cui è appoggiato un corpo di massa $5kg$ per cui il corpo rimane fermo. Il coefficiente di attrito statico tra un corpo è 0.9 .

Tema d'Esame di Gennaio 2016

Un'automobile a trazione anteriore accelera costantemente da $0 km/h$ a $99 km/h$ in $12 s$ lungo una strada piana. Calcolare il minimo coefficiente d'attrito necessario tra la strada e i pneumatici affinché le ruote non slittino.

Tema d'Esame di Febbraio 2016

Una pietra viene lanciata verso un terrapieno di altezza H con velocità iniziale di 42.0 m/s e ad un angolo θ di 60° rispetto al suolo. La pietra cade sul terrapieno dopo 5.5s dal lancio. Trovare l'altezza H del terrapieno

**Soluzione:**

Scompongo la velocità v_0 sull'asse y

$$v_{0,y} = v_0 \cdot \sin(\alpha) = 42\text{m/s} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 36.373\text{m/s}$$

Calcolo con la formula del moto uniformemente accelerato la distanza percorsa sull'asse y

$$y = y_0 + v_{0,y} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$


$$y = 0\text{m} + 36.373\text{m/s} \cdot 5.5\text{s} - \frac{1}{2} \cdot 9.81\text{m/s}^2 \cdot (5.5\text{s})^2 = 200.051\text{m} - 148.225\text{m} = 51.827\text{m}$$

Tema d'Esame di Giugno 2016

Calcolare la velocità massima a cui un'auto che pesa 1000 kg riesce a percorrere una curva di raggio 85 m senza sbandare sapendo che il coefficiente d'attrito tra pneumatico e asfalto è 0.7

Tema d'Esame di Luglio 2016

Una pallina viene lanciata come in figura con una velocità iniziale di 15 m/s e un angolo θ di 60° . Dopo quanto tempo atterrerà su un ripiano di altezza $h = 4$ m?

**Soluzione:**

Scompongo la velocità v_0 sull'asse y

$$v_{0,y} = v_0 \cdot \sin(\alpha) = 15 \text{ m/s} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 12.99 \text{ m/s}$$

Calcolo con la formula del moto uniformemente accelerato i tempi con il quale la pallina raggiunge l'altezza pari a 4m

$$y = y_0 + v_{0,y} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

$$4\text{m} = 0\text{m} + 12.99 \text{ m/s} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot t^2$$

$$4.905x^2 - 12.99x + 4$$

$$\Delta = 12.99^2 - 4 \cdot 4.905 \cdot 4 = 90.26$$

$$x_{1,2} = \frac{12.99 \pm \sqrt{90.26}}{2 \cdot 4.905} = x_1 = 0.356 \quad x_2 = 2.29$$

Consideriamo x_2 perchè è il momento in cui tocca la terrazza, ossia a 2.29s

Tema d'Esame di Gennaio 2017

Una sferetta metallica viene lanciata verticalmente verso l'alto con modulo della velocità $v_0 = 14m/s$ da una terrazza alta $y_0 = 22.4m$ rispetto al suolo. Si calcoli la velocità di arrivo al suolo.

Soluzione:

Lanciando la pallina dalla terrazza voglio ottenere l'altezza massima raggiunta dalla pallina

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \quad h = \frac{v^2}{2 \cdot g}$$
$$h = \frac{(14m/s)^2}{2 \cdot 9.81m/s^2} = \frac{196m^2/s^2}{19.62m/s^2} = 9.99m \quad \text{a cui va sommato } y_0$$
$$h_{max} = 9.99m + 22.4m = 32.39m$$

Avendo ottenuto l'altezza massima basta calcolare la velocità di un corpo fermo

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 9.81m/s^2 \cdot 32.39m} = 25.21m/s$$

Tema d'Esame di Febbraio 2017

Un punto materiale si muove su una circonferenza di raggio $r = 1m$ con moto uniformemente accelerato. Al tempo $t_0 = 0$ il punto ha una velocità $v_0 = 0.1m/s$. Dopo un tempo $t_1 = 2s$ ha percorso uno spazio $s_1 = 40cm$. Si calcoli il modulo dell'accelerazione a al tempo $t_2 = 4s$

Soluzione:

Calcolo l'accelerazione tangenziale utilizzando la formula del moto uniformemente accelerato

$$\Delta s = v_0 \cdot t_1 + \frac{1}{2} \cdot a_t \cdot t_1^2$$
$$0.4m = 0.1m/s \cdot 2s + \frac{1}{2} \cdot a_t \cdot 4s^2 \quad a_t = \frac{2 \cdot 0.2m}{4s^2} = 0.1m/s^2$$

Calcolo la velocità al tempo t_2

$$v_1 = v_0 + a_t(t_1 - t_0) = 0.1m/s + 0.2m/s = 0.3m/s$$

$$v_2 = v_1 + a_t(t_2 - t_1) = 0.3m/s + 0.2m/s = 0.5m/s$$

Calcolo l'accelerazione centripeta

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{(0.5m/s)^2}{1m} = 0.25m/s^2$$

Il modulo della accelerazione è da:

$$a_{tot} = \sqrt{a_c^2 + a_t^2} = \sqrt{(0.25m/s^2)^2 + (0.1m/s^2)^2} = 0.27m/s^2$$

Tema d'Esame di Giugno 2017

Un'elicottero vola orizzontalmente a $180km/h$ e a una quota di $500m$ lancia un carico che deve toccare terra in un punto ben preciso. Trascurando la resistenza dell'aria, a quale distanza orizzontale dal bersaglio l'equipaggio deve effettuare il lancio?

Soluzione:

Sapendo che $v = \frac{d}{t}$ se trovassimo il tempo impiegato per cadere dai $500m$ tramite le formule inverse ricaveremmo la distanza percorsa

Tramite la formula del moto uniformemente accelerato scompongo la distanza percorsa sull'asse x :

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$500m = 0m + 0m/s \cdot t + \frac{1}{2} \cdot 9.81m/s^2 \cdot t^2$$

$$\text{Ossia} \quad 4.905m/s^2 \cdot t^2 = 500m \quad t = \sqrt{101.937s^2} = 10.096s$$

$$\text{Quindi } d = v \cdot t = \left(\frac{180000m}{3600s}\right) \cdot 10.096s = 50m/s \cdot 10.096s = 504.8m$$

Tema d'Esame di Settembre 2017

Un punto materiale si muove su una circonferenza di raggio $r = 0.1m$ con moto uniformemente accelerato. Al tempo $t_0 = 0$ il punto ha una velocità $v_0 = 0.2m/s$. Dopo un tempo $t_1 = 1s$ ha percorso uno spazio $s_1 = 4cm$. Si calcoli il modulo dell'accelerazione a al tempo $t_2 = 4s$

Soluzione:

Calcolo l'accelerazione tangenziale utilizzando la formula del moto uniformemente accelerato

$$\Delta s = v_0 \cdot t_1 + \frac{1}{2} \cdot a_t \cdot t_1^2$$

$$0.04m = 0.2m/s \cdot 1s + \frac{1}{2} \cdot a_t \cdot 1s^2 \quad a_t = \frac{-0.16m \cdot 2}{1s^2} = -0.32m/s^2$$

Calcolo la velocità al tempo t_2

$$v_2 = v_0 + a_t(t_2 - t_0) = 0.2m/s - 0.32m/s^2 \cdot 4s = -1.08m/s$$

Calcolo l'accelerazione centripeta

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{(-1.08m/s)^2}{0.1m} = 11.664m/s^2$$

Il modulo della accelerazione è da:

$$a_{tot} = \sqrt{a_c^2 + a_t^2} = \sqrt{(11.664m/s^2)^2 + (-0.32m/s^2)^2} = 11.668m/s^2$$

Tema d'Esame di Gennaio 2018

Un pallavolista effettua un servizio al salto e colpisce la palla orizzontalmente. A quale altezza minima deve colpire la palla perché questa arrivi nel campo avversario passando a fil di rete, se la velocità del servizio è 90.0km/h , la rete è alta 2.43m e si trova a 9.00m di distanza

Soluzione:

Troviamo il tempo necessario affinché distanza percorsa dalla palla sia 9m

$$90\text{km/h} = \frac{90000\text{m}}{3600\text{s}} = 25\text{m/s}$$

$$v = \frac{d}{t} \quad t = \frac{d}{v} = \frac{9\text{m}}{25\text{m/s}} = 0.36\text{s}$$

Troviamo la distanza percorsa sull'asse y in 0.36s in caduta libera da fermo

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} \quad h = \frac{v^2 \cdot g}{2} = \frac{(0.36\text{s})^2 \cdot 9.81\text{m/s}^2}{2} = 0.635\text{m}$$

Sommo l'altezza della rete all'altezza percorsa in 0.36s

$$h_{\text{tot}} = h_{\text{rete}} + h_{0.36} = 2.43\text{m} + 0.635\text{m} = 3.065\text{m}$$


2 Tipologia Esercizio 2

In particolare verranno trattati gli esercizi riguardanti:

- Piano Inclinato

Tema d'Esame di Gennaio 2016

Una molla viene compressa di 17 cm prima di lanciare una palla verso un piano inclinato senza attrito. La palla ha massa 1kg e il piano inclinato ha un'altezza $H=1.28$ m. Quanto vale la costante elastica della molla affinché la palla arrivi con una velocità di 4 m/s in cima al piano ?




Tema d'Esame di Febbraio 2016

Una palla è lanciata da una molla con costante elastica $63N/m$ compressa di 45cm. La palla viaggia attraverso un piano inclinato alto 72cm. Una volta arrivata in cima al piano inclinato la palla incontra una superficie piatta frenante. Il coefficiente d'attrito dinamico palla-superficie è di $\mu = 0.42$. Che distanza percorre la palla sulla superficie frenante prima di fermarsi?



Tema d'Esame di Giugno 2016

Una molla ideale può essere compressa di 1.0m da una forza di 100N. La stessa molla è posta alla fine di un piano inclinato con attrito (coefficiente 0.2) che forma un angolo di 30° con l'orizzontale. Una massa M di 10kg viene lasciata cadere da ferma dal vertice del piano inclinato e si arresta momentaneamente dopo aver compresso la molla di 2.0m. Qual'è la velocità della massa un attimo prima di toccare la molla?



Tema d'Esame di Luglio 2016

Una molla ideale può essere compressa di $1.0m$ da una forza di $100N$. La stessa molla è posta alla fine di un piano inclinato con attrito (coefficiente 0.2) che forma un angolo di 30° con l'orizzontale. Una massa M di $10kg$ viene lasciata cadere da ferma dal vertice del piano inclinato e si arresta momentaneamente dopo aver compresso la molla di $2.0m$. Qual'è la velocità della massa un attimo prima di toccare la molla?



Tema d'Esame di Gennaio 2017

Un disco metallico viene lanciato con velocità v nel punto A del tratto AB, di lunghezza $l = 4m$, in modo che percorra tale tratto e poi il tratto BC, di lunghezza uguale al precedente e inclinato di un angolo $\alpha = 60^\circ$ rispetto all'orizzontale. Il tratto AB è senza attrito, mentre tra il disco e il tratto BC vi è attrito ($\mu_D = 0.6$). Quanto vale v se il disco arriva in C con velocità nulla?



Tema d'Esame di Febbraio 2017

Nel sistema in figura la molla ha una costante elastica di $1.20N/cm$. Il piano sul quale si muove la pallina è inclinato di 10.0° rispetto all'orizzontale. La molla viene inizialmente compressa di $5.00cm$. Si calcoli la velocità che raggiunge una pallina di massa $100g$ quando la molla viene rilasciata. Si trascuri ogni attrito e la massa della molla.



Tema d'Esame di Giugno 2017

Un blocco metallico di massa $m = 0.5kg$, partendo da fermo, viene lasciato scivolare lungo un piano inclinato con un angolo $\alpha = 30^\circ$ rispetto all'orizzontale e con un coefficiente di attrito dinamico $\mu_D = 0.25$. Dopo aver percorso il tratto AB del piano inclinato lungo $85cm$, il blocco raggiunge una superficie orizzontale, priva di attrito, sulla quale è posta una molla ($k = 35N/m$). Il blocco urta la molla e la comprime. Qual'è la compressione massima della molla?



Tema d'Esame di Luglio 2017

Una molla con costante elastica 77.61N/cm , viene compressa prima di lanciare una palla verso un piano inclinato. La palla ha massa 1kg e il piano inclinato è alto $H = 4.36\text{m}$. Quanto deve essere compressa la molla affinché la palla arrivi con una velocità di 15m/s in cima al piano?




Tema d'Esame di Settembre 2017

Una pallina abbandona un piano inclinato ($\theta = 30^\circ$) da un'altezza pari a 5m e tocca il suolo dopo $0,8\text{s}$. Si determini il modulo della velocità con cui abbandona il piano inclinato.



Tema d'Esame di Gennaio 2018

Una massa $M = 100\text{g}$ viene lanciata con un sistema come quello in figura. Se la costante elastica della molla è $k = 500\text{N/m}$, quale deve essere la sua compressione perché la massa M raggiunga un'altezza massima $h = 2.00\text{m}$ da terra. Il tratto inclinato forma un angolo $\theta = 20.0^\circ$ con il terreno, è lungo $L = 50.0\text{cm}$ e ha un coefficiente di attrito $f = 0.10$



3 Tipologia Esercizio 3

In particolare verranno trattati gli esercizi riguardanti:

- Gravitazione

Tema d'Esame di Gennaio 2015

Calcolare il valore dell'accelerazione di gravità alla superficie del pianeta Venere, sapendo che la sua velocità di fuga vale $10.36 km/s$ e il raggio è di $6052 km$

Tema d'Esame di Febbraio 2015

Calcolare il periodo di rotazione della Luna attorno alla Terra assumendo che percorra un'orbita circolare di raggio $384000 km$, conoscendo l'accelerazione di gravità sulla superficie della Terra, $g = 9.8 m/s^2$ e il raggio della Terra $6370 km$.

Tema d'Esame di Giugno 2015

Qual'è la velocità di fuga da un asteroide (sferico) di raggio $800 km$ e per il quale l'accelerazione di gravità sulla superficie vale $6 m/s^2$?

Tema d'Esame di Luglio 2015

Calcolare il periodo orbitale del Telescopio Spaziale Hubble (HST), che compie orbite circolari intorno alla Terra alla quota di $600 km$, il raggio della Terra è $6378 km$ e la massa $5.98 \cdot 10^{24} kg$

Tema d'Esame di Gennaio 2016

Calcolare l'accelerazione centripeta di un satellite in orbita geostazionaria. $M_{Terra} = 5.972 \cdot 10^{24} kg$.

Tema d'Esame di Giugno 2016

Sull'asse che unisce la terra con la luna (distanza terra-luna $D_{TL} = 3.8 \cdot 10^8 m$), a quale distanza dal centro della terra ($M_T = 6.0 \cdot 10^{24} kg$) la forza gravitazionale netta esercitata su un corpo di massa M è nulla? (massa Luna $M_L = 7.4 \cdot 10^{22} kg$)

Tema d'Esame di Luglio 2016

Calcolare il peso in N di un astronauta sulla stazione spaziale quando questa orbita ad una quota di $400 km$ sopra la superficie terrestre. La massa dell'astronauta è di $70 kg$. Il raggio della terra è $6370 km$.

Tema d'Esame di Gennaio 2017

Calcolare il periodo di un pendolo lungo $2 m$ a $50000 km$ dalla superficie della terra, sapendo che la massa e il raggio della terra sono $5.97 \cdot 10^{24} kg$ e $6371 km$ rispettivamente.

Tema d'Esame di Febbraio 2017

Il periodo di rotazione della luna intorno alla terra è $T_L = 27.32$ giorni e la sua orbita è approssimativamente circolare di raggio $d = 384400\text{km}$. L'accelerazione di gravità sulla superficie terrestre è $g = 9.81\text{m/s}^2$. Si valuti il raggio terrestre r_T utilizzando esclusivamente i dati precedenti (non usare nemmeno la costante gravitazionale G).

Tema d'Esame di Luglio 2017

Sull'asse che unisce la terra con la luna (distanza terra-luna $D_{TL} = 3.8 \cdot 10^8\text{m}$), a quale distanza dal centro della terra ($M_T = 6.0 \cdot 10^{24}\text{kg}$) la forza gravitazionale netta esercitata su un corpo di massa M è nulla? (massa Luna $M_L = 7.4 \cdot 10^{22}\text{kg}$)

Tema d'Esame di Settembre 2017

Un sistema binario di stelle ruota circolarmente attorno al comune centro di massa a metà del segmento che le unisce. Ciò significa che la massa delle due stelle è uguale. Se la velocità orbitale di ciascuna di esse è $v = 220\text{km/s}$ ed il periodo orbitale di ciascuna è 14.4 giorni, trovare la massa M di ciascuna stella.



Tema d'Esame di Gennaio 2018

Una persona di massa 70.0kg sta su una bilancia posta all'equatore sulla superficie di un pianeta (supposto perfettamente sferico e uniforme). Qual è il peso misurato dalla bilancia se il diametro del pianeta è il doppio di quello della terra, ma la sua densità media ed il suo periodo di rotazione sono gli stessi della terra? ($M_T = 5.97 \cdot 10^{24}\text{kg}$, $R_T = 6370\text{km}$, $T_T = 24.0\text{h}$)


4 Tipologia Esercizio 4

In particolare verranno trattati gli esercizi riguardanti:

- Fluidi

Tema d'Esame di Gennaio 2015

Del propanolo, densità $d = 803g/cm^3$ scorre attraverso un tubo orizzontale che si restringe come in figura e ha una variazione di quota di $50cm$. La sezione $A1 = 1.60 \cdot 10^3 m^2$ e $A2 = \frac{A1}{2}$. La differenza di pressione nel tubo tra il punto a sezione larga e il punto a sezione stretta è $8240Pa$. Qual'è la portata del propanolo del tubo?



Tema d'Esame di Febbraio 2015

Un rubinetto di sezione $S = 1cm^2$ è inserito nel fondo di una (grande) cisterna aperta superiormente. Il livello dell'acqua nella cisterna è $H = 4m$. Il getto d'acqua uscente dal rubinetto è diretto verticalmente verso il basso. Trascurando tutti i possibili attriti, si determini la sezione Sh del getto d'acqua dopo che questo è sceso verso il basso di un tratto $h = 20cm$. (Poiché la cisterna è grande, si può assumere che il livello dell'acqua H resti costante).


Tema d'Esame di Giugno 2015

Un corpo sferico di massa $400kg$ è immerso in acqua ($\rho_{H_2O} = 1000kg/m^3$) e il raggio del corpo è $r = 0.1m$. Il corpo viene appeso ad un palloncino piano d'aria ($\rho_{aria} = 1.2kg/m^3$). Calcolare il raggio minimo del palloncino per cui i due corpi non vadano a fondo (il palloncino è sferico e non ha massa).



Tema d'Esame di Luglio 2015

In un tubo orizzontale che presenta sezioni $S_1 = 10\text{cm}^2$ e $S_2 = 5\text{cm}^2$ scorre dell'acqua (densità 1g/cm^3) con una portata $Q = 0.82\text{kg/s}$. Determinare la differenza di pressione esistente tra le due sezioni.



Soluzione:

Conversioni

$$\rho_{\text{acqua}} = 1\text{g/cm}^3 = \frac{1 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-6}} \text{kg/m}^3 = 1 \cdot 10^3 \text{kg/m}^3$$

$$Q = 0.82\text{kg/s} = \frac{Q}{\rho} = \frac{0.82\text{kg/s}}{1 \cdot 10^3 \text{kg/m}^3} = 8.2 \cdot 10^{-4} \text{m}^3/\text{s}$$

$$S_1 = 10\text{cm}^2 = 1 \cdot 10^{-3} \text{m}^2$$

$$S_2 = 5\text{cm}^2 = 5 \cdot 10^{-4} \text{m}^2$$

Sapendo che vale:

$$A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot V_2$$

$$p_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2 \quad \Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2)$$

Essendo entrambe le velocità incognite le ricaviamo da:

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{8.2 \cdot 10^{-4} \text{m}^3/\text{s}}{1 \cdot 10^{-3} \text{m}^2} = 0.82 \text{m/s}$$

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{8.2 \cdot 10^{-4} \text{m}^3/\text{s}}{5 \cdot 10^{-4} \text{m}^2} = 1.64 \text{m/s}$$

Tornando alla formula di prima otteniamo che:


$$\Delta p = \frac{1}{2} \cdot 10^3 \text{kg/m}^3 \cdot ((1.64 \text{m/s})^2 - (0.82 \text{m/s})^2) = \frac{1}{2} \cdot 10^3 \text{kg/m}^3 \cdot (2.01 \text{m}^2/\text{s}^2) = 1.008 \text{Pa}$$

Tema d'Esame di Gennaio 2016

Una bottiglia (volume $V_B = 1\text{L}$ e massa 100g) contiene 50atm di He (gas perfetto) a temperatura ambiente. Calcolare la forza che bisogna esercitare verticalmente sulla bottiglia per tenerla completamente immersa in acqua. Massa atomica $\text{He} = 6.64 \cdot 10^{-24}\text{g}$. densità acqua 1000kg/m^3 .


Tema d'Esame di Febbraio 2016

Una conduttura di diametro costante scende da una montagna per un dislivello di $40m$. La pressione del fluido che scorre nella conduttura è di $1atm$ nel punto più alto e $5atm$ nel punto più basso. La velocità del fluido a monte è $5m/s$. Calcolare la densità del fluido.



Tema d'Esame di Giugno 2016

Un corpo sferico di massa $230kg$ è immerso in acqua ($\rho_{H_2O} = 1000kg/m^3$). Il raggio del corpo è $r = 0.07m$. Il corpo viene appeso ad un palloncino pieno d'elio ($\rho_{elio} = 0,17kg/m^3$). Calcolare il raggio minimo del palloncino per cui i due corpi non vadano a fondo; il palloncino è sferico e ha massa $85g$.



Tema d'Esame di Luglio 2016

Un cilindro con un volume iniziale di 12 litri contiene $23g$ di ossigeno (peso molecolare $A = 32g/mol$) alla temperatura di $25^\circ C$. La temperatura viene portata a $35^\circ C$ e il volume ridotto a 8.5 litri. Qual'è la pressione finale del gas? Si assuma che il gas si comporti come un gas perfetto.

Tema d'Esame di Gennaio 2017

Si ha la necessità di far fuoriuscire dell'acqua (densità $1000kg/m^3$) contenuta all'interno di una siringa senza ago, posta in orizzontale, alla velocità di $15cm/s$. Stabilire quale differenza di pressione bisogna esercitare tra lo stantuffo e il beccuccio da cui fuoriesce il fluido, sapendo che il rapporto tra le due sezioni vale 20 .

Tema d'Esame di Febbraio 2017

Un torchio idraulico è costituito da due vasi cilindrici comunicanti tra loro e contenenti acqua, disposti verticalmente, di sezioni $S_A = 2dm^2$ e $S_B = 10dm^2$, rispettivamente. Dentro i vasi possono scorrere, a tenuta e senza attrito, due pistoni A e B di masse $m_A = 20kg$ e $m_B = 150kg$. Si calcoli la massa m del carico che si deve porre sul pistone A per ottenere livelli uguali nei due vasi.


5 Tipologia Esercizio 5

In particolare verranno trattati gli esercizi riguardanti:

- Circuiti


Tema d'Esame di Gennaio 2015

Si determini la differenza di potenziali ai capi della resistenza R_4 del circuito mostrato in figura. La differenza di potenziale fornita dalla batteria è di $12V$ e i valori delle resistenze sono rispettivamente $R_2 = 15\Omega$, $R_3 = 40\Omega$, $R_4 = 24\Omega$, $R_5 = R_6 = 32\Omega$, $R_1 = R_7 = 18\Omega$




Tema d'Esame di Febbraio 2015

Nel circuito in figura, la corrente attraverso R_6 è $i_6 = 1.40A$ e le resistenze sono $R_1 = R_2 = R_3 = 2.0\Omega$, $R_4 = 16.0\Omega$, $R_5 = 8.0\Omega$ e $R_6 = 4.0\Omega$. Qual'è la forza elettromotrice della batteria (ideale)?




Tema d'Esame di Giugno 2015

Si determini la differenza di potenziali ai capi della resistenza R_4 del circuito mostrato in figura. La differenza di potenziale fornita dalla batteria è di $12V$ e i valori delle resistenze sono rispettivamente $R_2 = 15\Omega$, $R_3 = 40\Omega$, $R_4 = 25\Omega$, $R_5 = R_6 = 32\Omega$, $R_1 = R_7 = 18\Omega$.




Tema d'Esame di Luglio 2015

La differenza di potenziale fornita dalla batteria è di $12V$ e i valori delle resistenze sono rispettivamente $R_2 = 15\Omega$, $R_3 = 40\Omega$, $R_4 = 25\Omega$, $R_5 = R_6 = 32\Omega$, $R_1 = R_7 = 18\Omega$.




Tema d'Esame di Gennaio 2016

Prima di chiudere l'interruttore S_1 , la tensione ai capi del condensatore C_1 è pari a $12V$. Determinare quanto tempo deve passare dalla chiusura dell'interruttore S_1 perché la corrente che scorre in R_2 diventi inferiore a $10\mu A$. $R_1 = R_2 = 2k\Omega$. $C_1 = 1\mu F$.




Tema d'Esame di Febbraio 2016

Si determini la differenza di potenziale ai capi della resistenza R_4 del circuito mostrato in figura. La differenza di potenziale fornita dalla batteria è di $12V$ e i valori delle resistenze sono rispettivamente $R_2 = 15\Omega$, $R_3 = 40\Omega$, $R_4 = 25\Omega$, $R_5 = R_6 = 32\Omega$, $R_1 = R_7 = 18\Omega$




Tema d'Esame di Giugno 2016

Se il generatore fornisce una differenza di potenziale di $12V$, qual'è la caduta di potenziale ai capi della resistenza R_5 ? $R_1 = 35\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $R_3 = 24\Omega$, $R_4 = 18\Omega$, $R_5 = 30\Omega$, $R_6 = 21\Omega$, $R_7 = 17\Omega$, $R_8 = 19\Omega$.




Tema d'Esame di Luglio 2016

Nel circuito in figura, la corrente attraverso R_6 è $i_6 = 1.2A$ e le resistenze sono $R_1 = R_2 = R_3 = 4.0\Omega$, $R_4 = 10\Omega$, $R_5 = 4.0\Omega$, $R_6 = 2.0\Omega$. Qual'è la forza elettromotrice della batteria (ideale)?




Tema d'Esame di Febbraio 2017

Sapendo che la resistenza R_8 è attraversata da una corrente $i_8 = 0.20A$, si calcoli la corrente che attraversa R_3 . $R_8 = 10\Omega$, $R_1 = R_2 = R_3 = 5.0\Omega$, $R_4 = 12\Omega$, $R_5 = 15\Omega$.




Tema d'Esame di Giugno 2017

Si determini il valore della resistenza R_x del circuito mostrato nella figura sotto a sinistra. La differenza di potenziale fornita dalla batteria è $3V$, la corrente i_3 che scorre nella resistenza R_3 è pari a $0.1A$ ed i valori delle altre resistenze nel circuito sono $R_1 = R_2 = 5\Omega$, $R_3 = R_4 = 10\Omega$.



Tema d'Esame di Settembre 2017

Trovare le correnti i_1, i_2, i_3 nei tre rami del circuito qui sotto. $R_1 = 4.0\Omega$, $R_2 = 6.0\Omega$, $R_3 = 3.0\Omega$ ed $E_1 = 1.5V$, $E_2 = 3.0V$.



6 Tipologia Esercizio 6

7 Tipologia Esercizio 7

8 Tipologia Esercizio 8