### **PK 2 1**

### Вопросы, оцениваемые в 1 балл

- 1) Сформулировать определение общего решения ОДУ n-ого порядка.
  - **Опр.** Общим решением ДУ y' = f(x,y) называется функция  $y = \varphi(x,C)$ , обладающая следующими свойствами:
    - $\mathbb 1$ . зависит от одной независимой переменной x и одной произвольной константы C
    - 2. при любом значение константы C является решением
    - 3. для любого начального условия  $y(x_0)=y_0\ \exists C_0: y=\varphi(x,C_0)$  будет удовлетворять начальному условию
  - Опр. (Иванков бан от Марины Ивановны) Общим решением ДУ n-ого порядка  $y^{(n)} = f(x,y,y',\ldots,y^{(n-1)})$  называется функция  $y = y(x,C_1,\ldots,C_n)$ , обладающая следующими свойствами:
    - 1. зависит от одной независимой переменной x и n произвольных констант  $C_1,\ldots,C_n$
    - 2. при любых значениях констант  $C_1, \ldots, C_n$  является решением ДУ
    - 3. для любого начального условия  $y(x_0)=y_0,\,y'(x_0)=y_0',\,\ldots,\,y^{(n-1)}(x_0)=y_0^{(n-1)}$  существуют константы  $C_0,\ldots,C_n$  такие, что  $y=y(x,C_1,\ldots,C_n)$  и все её производные до n-1 включительно будут удовлетворять начальному условию
- 2) Сформулировать определение задачи Коши для ОДУ n-ого порядка.
  - Опр. Задачей Коши называют задачу нахождения решения y=y(x) ДУ y'=f(x,y), удовлетворяющего начальному условию  $y(x_0)=y_0\;(y|_{x=x_0}=y_0)$
  - Опр. (Иванков бан от Марины Ивановны) Задачей Коши называют задачу нахождения решения y(x) ДУ  $y^{(n)}=f(x,y,y',\ldots,y^{(n-1)})$ , удовлетворяющего начальным условиям  $y(x_0)=y_0$ ,  $y'(x_0)=y_0',\ldots,y^{(n-1)}(x_0)=y_0^{(n-1)}$
- 3) Сформулировать определение линейного ОДУ n-го порядка.
  - **Опр.** Линейным ДУ n-ого порядка называется ДУ, линейное относительно неизвестной функции и всех её производных, т.е. ДУ вида:

$$a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + a_2(x)y^{(n-2)} + \cdots + a_n(x)y = g(x),$$

где  $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x), g(x)$  - заданные на некотором интервале I функции.

- 4) Сформулировать определение линейной зависимости и линейной независимости системы функций на промежутке.
  - Опр. Функции  $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$  называются линейно-зависимыми на [a,b], если существуют постоянные  $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$  такие, что на [a,b] выполняется равенство  $\alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x) + \cdots + \alpha_n y_n(x) \equiv 0$ , где хотя бы одна  $\alpha_i \neq 0 (i=1,2,\ldots,n)$ . Если же это тождество выполняется только при условии, что  $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$ , то функции  $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$  называются линейно-независимыми на [a,b].

- 5) Сформулировать определение определителя Вронского системы функций.
  - **Опр.** Определителем Вронского функций  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$  называется определитель вида:

$$W = W[y_1, y_2, \ldots, y_n] = egin{bmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \ldots & y_n(x) \ y_1'(x) & y_2'(x) & \ldots & y_n'(x) \ dots & dots & dots \ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & \ldots & y_n^{(n-1)}(x) \ \end{pmatrix}$$

- 6) Сформулировать определение фундаментальной системы решений линейного однородного ОДУ
  - **Опр.** Совокупность любых n линейно независимых частных решений однородного уравнения n-ого порядка называются его фундаментальной системой решений (ФСР).
- 7) Сформулировать определение характеристического уравнения линейного ОДУ с постоянными коэффициентами.
  - Опр. (Иванков бан от Марины Ивановны) Рассмотрим линейное однородное ДУ с постоянными коэффициентами:  $a_0y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+\cdots+a_ny=0$ , где  $a_0,a_1,\ldots,a_n$  вещественные числа. Уравнение  $a_0\lambda^n+a_1\lambda^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n=0$  называется характеристическим уравнение этого ДУ.

## Вопросы, оцениваемые в 3 балла

1) Сформулировать и доказать теорему о вронскиане системы линейно зависимых функций.

**Теорема.** Если функции  $y_1(x),y_2(x),\dots,y_n(x)$  линейно зависимы на [a,b], то  $\forall x\in [a,b]\ W[y_1,y_2,\dots,y_n]=0$ 

### Доказательство.

По усл.  $y_1(x),y_2(x),\dots,y_n(x)$  линейно зависимы на  $[a,b],\implies$  ,  $\exists \alpha_i\neq 0$  такие, что  $\alpha_1y_1+\alpha_2y_2+\dots+\alpha_ny_n=0.$  Дифференцируя n-1 раз получим систему:

$$\left\{egin{aligned} lpha_1 y_1 + lpha_2 y_2 + \cdots + lpha_n y_n &= 0 \ lpha_1 y_1' + lpha_2 y_2' + \cdots + lpha_n y_n' &= 0 \ \cdots \ lpha_1 y_1^{(n-1)} + lpha_2 y_2^{(n-1)} + \cdots + lpha_n y_n^{(n-1)} &= 0 \end{aligned}
ight.$$

Получили СЛАУ с n неизвестными  $lpha_1,lpha_2,\ldots,lpha_n$ 

Так как хотя бы одна  $\alpha_i \neq 0$ , то эта система имеет ненулевое решение. Определителем такой системы является определитель Вронского  $W[y_1,y_2,\ldots,y_n]$ . Полученная система имеет ненулевое решение лишь в том случаем, когда её определитель равен 0. То есть:

$$W(x) = egin{array}{ccccc} y_1(x) & y_2(x) & \dots & y_n(x) \ y_1'(x) & y_2'(x) & \dots & y_n'(x) \ dots & dots & dots \ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \ \end{array} egin{array}{c} orall x \in [a,b]_igatimes \ & dots \ & dot$$

# 2) Сформулировать и доказать теорему о вронскиане системы линейно независимых частных решений линейного однородного ОДУ.

**Теорема.** Если линейно независимые на [a,b] функции  $y_1(x),y_2(x),\dots,y_n(x)$  являются решениями ЛОДУ с непрерывными на [a,b] коэффициентами  $p_i(x)$   $(i=\overline{1,n})$ , то определитель Вронского этих функций отличен от нуля  $\forall x \in [a,b]$ 

Доказательство. (методом от противного)

Допустим, что для какой-то точки  $x_0 \in [a,b] \; W(x_0) = 0$ 

Составим СЛАУ относительно  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ :

$$\left\{egin{aligned} &lpha_1 y_1(x_0) + lpha_2 y_2(x_0) + \dots + lpha_n y_n(x_0) = 0 \ &lpha_1 y_1'(x_0) + lpha_2 y_2'(x_0) + \dots + lpha_n y_n'(x_0) = 0 \ &\dots \ &lpha_1 y_1^{(n-1)}(x_0) + lpha_2 y_2^{(n-1)}(x_0) + \dots + lpha_n y_n^{(n-1)}(x_0) = 0 \end{aligned}
ight.$$

В силу допущения определитель этой системы  $W(x_0)=0, x_0\in [a,b], \implies$  , эта система имеет ненулевое решение, то есть хотя бы одно из  $\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n$  отлично от нуля

Рассмотрим  $y = \alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x) + \dots + \alpha_n y_n(x)$ , то есть линейную комбинацию частных решений.

Следовательно, эта функция сама является решением того же ЛОДУ, удовлетворяющим начальному условию  $y(x_0)=y_0,y'(x_0)=y_0',\dots,y^{(n-1)}(x_0)=y_0^{(n-1)}=0$ 

Но этим же начальным условиям удовлетворяет и тривиальное решение y=0

По теореме о единственности решения:  $lpha_1 y_1(x) + lpha_2 y_2(x) + \dots + lpha_n y_n(x) = 0$  на [a,b] и  $\exists lpha_i 
eq 0$ 

По определению линейной зависимости функций  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$  - линейно зависимые функции.

Но это противоречит условию теоремы. Следовательно, предположение неверно и  $otal x_0 \in [a,b]$  такой, что  $W(x_0) \neq 0$ .

To есть  $W(x) 
eq 0 \ orall x \in [a,b]$  lacktriangle

# 3) Сформулировать и доказать теорему о существовании фундаментальной системы решений линейного однородного ОДУ n-го порядка.

**Теорема.** У каждого ЛОДУ n-ого порядка  $y^{(n)}+p_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+p_n(x)y=0$  с непрерывными коэффициентами  $p_i(x), i=\overline{1,n},$  существует ФСР

#### Доказательство.

Для построения ФСР зададим  $n^2$  чисел (начальные условия):

$$egin{aligned} y_1(x_0) &= y_{1_0} & y_1'(x_0) &= y_{1_0}' & \dots & y_1^{(n-1)}(x_0) &= y_{1_0}^{(n-1)} \ y_2(x_0) &= y_{2_0} & y_2'(x_0) &= y_{2_0}' & \dots & y_2^{(n-1)}(x_0) &= y_{2_0}^{(n-1)} \ & \dots & & \dots & & \dots \ y_n(x_0) &= y_{n_0} & y_n'(x_0) &= y_{n_0}' & \dots & y_n^{(n-1)}(x_0) &= y_{n_0}^{(n-1)} \end{aligned}$$

Эти числа должны удовлетворять следующему условию:

Точка  $x_0$  - произвольная точка  $\in [a,b]$ 

Тогда получается, что решение  $y_i(x), i=\overline{1,n}$ , удовлетворяет этим начальным условиям с определителем Вронского  $W(x_0)\neq 0$ . Следовательно, функции  $y_1(x),y_2(x),\dots,y_n(x)$  линейно независимы на [a,b] и образуют одну из ФСР ЛОДУ n-ого порядка.

## 4) Сформулировать и доказать теорему о структуре общего решения линейного однородного ОДУ n-го порядка.

**Теорема.** Общее решение на [a,b] ЛОДУ n-ого порядка L[y]=0 с непрерывными на [a,b] коэффициентами  $p_i(x)$   $(i=\overline{1,n})$  равно линейной комбинации ФСР с произвольными постоянными коэффициентами, т.е.:  $y_{o.o.}=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+\cdots+C_ny_n(x)$ , где  $y_1(x),y_2(x),\ldots,y_n(x)$  - ФСР ЛОДУ L[y]=0, а  $C_1,C_2,\ldots,C_n-const$ 

#### Доказательство.

**1)** Докажем, что  $C_1y_1+C_2y_2+\cdots+C_ny_n$  - решение ЛОДУ L[y]=0 Подставим его в ДУ:

$$L[y] = L[C_1y_1 + C_2y_2 + \dots + C_ny_n] = C_1L[y_1] + C_2L[y_2] + \dots + C_nL[y_n] = 0$$

Следовательно,  $y=C_1y_1+C_2y_2+\cdots+C_ny_n$  является решением ЛОДУ L[y]=0

**2)** Докажем, что  $y=C_1y_1+C_2y_2+\cdots+C_ny_n$  - общее решение ЛОДУ L[y]=0

По условию все коэффициенты есть непрерывные функции на  $[a,b], \implies$  , выполнены все условия теоремы Коши  $\exists$  и ! решения ЛОДУ L[y]=0.

Решение  $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n$  будет общим решением, если найдутся единственным образом постоянные  $C_i$  при произвольно заданных начальных условиях  $y(x_0) = y_0$ ,

$$y'(x_0) = y_0', \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$$
, где  $x_0 \in [a,b]$ 

Пусть решение и его производные удовлетворяют этим условиям:

$$egin{cases} C_1y_1(x_0) + C_2y_2(x_0) + \cdots + C_ny_n(x_0) = y_0 \ C_1y_1'(x_0) + C_2y_2'(x_0) + \cdots + C_ny_n'(x_0) = y_0' \ \cdots \ C_1y_1^{(n-1)}(x_0) + C_2y_2^{(n-1)}(x_0) + \cdots + C_ny_n^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

Это неоднородная СЛАУ относительно  $C_1, C_2, \ldots, C_n$ . Определитель этой системы является определителем Вронского  $W(x_0)$  для линейно независимой системы функций  $y_1, y_2, \ldots, y_n$  (решение ЛОДУ L[y]=0) и тогда  $W(x)\neq 0$ . Следовательно, система имеет единственное решение  $C_1, C_2, \ldots, C_n$  для произвольной точки  $(x_0, y_0, y_0', \ldots, y_0^{(n-1)}) \Longrightarrow y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n$  - общее решение ЛОДУ L[y]=0

- 5) Сформулировать и доказать теорему о структуре общего решения линейного неоднородного ОДУ n-го порядка.
- 6) Сформулировать и доказать теорему о наложении (суперпозиции) частных решений линейного неоднородного ОДУ.
- 7) Сформулировать и доказать свойства частных решений линейного однородного ОДУ

**Теорема 1.** Если функция  $y_0(x)$  является решение ЛОДУ L[y]=0, то функция  $Cy_0(x)$ , где C=const, тоже является решением ЛОДУ L[y]=0

### Доказательство.

$$y_0(x)$$
 - решение ЛОДУ  $L[y]=0$  по усл.,  $\implies$  ,  $L[y_0]=0$ 

Найдём (по свойству однородности):  $L[Cy_0] = CL[y_0] = C \cdot 0 = 0$ 

 $L[Cy_0]=0 \implies Cy_0(x)$  является решение ЛОДУ L[y]=0 lacktriangle

**Теорема 2.** Если функции  $y_1(x)$  и  $y_2(x)$  являются решениями ЛОДУ L[y]=0, то функция  $y_1(x)+y_2(x)$  тоже является решение ЛОДУ L[y]=0

### Доказательство.

$$y_1(x)$$
 и  $y_2(x)$  - решения ЛОДУ  $L[y]=0$  по усл.,  $\implies$  ,  $L[y_1]=0, L[y_2]=0$  Найдём (по свойству аддитивности):  $L[y_1+y_2]=L[y_1]+L_1[y_2]=0+0=0$   $L[y_1+y_2]=0 \implies (y_1(x)+y_2(x))$  является решение ЛОДУ  $L[y]=0$   $\blacktriangle$ 

Следствие. Линейная комбинация с произвольными постоянными коэффициентами

 $C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + \cdots + C_my_m(x)$  решений  $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_m(x)$  ЛОДУ L[y] = 0 тоже является решением этого ЛОДУ.

#### Доказательство.

 $L[y_1]=0, L[y_2]=0, \ldots, L[y_m]=0$  по условию

Найдём

$$L[C_1y_1+C_2y_2+\cdots+C_my_m]=L[C_1y_1]+L[C_2y_2]+\cdots+L[C_my_m]=C_1L[y_1]+C_2L[y_2]+\cdots+C_mL[y_m]=0$$
  $L[C_1y_1+C_2y_2+\cdots+C_my_m]=0 \implies C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+\cdots+C_my_m(x)$  является решением ЛОДУ  $L[y]=0$   $\blacktriangle$ 

**Утверждение.** ЛОДУ L[y]=0 всегда имеет тривиальное решение  $y\equiv 0$ 

**Теорема.** Совокупность решений ЛОДУ L[y] = 0 образует линейное пространство.

### 8) Вывести формулу Остроградского-Лиувилля для линейного ОДУ 2-го порядка

Рассмотрим ЛОДУ 2-ого порядка  $y''+p_1(x)y'+p_2(x)y=0,\, p_i(x)$  - непрерывная на [a,b] функция для  $i=\overline{1,n}.$ 

Пусть  $y_1(x), y_2(x)$  - решения этого ЛОДУ, тогда по определению:

$$egin{cases} y_1''+p_1(x)y_1'+p_2(x)y_1=0 & |\cdot(-y_2)\ y_2''+p_1(x)y_2'+p_2(x)y_2=0 & |\cdot y_1 \end{cases} \ + egin{cases} -y_1''y_2-p_1(x)y_1'y_2-p_2(x)y_1y_2=0\ y_2'y_1+p_1(x)y_2'y_1+p_2(x)y_2y_1=0 \end{cases}$$

Сложив уравнения, получим:

$$y_2''y_1 - y_1''y_2 + p_1(x)(y_2'y_1 - y_1'y_2) = 0$$
 (\*)

Заметим, что:

$$W(x) = egin{bmatrix} y_1 & y_2 \ y_1' & y_2' \end{bmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1'$$

Тогда уравнение (\*) примет вид:

$$y_2''y_1 - y_1''y_2 + p_1(x)W(x) = 0$$
 (\*\*)

Найдём:

$$rac{dW(x)}{dx} = (y_1y_2' - y_1'y_2)' = y_1'y_2' + y_1y_2'' - y_1''y_2 - y_1'y_2' = y_1y_2'' - y_1''y_2$$

Подставляя в (\*\*), получим:

$$egin{split} rac{dW(x)}{dx} + p_1(x)W(x) &= 0 \ &rac{dW(x)}{W(x)} &= -p_1(x)dx \ &\int_{x_0}^x rac{dW(x)}{W(x)} &= -\int_{x_0}^x p_1(x)\,dx \ &\ln|W(x)| - \ln|W(x_0)| &= -\int_{x_0}^x p_1(x)\,dx \end{split}$$

Тогда получим формулу Остроградского-Лиувилля:

$$W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x p_1(x)\ dx}$$

- 9) Вывести формулу для общего решения линейного однородного ОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами в случае простых действительных корней характеристического уравнения.
- 10) Вывести формулу для общего решения линейного однородного ОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами в случае комплексных корней характеристического уравнения.
- 11) Вывести формулу для общего решения линейного однородного ОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами в случае кратных корней характеристического уравнения.
- 12) Описать метод Лагранжа вариации произвольных постоянных для линейного неоднородного ОДУ 2-го порядка и вывести систему соотношений для варьируемых переменных.