

Transmission

- Mains non lavées (après être allé aux toilettes)
- Nourriture ou eau contaminée par les excréments d'une personne malade
- Fruits et légumes contaminés
- Contact physique étroit avec un malade

Symptômes

- Diarrhée contenant du sang.
- Fièvre, crampes abdominales.
- Déshydratation.

Prévention

- Promouvoir une eau propre et salubre (notamment récipient d'eau couvert et propre dans la maison)
- Utiliser des installations d'assainissement appropriées (latrines hygiéniques et propres)
- Favoriser le lavage des mains avec du savon (en particulier après être allé aux toilettes ou avoir nettoyé un bébé)
- Promouvoir une bonne hygiène alimentaire (aliments bien cuits, nourriture couverte, ustensiles propres, etc.)
- Encourager l'allaitement exclusif au sein pendant les six premiers mois
- Accroître la mobilisation sociale et la communication pour le changement de comportement

Personnes vulnérables

- Enfants de moins de cinq ans
- Enfants malnourris
- Personnes, en particulier les enfants, dont le système immunitaire est affaibli (par exemple en raison d'une infection par le VIH)
- Personnes vivant dans des zones où les structures et services liés à l'eau, l'assainissement et l'hygiène sont de mauvaise qualité
- Personnes âgées

En cas d'épidémie

- Mettre en place une surveillance communautaire
- Repérer les cas et les aiguiller vers des établissements de santé
- Administrer des solutions de réhydratation orale (SRO)
- Promouvoir une bonne hygiène alimentaire (aliments bien cuits, nourriture couverte, ustensiles propres, etc.)

- Encourager l'allaitement au sein, même lorsque le nourrisson ou l'enfant est malade
- Promouvoir une eau propre et salubre (notamment récipient d'eau couvert et propre dans la maison)
- Favoriser l'utilisation d'installations d'assainissement appropriées (latrines hygiéniques et propres)
- Encourager le lavage des mains avec du savon (en particulier après être allé aux toilettes ou avoir nettoyé un bébé)
- Accroître la mobilisation sociale et la communication pour le changement de comportement
- Promouvoir les pratiques sanitaires recommandées

Évaluation au niveau local

Établissez une carte de la communauté et portez-y les informations que vous récoltez. Prenez note d'autres détails.

- Quand se sont déclarés les premiers cas de diarrhée ?
- Combien de personnes sont atteintes de diarrhée sanglante ? Où ?
- Combien de personnes sont mortes de diarrhée sanglante ? Où ? Quand ?
- Combien de personnes vivent dans la communauté ou la zone touchée ?
- Combien d'enfants de moins de cinq ans vivent dans la zone ?
- Qui sont les personnes vulnérables et où se trouvent-elles ?
- Les enfants de la communauté touchée sont-ils généralement bien nourris ?
- Y a-t-il toujours suffisamment de nourriture pour la population ?
- À quel point l'allaitement est-il répandu ?
- D'où provient l'eau potable ? La source est-elle sûre ?
- Les membres de la communauté savent-ils traiter l'eau ? Comment s'y prennent-ils ?
- Quelles installations d'assainissement (latrines communes notamment) sont à disposition ? Sont-elles utilisées ?
- Quelles installations sont mises à disposition pour le lavage des mains ? Y a-t-il du savon ?
- Où se situent les établissements et services de santé locaux (y compris les soignants traditionnels et communautaires) ?
- Quelles sont les habitudes, pratiques et croyances de la communauté en matière de soins et d'alimentation des malades ? Les femmes continuent-elles d'allaiter leurs enfants lorsque ceux-ci sont malades ?
- Un programme de mobilisation sociale ou de promotion de la santé est-il en place ?
- Quelles sont les habitudes, pratiques et croyances de la communauté en matière d'hygiène, d'assainissement et d'eau ?
- Quels sources ou moyens d'information sont les plus utilisés ?
- Des rumeurs ou fausses informations au sujet de la diarrhée sanglante circulent-elles dans la communauté ?
- Les membres de la communauté peuvent-ils repérer les signes et les symptômes de la déshydratation ?
- Savent-ils préparer une SRO ? Disposent-ils des ressources nécessaires pour en produire ?

Actions de volontariat

Voir les outils d'action suivants pour plus d'informations sur les actions à entreprendre contre diarrhée sanglante aiguë:

- 1 - Surveillance communautaire
- 2 - Cartographie communautaire
- 3 - Communication avec la population
- 4 - Orientation vers les services de santé
- 5 - Protection et sécurité des volontaires
- 7 - Évaluation de la déshydratation
- 9 - Préparation d'une solution de réhydratation orale (SRO)
- 10 - Administration d'une solution
- 12 - Lutte contre la fièvre
- 13 - Allaitement au sein
- 19 - Soutien psychosocial
- 29 - Promotion de l'hygiène
- 30 - Propreté et sûreté de l'eau dans les habitations
- 31 - Hygiène des aliments
- 32 - Assainissement
- 33 - Construction et entretien des latrines
- 34 - Lavage des mains avec du savon
- 39 - Préparation et utilisation de désinfectants
- 43 - Mobilisation sociale et changement de comportement