

Transmission

- Contact direct ou indirect (inhalation comprise) avec le sang ou les organes d'animaux infectés
- Piqûres de moustiques
- Consommation de lait non pasteurisé (non réchauffé) ou cru provenant d'animaux infectés

Symptômes

- Débute par de la fièvre, des maux de tête et des douleurs articulaires et musculaires.
- S'accompagne parfois de raideurs dans la nuque, de sensibilité à la lumière et de diarrhée.
- Peut provoquer des changements dans la vision et parfois une perte de vue définitive.
- Certains patients souffrent d'une perte de mémoire, d'hallucinations ou de délires, de désorientation, de vertiges, de crises d'épilepsie, de fatigue et de pertes de conscience.
- La forme la plus grave se caractérise par une éruption cutanée, un jaunissement de la peau et du blanc de l'œil (jaunisse) et des saignements du nez et dans la bouche.

Prévention

- Vacciner les animaux
- Restreindre ou interdire la circulation du bétail
- Prendre en charge et abattre les animaux en toute sécurité (par exemple en respectant les mesures d'hygiène des mains et en portant des gants ainsi qu'un EPP approprié)
- Bien cuire les produits d'origine animale (viande, lait, sang) Lutter contre les vecteurs (moustiques aux stades larvaire et adulte)
- Se protéger contre les piqûres de moustiques (utiliser une moustiquaire, porter des manches longues et un pantalon, appliquer de l'antimoustiques, etc.)
- Se laver les mains avec du savon
- Avoir recours à la mobilisation sociale et à la communication pour le changement de comportement
- Garder les animaux sous surveillance

Personnes vulnérables

- Principalement celles qui sont en contact avec le sang ou les organes d'animaux infectés (par exemple les bergers, éleveurs, employés des abattoirs et vétérinaires)

En cas d'épidémie

- Repérer rapidement les malades et les orienter vers des établissements de santé
- Accroître la mobilisation sociale et la communication pour le changement de comportement
- Prodiguer des conseils sur la manière d'abattre des animaux en toute sécurité
- Prodiguer des conseils sur la manière de prendre en charge en toute sécurité des animaux malades

- Désinfecter et éliminer de manière sûre les carcasses d'animaux et les fœtus avortés
- Restreindre ou interdire la circulation du bétail
- S'assurer que les produits d'origine animale soient bien cuits (viande, lait, sang)
- Promouvoir le lavage des mains avec du savon
- Lutter contre les vecteurs (moustiques aux stades larvaire et adulte)
- Encourager la protection contre les piqûres de moustiques (utiliser une moustiquaire, porter des manches longues et un pantalon, appliquer de l'antimoustiques, etc.)
- Garder les animaux sous surveillance
- Fournir un soutien psychosocial

Évaluation au niveau local

Établissez une carte de la communauté et portez-y les informations que vous récoltez. Prenez note d'autres détails.

- Quand se sont déclarés les premiers cas de fièvre de la vallée du Rift ?
- Combien de personnes sont atteintes de fièvre de la vallée du Rift ? Où ?
- Combien de personnes en sont mortes ? Où ?
- Combien de personnes vivent dans la communauté ou la zone touchée ? Combien d'enfants de moins de cinq ans vivent dans la zone ?
- Qui sont les personnes vulnérables et où se trouvent-elles ?
- Qui est le plus touché par la fièvre de la vallée du Rift ?
- Existe-t-il des zones ou marchés où se trouvent des animaux connus pour être infectés par la fièvre de la vallée du Rift ? Où se trouvent-ils ?
- Quelles sont les habitudes, pratiques et croyances de la communauté en matière de prise en charge et d'abattage des animaux, en particulier de ceux qui sont malades ou morts ?
- La viande et le lait sont-ils bien cuits avant d'être consommés ?
- Existe-t-il des installations pour se laver les mains dans la communauté, dans les foires d'animaux ou les autres espaces de rassemblement du bétail ? Du savon et de l'eau sont-ils toujours à disposition ?
- Les autorités ont-elles mis en place un programme de lutte contre les vecteurs ?
- Quelles sont les habitudes, pratiques et croyances de la communauté en matière d'utilisation d'antimoustiques, de pulvérisateurs, etc. ?
- Combien de maisons sont munies de moustiquaires aux fenêtres et aux portes ?
- Combien de personnes dorment sous une moustiquaire la nuit ? Les moustiquaires sont-elles accrochées et entretenues de manière appropriée ? Si les personnes n'utilisent pas de moustiquaires, quelle en est la raison ?
- Comment les ordures et déchets solides sont-ils habituellement éliminés dans la communauté ?
- Où se situent les établissements et services de santé locaux (y compris les soignants traditionnels et communautaires auxquels la population demande conseil) ?
- Quelles sont les habitudes, pratiques et croyances de la communauté en matière de soins et d'alimentation des malades ?
- Un programme de mobilisation sociale ou de promotion de la santé est-il en place ?
- Quelles sources d'information sont les plus utilisées ?
- Des rumeurs ou fausses informations au sujet de la fièvre de la vallée du Rift circulent-elles dans la communauté ?

Actions de volontariat

Voir les outils d'action suivants pour plus d'informations sur les actions à entreprendre contre fièvre de la vallée du rift:

- 1 - Surveillance communautaire
- 2 - Cartographie communautaire
- 3 - Communication avec la population
- 4 - Orientation vers les services de santé
- 5 - Protection et sécurité des volontaires
- 19 - Soutien psychosocial
- 34 - Lavage des mains avec du savon
- 36 - Lutte contre les vecteurs
- 37 - Moustiquaires
- 38 - Élimination des déchets et campagnes de nettoyage
- 41 - Prise en charge et abattage des animaux
- 43 - Mobilisation sociale et changement de comportement