Transmission

- Mains non lavées (après être aux toilettes)
- Nourriture et boissons contaminées par des mains sales ou des mouches
- Eau contaminée par des excréments humains

Symptômes

- Fatigue (épuisement), maux de tête et d'estomac, fièvre.
- Diarrhée possible chez les jeunes enfants, ou constipation chez les enfants plus âgés et les adultes.
- Dans les cas graves, confusion, choc, hémorragie interne et mort.

Prévention

- Eau propre et salubre (notamment récipient d'eau couvert et propre dans la maison)
- Utilisation d'installations d'assainissement appropriées (latrines hygiéniques et propres)
- Lavage des mains avec du savon (en particulier après être allé aux toilettes ou avoir nettoyé un bébé)
- Bonne hygiène alimentaire (aliments bien cuits, nourriture couverte, ustensiles propres, etc.)
- Allaitement exclusif au sein pendant les six premiers mois
- Vaccinations de routine
- Mobilisation sociale et communication pour le changement de comportement

Personnes vulnérables

- · Enfants malnourris
- Personnes, en particulier les enfants, dont le système immunitaire est affaibli (par exemple en raison d'une infection par le VIH)
- Personnes vivant dans des zones où les structures et services liés à l'eau, l'assainissement et l'hygiène sont de mauvaise qualité

En cas d'épidémie

- Repérer les cas et les aiguiller vers des établissements de santé
- Promouvoir une eau propre et salubre (notamment récipient d'eau couvert et propre dans la maison)
- Favoriser l'utilisation d'installations d'assainissement appropriées (latrines hygiéniques et propres)
- Encourager le lavage des mains avec du savon (en particulier après être allé aux toilettes ou avoir nettoyé un bébé)
- Promouvoir une bonne hygiène alimentaire (aliments bien cuits, nourriture couverte, ustensiles propres, etc.)
- Soutenir les campagnes de vaccination de masse
- Accroître la mobilisation sociale et la communication pour le changement de comportement

• Encourager les femmes à allaiter et à poursuivre l'allaitement lorsque l'enfant est malade

Évaluation au niveau local

Établissez une carte de la communauté et portez-y les informations que vous récoltez. Prenez note d'autres détails.

- Quand se sont déclarés les premiers cas de fièvre typhoïde ?
- Combien de personnes sont atteintes de fièvre typhoïde ? Où ?
- Combien de personnes sont mortes de fièvre typhoïde ? Où ?
- Combien de personnes vivent dans la communauté ou la zone touchée ?
- Combien d'enfants de moins de cinq ans vivent dans la zone?
- Qui sont les personnes vulnérables et où se trouvent-elles ?
- Les enfants de la communauté touchée sont-ils généralement bien nourris ?
- Y a-t-il toujours suffisamment de nourriture pour la population ?
- À quel point l'allaitement est-il répandu?
- Où se situent les établissements et services de santé locaux (y compris les soignants traditionnels et communautaires)?
- Quelles sont les habitudes, pratiques et croyances de la communauté en matière de soins et d'alimentation des malades? Les femmes continuent-elles d'allaiter leurs enfants lorsque ceux-ci sont malades?
- D'où provient l'eau potable ? La source est-elle sûre ? L'eau est-elle traitée ?
- Quelles installations d'assainissement et latrines communes sont à disposition ? Sont-elles utilisées ?
- Quelles installations sont mises à disposition pour le lavage des mains ? Y a-t-il du savon ?
- Un programme de mobilisation sociale ou de promotion de la santé est-il en place ?
- Un programme de vaccination est-il prévu ou en place?
- Quelles sont les habitudes, pratiques et croyances de la communauté en matière d'hygiène, d'assainissement et d'eau?
- Quels sources ou moyens d'information sont les plus utilisés ?
- Des rumeurs ou fausses informations au sujet de la fièvre typhoïde circulent-elles dans la communauté?

Actions de volontariat

Voir les outils d'action suivants pour plus d'informations sur les actions à entreprendre contre fièvre typhoïde:

- 1 Surveillance communautaire
- 2 Cartographie communautaire
- 3 Communication avec la population
- 4 Orientation vers les services de santé
- 5 Protection et sécurité des volontaires
- 12 Lutte contre la fièvre
- 13 Allaitement au sein
- 19 Soutien psychosocial
- 24 Vaccinations de routine
- 25 Campagnes de vaccination de masse

- 29 Promotion de l'hygiène
- 30 Propreté et sûreté de l'eau dans les habitations
- 31 Hygiène des aliments
- 32 Assainissement
- 33 Construction et entretien des latrines
- 34 Lavage des mains avec du savon
- 43 Mobilisation sociale et changement de comportement