

# Métodos de Demostración

Clase 08

IIC 1253

Prof. Miguel Romero

# Outline

**Obertura**

Métodos de Demostración

Epílogo

# Objetivos de la clase

- Conocer métodos de demostración
- Relacionar los métodos con fórmulas en predicados

# Outline

Obertura

**Métodos de Demostración**

Epílogo

# ¿Qué es una demostración?

## Definición

Una **demostración** es un **argumento válido** para establecer la verdad de una **afirmación matemática**.

# Afirmaciones matemáticas

¿Qué tipos de afirmaciones matemáticas conocemos?

- Definición
- Axioma
- Teorema
- Proposición
- Lema
- Corolario
- Conjetura
- Problema abierto

# Afirmaciones matemáticas

## Definición

Una **afirmación matemática** es una sentencia sobre objetos matemáticos que puede ser verdadera o falsa.

## Observación

Todo predicado o fórmula es una afirmación matemática.

## Ejemplos

- Todo número natural cumple que si es par, entonces su sucesor es impar.
- Existe un número natural tal que todo número es mayor a él.

# Axiomas

## Definición

Un **axioma** es una afirmación matemática que se considera evidente y se acepta sin requerir demostración previa.

¿Qué axiomas conocemos?



# Axiomas

## Axiomatización de Peano

- $0 \in \mathbb{N}$
- $\forall x (x = x)$
- $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$
- $\forall x \forall y \forall z (x = y \wedge y = z \rightarrow x = z)$
- $\forall x \forall y (x = y \wedge y \in \mathbb{N} \rightarrow x \in \mathbb{N})$
- $\forall x (x \in \mathbb{N} \rightarrow S(x) \in \mathbb{N})$
- $\forall x \forall y (x = y \leftrightarrow S(x) = S(y))$
- $\neg(\exists x (S(x) = 0))$

# Teoremas

## Definición

Un **teorema** es una afirmación matemática verdadera y demostrable.

## Ejemplos

- Teorema de Pitágoras.
- Teorema fundamental del álgebra.
- Teorema de los 4 colores.
- Teoremas de incompletitud de Gödel.

# Teoremas

## Definición

Un **lema** es un resultado menor cuyo fin es ayudar en la demostración de un teorema.

## Definición

Una **proposición** es un resultado interesante, pero de menor importancia que un teorema.

## Definición

Un **corolario** es una afirmación matemática cuya demostración se deriva casi directamente de un teorema.

# Conjeturas

## Definición

Una conjetura es una afirmación matemática que se cree que es verdad pero **NO** se ha demostrado.

## Ejemplo

- *“Todo número par mayor a 2 puede ser expresado como suma de dos primos”*

Conjetura de Goldbach

- $\forall x \forall y \forall z \forall n (n > 2 \rightarrow x^n + y^n \neq z^n)$

(ex) Conjetura de Fermat

# Problemas abiertos

## Definición

Un **problema abierto** es una afirmación matemática la cual no se sabe si es verdadera o falsa, y para la cual todavía no se conoce una solución o demostración.

¿Cuál es el problema abierto más importante en ciencia de la computación?

# ¿Qué es una demostración?

## Definición

Una **demostración** es un **argumento válido** para establecer la verdad de una **afirmación matemática**.

Un argumento válido es una secuencia de argumentos que puede estar compuesta por:

- Axiomas
- Hipótesis (si existen)
- Afirmaciones previamente demostradas

Cada argumento en la secuencia de argumentos está conectado con el anterior por una regla de inferencia. El último paso de la secuencia establece la verdad de la afirmación.

Se parece a algo que ya vimos, ¿no?

# ¿Qué **NO** es una demostración?

- Una secuencia de símbolos
- Una secuencia disconexa de argumentos

## IMPORTANTE

La secuencia de argumentos debe ser lo más **clara**, **precisa** y **completa** posible. La demostración debe **convencer** al lector u oyente sin dejarle ninguna duda sobre la correctitud de la demostración.

# ¿Cómo encontramos una secuencia de argumentos para demostrar un teorema?

- Experiencia
- Intuición
- Creatividad
- Perseverancia
- **Métodos de demostración**

Supongamos que tenemos una afirmación como la siguiente:

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

¿Qué métodos de demostración podemos ocupar?



# Métodos de demostración

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

- Directa
- Contrapositivo
- Contradicción
- Por análisis de casos
- Otros tipos de demostración

Veremos cada una de las distintas metodologías.

# Demostración directa

También se conoce del latín *modus ponendo ponens* (“la forma en que se afirma afirmando”). Por demostrar:

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

## Método directo

Suponemos que  $P(n)$  es verdadero para un  $n$  arbitrario y demostramos que  $Q(n)$  también es verdadero.

### Ejercicio

Un entero  $n \in \mathbb{Z}$  se dice un **cuadrado perfecto** si existe un  $k \in \mathbb{Z}$  tal que  $n = k^2$ . Demuestre que si  $n$  y  $m$  son cuadrados perfectos, entonces  $n \cdot m$  también lo es.

### Ejercicio

Sea  $n \in \mathbb{N}$ . Demuestre que si  $n$  es impar, entonces  $n^2$  es impar.

# Contrapositivo

También se conoce del latín *modus tollendo tollens* (“el camino que niega al negar”). Por demostrar:

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

## Método por contrapositivo

Suponemos que  $Q(n)$  es falso para un  $n$  arbitrario y demostramos que  $P(n)$  también es falso.

### Ejercicio

Sea  $n \in \mathbb{N}$ . Demuestre que si  $3n + 2$  es impar, entonces  $n$  es impar.

### Ejercicio

Sea  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ . Demuestre que si  $n = a \cdot b$  entonces  $a \leq \sqrt{n}$  o  $b \leq \sqrt{n}$ .

# Demostración por contradicción

*"Reductio ad absurdum, which Euclid loved so much, is one of a mathematician's finest weapons. It is a far finer gambit than any chess play: a chess player may offer the sacrifice of a pawn or even a piece, but a mathematician offers the game."*

A mathematician's apology (G. H. Hardy).

# Demostración por contradicción

Por demostrar:

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

## Método por contradicción

Suponemos que existe un  $n$  tal que  $P(n)$  es verdadero y  $Q(n)$  es falso e inferimos una contradicción.

¿A qué se parece?

### Ejercicio

Demuestre que  $\sqrt{2}$  es irracional.

### Ejercicio

Demuestre que existe una cantidad infinita de números primos.

# Demostración por contradicción

## Ejercicio

Demuestre que  $\sqrt{2}$  es irracional.

Por contradicción suponemos que  $\sqrt{2}$  es racional, y entonces puede escribirse de la forma  $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$  con  $a, b \in \mathbb{Z}$  sin factores en común y  $b \neq 0$ . Notemos que al no tener factores en común, no pueden ser ambos pares. Desarrollando la igualdad:

$$\begin{aligned}\sqrt{2} &= \frac{a}{b} \\ 2 &= \frac{a^2}{b^2} && \text{(Elevamos al cuadrado)} \\ a^2 &= 2b^2\end{aligned}$$

Entonces,  $a^2$  es par y por teorema anterior  $a$  también es par:  $a = 2k$ .

# Demostración por contradicción

## Ejercicio

Demuestre que  $\sqrt{2}$  es irracional.

Entonces,  $a^2$  es par y por teorema anterior  $a$  también es par:  $a = 2k$ .

Reemplazando en la igualdad anterior:

$$a^2 = 2b^2$$

$$(2k)^2 = 2b^2$$

$$4k^2 = 2b^2$$

$$b^2 = 2k^2$$

Entonces,  $b^2$  es par, y por teorema anterior  $b$  también es par. Esto es una contradicción, ya que entre  $a$  y  $b$  alguno debe ser un número impar.

Concluimos entonces que  $\sqrt{2}$  no puede ser racional, y por lo tanto es irracional.

# Demostración por análisis de casos

Por demostrar:

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

Dividimos el dominio de la interpretación  $\mathcal{I}$  con que trabajamos en una cantidad finita de casos  $C_1, \dots, C_n$ , tal que:

$$\mathcal{I}(\text{dom}) = \bigcup_{i=1}^n C_i$$

Método por casos

Para cada subdominio  $C_1, \dots, C_n$  demostramos que:

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

## Ejercicio

Sea  $n \in \mathbb{Z}$ . Demuestre que  $n^2 \geq n$ .



# Demostración por análisis de casos

## Ejercicio

Sea  $n \in \mathbb{Z}$ . Demuestre que  $n^2 \geq n$ .

Sea  $n \in \mathbb{Z}$ . Tenemos 3 casos:

1.  $n = 0$ : es claro que se cumple la propiedad.
2.  $n > 0$ : como  $n \in \mathbb{Z}$  tenemos que  $n \geq 1$ .  
Si multiplicamos por  $n$  a ambos lados, obtenemos que  $n^2 \geq n$ .
3.  $n < 0$ : si multiplicamos por  $n$  (negativo) a ambos lados:  
 $n^2 > 0 \Rightarrow n^2 > n \Rightarrow n^2 \geq n$ .

Ya que no existen más casos, concluimos que la propiedad se cumple para todo  $n \in \mathbb{Z}$ .  $\square$

# Otros tipos de demostración

- Demostración por doble-implicación
- Demostración por contra-ejemplo
- Demostración existencial

# Demostración por doble implicación

Por demostrar:

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$$

## Demostración por doble implicación

Se deben demostrar ambas direcciones por separado. En términos formales:

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$$

### Ejercicio

Sea  $n \in \mathbb{N}$ . Demuestre que  $n$  es impar si y sólo si  $n^2$  es impar.

# Demostración por contra-ejemplo

Por demostrar:

$$\neg(\forall x(P(x)))$$

Método por contra-ejemplo

Encontrar un elemento  $n$  (cualquiera) tal que  $P(n)$  es falso.

## Ejercicio

Demuestre que es falso que todo número entero es suma de dos cuadrados perfectos.

Probamos con los primeros números mayores a 1:

$$2 = 1^2 + 1^2$$

$$3 \neq 1^2 + 1^2$$

$$\neq 2^2 + 1^2$$

Por lo tanto, 3 no es la suma de dos cuadrados perfectos.

# Demostración existencial

Por demostrar:

$$\exists x(P(x))$$

Método por existencia

Debemos demostrar que existe un elemento  $n$  tal que  $P(n)$  es verdadero.  
(Nótese que NO es estrictamente necesario mostrar  $n$  explícitamente.)

Ejercicio

Demuestre que existen  $a, b$  irracionales tal que  $a^b$  es racional.

# Demostración existencial

## Ejercicio

Demuestre que existen  $a, b$  irracionales tal que  $a^b$  es racional.

Como sabemos que  $\sqrt{2}$  es irracional, considere  $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ . Tenemos dos casos:

1. Si  $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$  es **racional**, entonces  $a = \sqrt{2}$  y  $b = \sqrt{2}$  es suficiente.
2. Si  $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$  es **irracional**, entonces considere  $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$  y  $b = \sqrt{2}$ :

$$\begin{aligned}(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} &= \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} \\ &= \sqrt{2}^2 \\ &= 2\end{aligned}$$

Por lo tanto,  $a^b$  es racional.  $\square$

# Outline

Obertura

Métodos de Demostración

**Epílogo**

# Objetivos de la clase

- Conocer métodos de demostración
- Relacionar los métodos con fórmulas en predicados