

Unidad VI: Funciones y Cardinalidad

Cardinalidad y enumerabilidad

Clase 17 - Matemáticas Discretas (IIC1253)


Prof. Miguel Romero

Cardinalidad

$$\{ a , b , c , d \}$$


¿Por qué estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad?
¿Cómo explicaría esto en términos de **funciones**?

Cardinalidad



Existe una **biyección** entre los conjuntos.

Notación común: biyección = función biyectiva.

Conjuntos equinumerosos

Definición:

Dos conjuntos A y B son **equinumerosos**, denotado como $A \approx B$, si **existe** una biyección $f : A \rightarrow B$.

Notación:

- También diremos que A tiene la **misma cardinalidad** que B .

OJO: la definición aplica para conjuntos finitos e infinitos.

Ejercicio: Demuestre que la relación \approx es de equivalencia.


Conjuntos equinumerosos: ejemplos

Ejemplos:

Sea $\mathbb{P} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\}$.

¿Es cierto que $\mathbb{N} \approx \mathbb{P}$? **SI!**

Podemos tomar la biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}$ tal que $f(n) = 2 \cdot n$.



Ejercicio: verifique que f es biyección.

Conjuntos equinumerosos: ejemplos

Ejemplos:

¿Es cierto que $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z}$?

¿Qué biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ podríamos tomar?

0	1	2	3	4	5	6	...	$2k$	$2k+1$...
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	...	↓	↓	...
0	1	-1	2	-2	3	-3	...	-k	k	...

Esto corresponde a la biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$:

$$f(n) = \begin{cases} -\frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par} \\ \frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Ejercicio: verifique que f es biyección.


Conjuntos equinumerosos: ejemplos

Ejemplos:

¿Es cierto que $\mathbb{R} \approx (0,1)$?

Podemos tomar la biyección $f : \mathbb{R} \rightarrow (0,1)$ definida como:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$




Comparando cardinalidades

$$\{ \quad a \quad , \quad b \quad , \quad c \quad \}$$
$$\left\{ \begin{array}{c} \text{[Portrait of John Wood]} \\ \text{[Portrait of Michael J. Fox]} \\ \text{[Portrait of Julia Roberts]} \\ \text{[Portrait of James Van Der Beek]} \end{array} \right\}$$

¿Por qué el primer conjunto tiene menor cardinalidad que el segundo?
¿Cómo explicaría esto en términos de **funciones**?

Comparando cardinalidades



Existe una función **inyectiva** del primer conjunto al segundo.

Comparando cardinalidades

Definición:

Un conjunto A tiene **menor o igual cardinalidad** que un conjunto B , si **existe** una función inyectiva $f : A \rightarrow B$.

- Escribimos $A \leq B$.

Ejemplos:

- $\{a, b, c, d\} \leq \mathbb{N}$.
- $\mathbb{N} \leq \mathbb{Q}$.
- $\mathbb{Q} \leq \mathbb{R}$.

Definición:

Un conjunto A tiene **menor cardinalidad** que un conjunto B , si $A \leq B$ y **no** se cumple que $B \leq A$.

- Escribimos $A < B$.

Comparando cardinalidades: preguntas

1. Demuestre que la relación \leq es refleja y transitiva.
2. ¿Es \leq un orden parcial?
3. Demuestre que $A < \mathbb{N}$ para todo conjunto finito A .

Teorema de Schröder-Bernstein

Si $A \approx B$, entonces $A \leq B$ y $B \leq A$.

- Como $A \approx B$, existen biyecciones $f : A \rightarrow B$ y $f^{-1} : B \rightarrow A$.
- f y f^{-1} en particular son funciones inyectivas.

¿Es la implicancia contraria cierta?

Teorema (Schröder-Bernstein):

$A \approx B$ si y sólo si $A \leq B$ y $B \leq A$.

- Muy útil para demostrar que $A \approx B$.
- Muchas veces no es fácil definir una biyección $f : A \rightarrow B$.

Teorema de Schröder-Bernstein: ejemplo

Ejemplos:

Sea $\mathbb{X} = \{2^n \cdot 3^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$.

Demuestre que $\mathbb{N} \approx \mathbb{X}$.

Podemos usar el Teorema de Schröder-Bernstein:

- Como $\mathbb{X} \subseteq \mathbb{N}$, la función $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(k) = k$ es inyectiva.
- La función $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{X}$ tal que $g(n) = 2^n \cdot 3^0$ es inyectiva.

Concluimos que $\mathbb{X} \leq \mathbb{N}$ y $\mathbb{N} \leq \mathbb{X}$, y luego $\mathbb{N} \approx \mathbb{X}$.

Conjuntos enumerables

Definición:

Un conjunto A es **enumerable** si $A \approx \mathbb{N}$.

Comentarios:

- A es enumerable si tiene la misma cardinalidad que \mathbb{N} .
- En particular, todo conjunto enumerable es **infinito**.

Ejemplos:

$\{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\}$, $\{2^n \cdot 3^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ y \mathbb{Z} son enumerables.

¿Por qué se llaman conjuntos enumerables?

Definición:

Una **enumeración** de un conjunto A es una secuencia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que:

1. $a_n \in A$ para cada $n \in \mathbb{N}$.
($(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de elementos de A .)
2. $a_n \neq a_m$ para cada $n, m \in \mathbb{N}$ tal que $n \neq m$.
(todos los elementos de la secuencia son distintos.)
3. Para cada $a \in A$, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = a$.
(cada elemento de A aparece en la secuencia.)

Ejemplo:

De una enumeración de \mathbb{Z} .

¿Por qué se llaman conjuntos enumerables?

Definición:

Una **enumeración** de un conjunto A es una secuencia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que:

1. $a_n \in A$ para cada $n \in \mathbb{N}$.
($(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de elementos de A .)
2. $a_n \neq a_m$ para cada $n, m \in \mathbb{N}$ tal que $n \neq m$.
(todos los elementos de la secuencia son distintos.)
3. Para cada $a \in A$, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = a$.
(cada elemento de A aparece en la secuencia.)

Si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una enumeración de A ,
entonces la función $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ tal que $f(n) = a_n$ es una biyección.

Si $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ es una biyección,
entonces $(f(n))_{n \in \mathbb{N}}$ es una enumeración de A .

¿Por qué se llaman conjuntos enumerables?

Definición:

Una **enumeración** de un conjunto A es una secuencia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que:

1. $a_n \in A$ para cada $n \in \mathbb{N}$.
($(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de elementos de A .)
2. $a_n \neq a_m$ para cada $n, m \in \mathbb{N}$ tal que $n \neq m$.
(todos los elementos de la secuencia son distintos.)
3. Para cada $a \in A$, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = a$.
(cada elemento de A aparece en la secuencia.)

Proposición:

A es enumerable si y sólo si existe una enumeración de A .

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Podemos dar una enumeración de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

- Ordenamos los pares según la suma de sus valores de menor a mayor.
- Ordenamos los pares con la misma suma según la primera coordenada, de menor a mayor.
- Finalmente, asignamos un natural a cada par según el orden obtenido.

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Podemos dar una enumeración de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$(0,0) \rightarrow 0$

$(0,1) \rightarrow 1$

$(1,0) \rightarrow 2$

$(0,2) \rightarrow 3$

$(1,1) \rightarrow 4$

$(2,0) \rightarrow 5$

$(0,3) \rightarrow 6$

$(1,2) \rightarrow 7$

$(2,1) \rightarrow 8$

$(3,0) \rightarrow 9$

...

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Función biyectiva explícita:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \left(\sum_{k=0}^{i+j-1} k + 1 \right) + i & i + j > 0 \end{cases}$$

Es decir:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} + i & i + j > 0 \end{cases}$$

Por ejemplo: $f(1, 1) = 4$ y $f(3, 0) = 9$.