



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE  
ESCUELA DE INGENIERIA  
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACION

**Matemáticas Discretas - IIC1253**  
**Guía de lógica de predicados**

- ¿Son ciertas las siguientes equivalencias? Justifique su respuesta con una demostración.
  - $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \equiv (\exists x (\varphi(x))) \wedge (\exists x (\psi(x)))$
  - $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)) \equiv (\forall x (\varphi(x))) \rightarrow (\forall x (\psi(x)))$
- Para cada par  $\varphi_1, \varphi_2$  de fórmulas en lógica de predicados, responda si  $\{\varphi_1\} \models \varphi_2$  o no. Justifique su respuesta con una demostración o un contraejemplo.
  - $\varphi_1 = \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$  y  $\varphi_2 = \forall x (P(x) \wedge Q(x))$ .
  - $\varphi_1 = \forall y \exists x (P(x) \rightarrow Q(y))$  y  $\varphi_2 = \exists x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y))$ .
- Usaremos lógica de predicados para expresar propiedades sobre un conjunto de animales. Estos animales pueden ser perros o gatos, y se pueden perseguir entre ellos. Para esto, considere dos predicados unarios  $P$  y  $G$ , y un predicado binario  $R$ , junto con la siguiente interpretación  $\mathcal{I}$ . El dominio  $A$  de la interpretación es un conjunto de animales, y

$$P^{\mathcal{I}} = \{x \in A \mid x \text{ es un perro}\}$$

$$G^{\mathcal{I}} = \{x \in A \mid x \text{ es un gato}\}$$

$$R^{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in A^2 \mid x \text{ persigue a } y\}$$

En cada caso, escriba una oración en lógica de predicados que exprese la propiedad pedida.

- Todo animal debe ser un perro o un gato, pero no ambas.
  - Todo gato debe perseguir a lo más a dos perros.
- Nos gustaría modelar una situación donde tenemos usuarios en una red social. Algunos usuarios pueden ser bots. Los usuarios se pueden seguir entre ellos, y también se pueden bloquear. Para esto consideraremos un predicado unario  $Bot$ , y dos predicados binarios  $S$  y  $B$ . También consideraremos la siguiente interpretación  $\mathcal{I}$  en la lógica de predicados. El dominio  $A$  de  $\mathcal{I}$  es el conjunto de todos los usuarios, y

$$Bot^{\mathcal{I}} = \{x \in A \mid x \text{ es un bot}\}$$

$$S^{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in A^2 \mid x \text{ sigue a } y\}$$

$$B^{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in A^2 \mid x \text{ bloquea a } y\}$$

Para cada caso, escriba una oración en la lógica de predicados que exprese la propiedad pedida.

- Ninguna persona se puede seguir a sí misma.
- Existen dos usuarios con exactamente los mismos seguidores.

- c) Es imposible que un usuario  $x$  siga y bloquee, al mismo tiempo, a otro usuario  $y$ .
  - d) Todo usuario debe seguir a alguien, y debe ser seguido por alguien.
  - e) Existe un único bot que no es bloqueado por nadie.
  - f) Todo usuario que no es un bot tiene al menos 3 seguidores.
5. Los mobs son entidades que simulan criaturas en el juego Discreticraft. Estos poseen diferentes naturalezas e interactúan entre sí de acuerdo con ellas. Para modelar estas interacciones, considere el vocabulario  $\mathcal{L} = \{P, N, H, A, M\}$ , donde  $P, N, H$  son unarios y  $A, M$  son binarios. Además considere la siguiente interpretación  $\mathcal{I}$ . El dominio  $D$  de  $\mathcal{I}$  es el conjunto de mobs de Discreticraft, y

$$P^{\mathcal{I}} = \{x \in D \mid x \text{ es de naturaleza pacífica}\}$$

$$N^{\mathcal{I}} = \{x \in D \mid x \text{ es de naturaleza neutral}\}$$

$$H^{\mathcal{I}} = \{x \in D \mid x \text{ es de naturaleza hostil}\}$$

$$A^{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in D^2 \mid x \text{ ataca a } y\}$$

$$M^{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in D^2 \mid x \text{ le tiene miedo a } y\}$$

Defina las siguientes afirmaciones en lógica de predicados:

- a) Todo mob tiene una y solo una naturaleza.
  - b) Todo mob pacífico le tiene miedo a los mobs que lo atacan.
  - c) Existe un mob hostil tal que todos los mobs a los que él les tiene miedo, le tienen miedo a algún mob pacífico en común.
  - d) Existen exactamente dos mobs hostiles que le tienen miedo a exactamente los mismos mobs.
6. Suponga un contexto simplificado de exportación e importación de minerales entre distintos países. Para modelar este problema considere el vocabulario  $\mathcal{L} = \{O, P, C, V, E\}$ , donde  $O, P, C$  son unarios y  $V, E$  son binarios. Además considere la siguiente interpretación  $\mathcal{I}$ . El dominio  $A$  de  $\mathcal{I}$  es el conjunto de los países, y

$$O^{\mathcal{I}} = \{x \in A \mid x \text{ produce oro}\}$$

$$P^{\mathcal{I}} = \{x \in A \mid x \text{ produce plata}\}$$

$$C^{\mathcal{I}} = \{x \in A \mid x \text{ produce cobre}\}$$

$$V^{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in A^2 \mid x \text{ es vecino de } y \text{ (esto es, comparten frontera terrestre)}\}$$

$$E^{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in A^2 \mid x \text{ exporta todos los tipos de minerales que él produce a } y\}$$

Defina las siguientes afirmaciones en lógica de predicados:

- a) Todo país exporta uno o más minerales a algún vecino si, y solo si, produce al menos un mineral.
- b) Existe al menos un país que exporta cobre a todos los países (excluyendo a él mismo) y que además importa oro y plata de algún vecino.
- c) Existe más de un país que produce más de un mineral.

Para la siguiente afirmación considere  $k > 1$ :

- d) Existe un conjunto de  $k$  países que forma un monopolio, esto es, existen  $k$  países distintos que cumplen las siguientes propiedades simultáneamente:
  - Cada uno de los  $k$  países produce al menos un mineral.
  - El resto de los países (distinto a los  $k$  países) no produce ningún mineral.

- Cada país importa mineral solo de estos  $k$  países y solo en caso que sea su vecino.
- Para todo par de vecinos de un mismo país, ellos no producen el mismo mineral (en otras palabras, no hay competencia).

Notar que en esta pregunta, para cada  $k$  debe entregar una fórmula distinta que dependerá de  $k$ .

(*Recomendación:* Escriba esta fórmula para  $k = 2$  y  $k = 3$  y generalice después para un  $k$  cualquiera.)

4. Para esta pregunta considere el vocabulario  $\mathcal{L} = \{F, P, A, N, E, H\}$ , donde  $F, P, A, N$  son símbolos unarios,  $E$  es binario, y  $H$  es ternario. Además, considere la siguiente interpretación  $\mathcal{I}$ . El dominio de  $D$  de  $\mathcal{I}$  es el conjunto de los pokemon, y

$$\begin{aligned} F^{\mathcal{I}} &= \{x \in D \mid x \text{ es de naturaleza fuego}\} \\ A^{\mathcal{I}} &= \{x \in D \mid x \text{ es de naturaleza agua}\} \\ P^{\mathcal{I}} &= \{x \in D \mid x \text{ es de naturaleza planta}\} \\ N^{\mathcal{I}} &= \{x \in D \mid x \text{ es de naturaleza normal}\} \\ E^{\mathcal{I}} &= \{(x, y) \in D \mid \text{los ataques de } x \text{ son efectivos contra } y\} \\ H^{\mathcal{I}} &= \{(x, y, z) \in D \mid z \text{ fue procreado entre } x \text{ e } y\} \end{aligned}$$

Defina las siguientes afirmaciones en lógica de predicados:

- Todos los pokemon son de alguna naturaleza.
  - Algunos pokemon poseen 2 naturalezas.
  - Los ataques de naturaleza agua son efectivos contra pokemon de naturaleza fuego, los de naturaleza fuego son efectivos contra pokemon de naturaleza planta y los ataques de naturaleza planta son efectivos contra pokemon de naturaleza agua.
  - Si dos pokemon son de la misma naturaleza, entonces sus hijos son de aquella naturaleza.
  - Los pokemon que son hermanos comparten las mismas naturalezas.
5. Sea  $\mathcal{L} = \{<\}$  con  $<$  símbolo de predicado binario. Para cada una de las siguientes oraciones  $\varphi$  en lógica de predicados, demuestre que  $\varphi$  es satisfacible por una interpretación con dominio finito (no vacío), es decir, que existe una interpretación  $\mathcal{I}$ , con dominio finito, tal que  $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{I}} = 1$ .

- $\varphi_1 = (\forall x \neg(x < x)) \wedge (\forall x \exists y x < y)$
- $\varphi_2 = (\forall x \neg(x < x)) \wedge (\forall x \exists y x < y) \wedge (\forall x \forall y (x < y \rightarrow \neg(y < x)))$
- $\varphi_3 = (\forall x \neg(x < x)) \wedge (\forall x \exists y x < y) \wedge (\forall x \forall y (x < y \rightarrow \neg(y < x))) \wedge (\exists x \forall y (\neg(x = y) \rightarrow x < y))$

No es necesario demostrar formalmente que  $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{I}} = 1$  pero sí explicar en palabras por qué  $\varphi$  es verdadera sobre  $\mathcal{I}$ .

6. Considere el vocabulario  $\mathcal{L} = \{R\}$ , donde  $R$  es un símbolo de predicado binario, y las siguientes oraciones en lógica de predicados:

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \forall x \forall y \forall z (R(x, y) \rightarrow (R(y, z) \wedge R(x, z))) \\ \varphi_2 &= \forall x \forall y \forall z ((R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z)) \\ \varphi_3 &= \forall x \forall y \forall z ((R(x, y) \rightarrow R(y, z)) \wedge (R(x, y) \rightarrow R(x, z))) \end{aligned}$$

Para cada  $i, j \in \{1, 2, 3\}$  con  $i \neq j$  diga si  $\varphi_i \equiv \varphi_j$ , o si  $\{\varphi_i\} \models \varphi_j$  y  $\{\varphi_j\} \not\models \varphi_i$ , o si  $\{\varphi_j\} \models \varphi_i$  y  $\{\varphi_i\} \not\models \varphi_j$ . Para cada caso, justifique su respuesta con una demostración o contraejemplo.

7. Considere el vocabulario  $\mathcal{L} = \emptyset$ .

- a) Construya un conjunto infinito de oraciones  $\{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots\}$  tal que  $\{\varphi_0\} \models \varphi_1$ ,  $\{\varphi_1\} \models \varphi_2$ ,  $\{\varphi_2\} \models \varphi_3$ , ... y para todo  $i, j$  con  $i \neq j$  se tiene que  $\varphi_i \not\models \varphi_j$ . Demuestre su respuesta.
- b) Construya un conjunto infinito de oraciones  $\{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots\}$  tal que para todo  $i, j$  con  $i \neq j$  se tiene que  $\{\varphi_i\} \not\models \varphi_j$  y  $\{\varphi_j\} \not\models \varphi_i$ . Demuestre su respuesta.
- c) Haga lo mismo que en las partes (a) y (b), pero ahora sus oraciones sólo pueden usar un símbolo de predicado binario  $E$  (el símbolo  $=$  no está permitido).

(Observación: en las preguntas (a) y (b), como el vocabulario es vacío, el único símbolo de predicado disponible es  $=$ )

8. Sea el vocabulario  $\mathcal{L} = \{F\}$ , donde  $F$  es un predicado ternario. Demuestre o de un contraejemplo de la siguiente equivalencia lógica:

$$\exists x \forall y \forall z F(x, y, z) \equiv \forall x \exists y \forall z \neg F(x, y, z).$$

9. Sea el vocabulario  $\mathcal{L} = \{R, S\}$  con dos predicados unarios  $R, S$  y considere las siguientes oraciones en lógica de predicados:

$$\alpha = (\forall x R(x)) \leftrightarrow (\forall x S(x)) \quad \beta = \forall x (R(x) \leftrightarrow S(x))$$

- a) ¿Es verdadero o falso que  $\{\alpha\} \models \beta$ ? Demuestre su afirmación.
  - b) ¿Es verdadero o falso que  $\{\beta\} \models \alpha$ ? Demuestre su afirmación.
10. ¿Es la siguiente afirmación cierta?

$$\{\forall x \forall y R(x, y) \rightarrow R(y, x), \forall x \forall y \forall z (R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z), \\ \forall x \forall y \forall z (R(x, y) \wedge R(x, z)) \rightarrow y = z\} \models \forall x \forall y R(x, y) \rightarrow x = y$$

Demuestre o de un contraejemplo.

11. Sea  $\mathcal{L} = \{<\}$ , y sea  $\Sigma$  un conjunto formado por las siguientes  $\mathcal{L}$ -oraciones:

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \forall x \neg(x < x) \\ \varphi_2 &= \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \\ \varphi_3 &= \forall x \forall y (x < y \vee y < x \vee x = y). \end{aligned}$$

Conteste las siguientes preguntas.

- (a) Construya una interpretación  $\mathcal{I}_1$  tal que  $\llbracket \Sigma \rrbracket_{\mathcal{I}_1} = 1$ .
- (b) Construya una interpretación  $\mathcal{I}_2$  tal que  $\llbracket \Sigma \cup \{\varphi_4, \varphi_5, \varphi_6\} \rrbracket_{\mathcal{I}_2} = 1$ , donde:

$$\begin{aligned} \varphi_4 &= \forall x \exists y (x < y) \\ \varphi_5 &= \forall x \exists y (y < x) \\ \varphi_6 &= \forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y)). \end{aligned}$$

- (c) Construya una interpretación  $\mathcal{I}_3$  tal que  $\llbracket \Sigma \cup \{\varphi_6, \varphi_7, \varphi_8\} \rrbracket_{\mathcal{I}_3} = 1$ , donde  $\varphi_6$  es la oración definida en (b) y:

$$\begin{aligned} \varphi_7 &= \exists x \forall y (y < x \vee y = x) \\ \varphi_8 &= \exists x \forall y (x < y \vee y = x) \end{aligned}$$

- (d) Construya una interpretación  $\mathcal{I}_4$  tal que  $\llbracket \Sigma \cup \{\varphi_7, \varphi_8, \varphi_9\} \rrbracket_{\mathcal{I}_4} = 1$ , donde  $\varphi_7$  y  $\varphi_8$  son las oraciones definidas en (c) y:

$$\varphi_9 = \forall x (\exists y (x < y) \rightarrow \exists z (x < z \wedge \neg \exists w (x < w \wedge w < z))).$$

12. Demuestre que ninguna de las siguientes oraciones es implicada por las otras dos:

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y \forall z (R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z) \\ & \forall x \forall y (R(x, y) \wedge R(y, x)) \rightarrow x = y \\ & (\forall x \exists y R(x, y)) \rightarrow (\exists y \forall x R(x, y)) \end{aligned}$$

13. Demuestre que la siguiente oración es una tautología:

$$\forall x_1 \forall x_2 \forall y_1 \forall y_2 (x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2 \wedge P(x_1, x_2)) \rightarrow P(y_1, y_2)$$

14. Sea  $\mathcal{L} = \{R\}$ , donde  $R$  es un símbolo de relación binaria. Construya una oración  $\Phi$  tal que  $\Phi$  es satisfacible y para toda interpretación  $\mathcal{I}$  de  $\mathcal{L}$ :

$$\text{si } \llbracket \Phi \rrbracket_{\mathcal{I}} = 1, \text{ entonces el dominio de } \mathcal{I} \text{ es infinito.}$$

15. Dado un grafo  $G = (V, E)$ , una secuencia de nodos  $a_1, \dots, a_n$  es un *camino en  $G$*  si para todo  $i \in \{1, \dots, n-1\}$  se tiene que  $(a_i, a_{i+1}) \in E$ . Además, decimos que un camino  $a_1, \dots, a_n$  va desde  $b$  a  $c$  si  $a_1 = b$  y  $a_n = c$ , y decimos que el largo del camino  $a_1, \dots, a_n$  es  $n-1$  (vale decir, el largo es el número de arcos del camino). Finalmente, decimos que la distancia en  $G$  entre dos nodos  $b$  y  $c$  es  $k$  si existe un camino de  $b$  a  $c$  en  $G$  de largo  $k$ , y no existe un camino más corto en  $G$  desde  $b$  a  $c$ .

Suponga que utiliza el vocabulario  $\mathcal{L} = \{E\}$  para representar grafos, donde  $E$  es una relación binaria. Dado un número natural  $k$ , defina una fórmula  $\varphi_k(x, y)$  tal que para toda interpretación  $\mathcal{I}$  con dominio  $A$ :

$$\llbracket \varphi_k \rrbracket_{\mathcal{I}} = \{(a, b) \in A^2 \mid \text{la distancia entre } a \text{ y } b \text{ en el grafo representado por } \mathcal{I} \text{ es } k\}$$

16. Considere el vocabulario  $\mathcal{L} = \{S, M\}$  donde  $S$  y  $M$  son símbolos ternarios. Considere la interpretación  $\mathcal{I}$  tal que el dominio de  $\mathcal{I}$  son los números reales  $\mathbb{R}$ , y

$$\begin{aligned} S^{\mathcal{I}} &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\} \\ M^{\mathcal{I}} &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \cdot y = z\} \end{aligned}$$

- Construya fórmulas  $\alpha(x)$  y  $\beta(x)$  tal que  $\llbracket \alpha \rrbracket_{\mathcal{I}} = \{0\}$  y  $\llbracket \beta \rrbracket_{\mathcal{I}} = \{1\}$ .
- Construya una fórmula  $\gamma(x)$  tal que  $\llbracket \gamma \rrbracket_{\mathcal{I}} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ .
- Sea  $n$  un número natural arbitrario. Construya una fórmula  $\varphi_n(x)$  tal que  $\llbracket \varphi_n \rrbracket_{\mathcal{I}} = \{n\}$ .
- Sea  $m$  un número entero arbitrario. Construya una fórmula  $\varphi_m(x)$  tal que  $\llbracket \varphi_m \rrbracket_{\mathcal{I}} = \{m\}$ .
- Sea  $r = p/q$  un número racional arbitrario. Construya una fórmula  $\varphi_r(x)$  tal que  $\llbracket \varphi_r \rrbracket_{\mathcal{I}} = \{r\}$ .

17. Considere el vocabulario  $\mathcal{L} = \{S, M\}$  donde  $S$  y  $M$  son símbolos ternarios. Considere la interpretación  $\mathcal{I}$  tal que el dominio de  $\mathcal{I}$  son los números naturales  $\mathbb{N}$ , y

$$\begin{aligned} S^{\mathcal{I}} &= \{(x, y, z) \in \mathbb{N}^3 \mid x + y = z\} \\ M^{\mathcal{I}} &= \{(x, y, z) \in \mathbb{N}^3 \mid x \cdot y = z\} \end{aligned}$$

- Construya una fórmula  $\varphi(x, y)$  tal que  $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid x < y\}$ .
- Construya una fórmula  $\alpha(x)$  tal que  $\llbracket \alpha \rrbracket_{\mathcal{I}} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es primo}\}$ .

- c) Construya una fórmula  $\beta(x)$  tal que  $\llbracket \beta \rrbracket_{\mathcal{I}} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es un cuadrado perfecto}\}$ .
- d) Construya una fórmula  $\gamma(x, y)$  tal que  $\llbracket \gamma \rrbracket_{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid x \text{ es divisor de } y\}$ .
- e) Construya una fórmula  $\psi(x, y, z)$  tal que  $\llbracket \psi \rrbracket_{\mathcal{I}} = \{(x, y, z) \in \mathbb{N}^3 \mid z \text{ es el máximo común divisor de } x \text{ e } y\}$ .
- f) Construya una fórmula  $\phi(x, y, z)$  tal que  $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{I}} = \{(x, y, z) \in \mathbb{N}^3 \mid z \text{ es el resto de la división entera de } x \text{ dividido por } y\}$ .