



Guía 6 – cardinalidad

Definición 1. Sean A, B dos conjuntos. Si existe $f: A \rightarrow B$ biyectiva, se dice que A y B son **equinumerosos**. Se denota $A \approx B$.

Teorema 1. $\approx$ es una relación de equivalencia.

1. Conjuntos Finitos y Principio de Palomar

Definición 2. Un conjunto A se llama finito si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $A \approx \{0, 1, \dots, n-1\}$. En ese caso, n se llama el tamaño de A , $|A| = n$.

Teorema 2. Sean A, B dos conjuntos finitos equinumerosos y $f: A \rightarrow B$. Si f es inyectiva o sobreyectiva, entonces es biyectiva.

Teorema 3 (Principio de Palomar). Sean A, B dos conjuntos finitos tales que $|A| > |B|$. Entonces, no existe $f: A \rightarrow B$ inyectiva.

Los siguientes problemas los vimos en clases.

1.1. Problemas de las clases

Problema 1 Demuestre que existe la misma cantidad de maneras dividir n piedras en montones de modos que

- a) hay 3 montones de tamaño igual;
- b) hay por lo menos un montón cuyo tamaño es un múltiplo de 3.

El orden en los montones no es importante, solo importan los tamaños de los montones y en qué cantidad están presentes.

Problema 2 Demuestra que en cualquier grupo finito de personas siempre habrá dos personas que hayan dado el mismo número de apretones de mano dentro del grupo.

Problema 3 En un curso hay 33 alumnos. A cada alumno se le preguntó cuántos compañeros del curso tienen su mismo primer nombre y cuántos tienen su mismo primer apellido. Resultó que entre los números mencionados aparecieron todos los enteros del 0 al 10, inclusive. Demuestre que en la clase hay dos alumnos con el mismo primer nombre y el mismo primer apellido.

1.2. Problemas adicionales

Problema 4 Sea $n > 1$ un número natural par pero no divisible por 4. Demuestre que n tiene el mismo número de divisores pares que impares.

Problema 5 Demuestre que la ecuación

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 20$$



tiene el mismo número de soluciones en números naturales que el número de las secuencias binarias de largo 29 con 20 unos.

Problema 6 Demuestre que no se puede colocar 33 caballos al tablero de ajedrez de manera que no se ataquen entre sí.

Problema 7 a) Sea α un número real y $N \geq 1$ un número natural. Demuestre que existen $n \in \{1, 2, \dots, N\}$ y $m \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$\left| \alpha - \frac{m}{n} \right| \leq \frac{1}{nN}.$$

b) deduce que para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ existe infinito número de pares $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, n \geq 1$ tales que

$$\left| \alpha - \frac{m}{n} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

Problema 8 ¿Cuál es el mayor número de casillas que se pueden colorear en un tablero de 6×6 de modo que no haya dos casillas coloreadas que se toquen entre sí (ni siquiera en un solo punto)?

Problema 9 Se dan 12 números distintos de dos cifras. Demuestre que entre ellos se pueden elegir dos números cuya diferencia sea un número de dos cifras formado por dos dígitos iguales.

2. Teorema Cantor–Bernstein

Definición 3. Sean A, B dos conjuntos. Entonces, $A \preceq B$ si existe $f: A \rightarrow B$ inyectiva.

Teorema 4. Sean A, B dos conjuntos. Si $A \preceq B, B \preceq A$, entonces $A \approx B$.

Problema 10 En ese problema, vamos a deducir el teorema de Cantor–Bernstein a partir del siguiente teorema:

Teorema 5 (Knaster–Tarski). Sea A un conjunto y $\phi: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ tal que $S_1 \subseteq S_2 \implies \phi(S_1) \subseteq \phi(S_2)$ para todo $S_1, S_2 \in \mathcal{P}(A)$. Entonces, existe $S \in \mathcal{P}(A)$ tal que

$$\phi(S) = S.$$

En efecto, sean A, B dos conjuntos tales que existen funciones $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$ inyectivas.

a) Define $\phi: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$:

$$\phi(X) = A \setminus g(B \setminus f(X)), \quad X \subseteq A.$$

Demuestre que $X_1 \subseteq X_2 \implies \phi(X_1) \subseteq \phi(X_2)$ para todo $X_1, X_2 \in \mathcal{P}(A)$.



b) Por el teorema de Knaster-Tarski, existe $X \subseteq A$ tal que $X = \phi(X) = A \setminus g(B \setminus f(X))$. Es decir, conjuntos X y $\hat{X} = g(B \setminus f(X))$ son disjuntos y su unión es igual a A . Define $h: A \rightarrow B$ por

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & x \in X \\ g^{-1}(x) & x \in g(B \setminus f(X)). \end{cases}$$

Demuestre que h es biyectiva.

Problema 11 Demuestre el teorema de Knaster-Tarski.



3. Algunas soluciones y hints

Problema 4 Sea $n > 1$ un número natural par pero no divisible por 4. Demuestre que n tiene el mismo número de divisores pares que impares.

Hint. El mapeo:

$$x \mapsto n/x$$

establece una función biyectiva entre dos conjuntos. □

Problema 5 Demuestre que la ecuación

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 20$$

tiene el mismo número de soluciones en números naturales que el número de las secuencias binarias de largo 29 con 20 unos.

Solución. Considere la función del conjunto de las soluciones naturales a la ecuación en conjunto de las secuencias binarias de largo 29, dada por:

$$(x_1, \dots, x_{10}) \mapsto \underbrace{11\dots 10}_{x_1} \underbrace{11\dots 10}_{x_2} \dots 0 \underbrace{11\dots 1}_{x_{10}}.$$

Toda imagen de esta función tiene $x_1 + \dots + x_{10} = 20$ unos y 9 ceros. Más encima, toda secuencia de 20 unos y 9 ceros tiene exactamente una preimagen. En efecto, toda secuencia w así tiene 9 ceros que dividen de manera única la secuencia en 10 bloques de 1s (algunos pueden ser vacíos). Los largos de estos bloques definen la única preimagen de w . □

Problema 6 Demuestre que no se puede colocar 33 caballos al tablero de ajedrez de manera que no se ataquen entre sí.

Hint. Parte las 64 casillas en pares donde se puede poner solo un caballo, y use el principio de palomar. □

Problema 7

a) Sea α un número real y $N \geq 1$ un número natural. Demuestre que existen $n \in \{1, 2, \dots, N\}$ y $m \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$\left| \alpha - \frac{m}{n} \right| \leq \frac{1}{nN}.$$

b) deduce que para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ existe infinito número de pares $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, n \geq 1$ tales que

$$\left| \alpha - \frac{m}{n} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$



Hint de a). Use el principio de palomar para mostrar que existen dos distintos $i, j \in \{0, 1, \dots, N\}$ tales que

$$|\{i\alpha\} - \{j\alpha\}| \leq 1/N.$$

Aquí $\{x\}$ se refiere a la parte fraccionaria del número x .

□

Problema 11 Demuestre el teorema de Knaster-Tarski.

Hint. Considere la unión de todo $S \subseteq A$ tal que $S \subseteq \phi(S)$.

□