

Санкт-Петербургский политехнический университет  
Высшая школа прикладной математики и вычислительной  
физики, ФизМех

Направление подготовки  
«01.03.02 Прикладная математика и информатика»

Отчет по лабораторной работе № 4  
тема **"Алгебраическая проблема собственных значений"**  
Дисциплина "Численные методы"

Выполнил студент гр. 5030102/00001  
Преподаватель:

Золин И.М.  
Добрецова С.Б.

Санкт-Петербург

**2021**

# 1 Формулировка задачи и её формализация

## 1.1 Формулировка задания

1. Найти два максимальных по модулю, но разных по знаку собственных числа, используя метод скалярных произведений.
2. С помощью метода обратных итераций со сдвигом уточнить собственные числа и найти собственные векторы матрицы.
3. Исследовать зависимости нормы фактической точности для собственных чисел и собственных векторов, нормы невязки  $\|Ax - \lambda x\|$  и числа итераций от заданной точности.

## 1.2 Постановка задания

Дана матрица  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . Если выполнено условие  $A \cdot X = \lambda \cdot X$ , где  $X$  - ненулевой вектор,  $\lambda$  - это число, то  $X$  - это собственный вектор (СВ) матрицы  $A$ .  $\lambda$  - это собственное число (СЧ) матрицы  $A$ , соответствующее СВ  $X$ .

$$A \cdot X = \lambda \cdot X \Leftrightarrow \det(A - \lambda E) = 0 \Leftrightarrow p_0 \lambda^n + p_1 \lambda^{(n-1)} + \dots + p_n$$

Из основной теоремы алгебры следует, что матрица  $A$  имеет ровно  $n$  СЧ.

Требуется решить частичную алгебраическую проблему собственных значений: найти два максимальных по модулю, но разных по знаку собственных числа, используя метод скалярных произведений.

## 2 Алгоритм метода и условия его применимости

### 2.1 Метод скалярных произведений

#### 2.1.1 Алгоритм

1. Входные данные: матрица  $A$ , заданная точность  $\epsilon$
2. Цикл:  
 $k = 1$   
Повторяй:  
 $y^{(k)} = Ax^{(k-1)}$   
 $z^{(k)} = Ay^{(k)}$   
 $\lambda^{(k)} = \sqrt{\frac{(z^{(k)}, x^{(k-1)})}{(x^{(k-1)}, x^{(k-1)})}}$   
 $x^{(k)} = \frac{y^{(k)}}{\|y^{(k)}\|_2}$   
 $w_1^{(k)} = z^{(k)} + \lambda \cdot y^{(k)}$   
 $w_2^{(k)} = z^{(k)} - \lambda \cdot y^{(k)}$   
 $k++$   
  
Пока:  $\|\lambda^{(k)} - \lambda^{(k-1)}\| > \epsilon$   
Конец
3. Результат:  $\lambda = \lambda^{(k)}, w_1 = w_1^{(k)}, w_2 = w_2^{(k)}$

#### 2.1.2 Условия применимости метода

Пусть  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , а  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  - собственные числа, исследуемой матрицы  $A$ , причём  $\lambda_1 = -\lambda_2$  и  $|\lambda_1| = |\lambda_2| > |\lambda_3| \geq |\lambda_4| \geq \dots \geq |\lambda_n|$ , матрица  $A$  - матрица простой структуры и симметричная. Тогда метод скалярных произведений сходится.

## 3 Предварительный анализ задачи

Согласно теореме: если матрица вещественная и симметричная, то она является матрицей простой структуры. Будем задавать матрицы, удовлетворяющие данному критерию.

Такие матрицы будем искать с помощью QR-разложения из пакета Matlab, где матрица  $Q$  - ортогональная,  $R$  - верхнетреугольная. (Генерируются матрица, полученную матрицу представ-

ляем в виде QR-разложения, т.е. умножения 2 матриц Q и R). С помощью QR-разложения находим матрицу Q.

Задается диагональная матрица D, у нее на диагонали – собственные числа.

Нужная симметричная матрица получается следующим образом:  $A = Q \cdot D \cdot Q^T$

#### 4 Тестовый пример с детальными расчётами для задачи малой размерности

$$A = \begin{pmatrix} -0.5222 & 0.8527 & -0.0134 \\ 0.8428 & 0.5135 & -0.1613 \\ 0.1306 & 0.0955 & 0.9868 \end{pmatrix}$$

Точные собственные числа:  $\lambda_{1,2} = \pm 7, \lambda_3 = 1$

Точные собственные векторы:

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0.8527 \\ 0.5135 \\ 0.0955 \end{pmatrix}, X_2 = \begin{pmatrix} -0.5222 \\ 0.8428 \\ 0.1306 \end{pmatrix},$$

$$X_3 = \begin{pmatrix} -0.0134 \\ -0.1613 \\ 0.9868 \end{pmatrix},$$

Начальное приближение:  $x^{(0)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$

1-ая итерация:

$$y^{(1)} = A \cdot x^{(0)} \begin{pmatrix} 5.9842 \\ 1.4214 \\ 0.7890 \end{pmatrix}$$

$$z^{(1)} = A \cdot y^{(0)} \begin{pmatrix} 28.5948 \\ 31.9222 \\ 6.0812 \end{pmatrix}$$

$$\|y^{(1)}\| = 6.2011$$

$$\lambda^{(1)} = \sqrt{\frac{(z^{(1)}, x^{(0)})}{(x^{(0)}, x^{(0)})}} = 6.2006$$

$$x^{(1)} = \frac{y^{(1)}}{\|y^{(1)}\|} = \begin{pmatrix} 0.9650 \\ 0.2292 \\ 0.1272 \end{pmatrix}$$

$$w_1^{(1)} = z^{(1)} + \lambda y^{(1)} = \begin{pmatrix} 0.8415 \\ 0.5217 \\ 0.1405 \end{pmatrix}$$

$$w_2^{(1)} = z^{(1)} - \lambda y^{(1)} = \begin{pmatrix} -0.3452 \\ 0.9373 \\ 0.0482 \end{pmatrix}$$

2-ая итерация:

$$y^{(2)} = A \cdot x^{(1)} = \begin{pmatrix} 4.6112 \\ 5.1478 \\ 0.9807 \end{pmatrix}$$

$$z^{(2)} = A \cdot y^{(1)} = \begin{pmatrix} 47.3347 \\ 11.8167 \\ 2.6522 \end{pmatrix}$$

$$\|y^{(2)}\| = 6.9803$$

$$\lambda^{(1)} = \sqrt{\frac{(z^{(2)}, x^{(1)})}{(x^{(1)}, x^{(1)})}} = 6.9803$$

$$x^{(2)} = \frac{y^{(2)}}{\|y^{(2)}\|} = \begin{pmatrix} 0.6606 \\ 0.7375 \\ 0.1405 \end{pmatrix}$$

$$w_1^{(2)} = z^{(2)} + \lambda y^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.8529 \\ 0.5121 \\ 0.1019 \end{pmatrix}$$

$$w_2^{(2)} = z^{(2)} - \lambda y^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.5262 \\ -0.8378 \\ -0.1457 \end{pmatrix}$$

3-ья итерация:

$$y^{(3)} = A \cdot x^{(2)} = \begin{pmatrix} 6.7811 \\ 1.6929 \\ 0.3800 \end{pmatrix}$$

$$z^{(3)} = A \cdot y^{(2)} = \begin{pmatrix} 32.3763 \\ 36.2199 \\ 6.3708 \end{pmatrix}$$

$$\|y^{(3)}\| = 6.9996$$

$$\lambda^{(3)} = \sqrt{\frac{(z^{(3)}, x^{(2)})}{(x^{(2)}, x^{(2)})}} = 6.9996$$

$$x^{(3)} = \frac{y^{(3)}}{\|y^{(3)}\|} = \begin{pmatrix} 0.9688 \\ 0.2419 \\ 0.0543 \end{pmatrix}$$

$$w_1^{(3)} = z^{(3)} + \lambda y^{(3)} = \begin{pmatrix} 0.8527 \\ 0.5134 \\ 0.0964 \end{pmatrix}$$

$$w_2^{(3)} = z^{(3)} - \lambda y^{(3)} = \begin{pmatrix} -0.5221 \\ 0.8432 \\ 0.1284 \end{pmatrix}$$

## 5 Подготовка контрольных тестов

Создаётся симметричная матрица  $A_{10 \times 10}$  для нахождения собственных чисел с помощью метода скалярных произведений с точностью  $\epsilon = 10^{-i}$ , где  $i \in [0, 15]$ ,  $i \in \mathbb{N}$ . Собственные числа: [-50, 50, 1, 8, 2, 7, 6, 5, 3, 4]

## 6 Модульная структура программы

ScalarProductMethod(вх:  $A, \epsilon$ , вых:  $\lambda_{1,2}, w_{1,2}, n$ ) Находит максимальные собственные числа разные по знаку матрицы  $A$   $\lambda_{1,2}$  и соответствующие им собственные вектора  $w_{1,2}$  с помощью метода скалярных произведений за  $n$  итераций с заданной точностью  $\epsilon$ .

## 7 Анализ результатов

1. По графику зависимости количества итераций метода скалярных произведений от заданной точности видно, что количество итераций увеличивается линейно [3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9]

10 11 13 ]. При изменении  $\epsilon$  на порядок количество итераций изменяется примерно на 1.

2. Графики зависимости с.в. и невязок от заданной точности параллельны. Также все графики достигают минимум точности  $\epsilon = 10^{-11}$ .

## 8 Выводы

С помощью метода скалярных произведений достигается заданная точность нахождения собственных чисел, при хорошей отделимости. Также с хорошей отделимостью требуется меньшее количество итераций для нахождения собственных чисел и собственных векторов.