

SF1624 Linjär algebra och geometri, bra formler

Contents

Chapter 1

Sats 1.0.1 Matrisen som projekterar på \vec{v}

För att slippa hålla på med beräkningar med bråkital för att hitta matrisen som beskriver projektionen på vektorn \vec{v} , så kan man använda formeln nedan:

$$A = \frac{1}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} \vec{v}^T$$

Därmed projektionen av vektorn \vec{x} på vektorn \vec{v} beskrivs av matrismultiplikationen $\text{proj}_{\vec{v}} \vec{x} = A\vec{x}$

Sats 1.0.2 Matrisen som projekterar på vektorrummet V

Om vektorrummet definieras som $V := \text{col}(A)$, då beskrivs matrisen som projekterar på vektorrummet V på följande sättet:

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T$$

Alltså för att projektera givna vektorn \vec{x} på vektorrummet V , så använder man följande matrismultiplikation $P\vec{x}$. **Notera** att det är exakt samma metod som används för minstakvadratmetoden. Projektionen av en vektor på en vektorrummet ger den bästa approximationen av givna vektorn på vektorrummet.

Sats 1.0.3 Ortogonal komplementet till delrummet $V \in \mathbb{R}^n$

Om man vill hitta ortogonal komplementet (också delrum) till delrummet V med villkorn att V inte spänner hela \mathbb{R}^n , så använder man formeln nedan. **Observera** att $V := \text{col}(A)$

$$V^\perp = \ker(A^T) = \text{null}(A^T)$$

Varför: En ortogonal komplement V^\perp till delrummet V innebär att $\forall \vec{v} \in V^\perp, \forall \vec{u} \in V \implies \vec{v} \cdot \vec{u} = 0$. Om A beskrivs som $\begin{bmatrix} w_1 & \dots & w_k \end{bmatrix}$ så kommer A^T beskrivas på sättet nedan.

$$A^T = \begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_k \end{bmatrix}$$

Om man multiplicerar A^T med en vektor \vec{x} och försöker bestämma noll-rummet så bestämmer vi per definition ortogonala komponentet. D.v.s rummet där varje vektor $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ ger 0 med skalärprodukten av varje vektor som spänner V (w_1, \dots, w_k), som det kan ses nedan.

$$\text{null}(A^T) = \ker(A^T) := \begin{bmatrix} w_1 \cdot \vec{x} \\ \vdots \\ w_k \cdot \vec{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Sats 1.0.4 En vektor \vec{x} kan skrivas som projektionen på en vektorrum + projektionens ortogonala komplement
För att kunna bevisa 1.0.2 så brukar man använda denna sats som beskrivs nedan.

$$\vec{x} = \text{proj}_W \vec{x} + \text{proj}_{W^\perp} \vec{x}$$
$$\text{proj}_{W^\perp} \vec{x} = \vec{x} - \text{proj}_W \vec{x}$$

Sats 1.0.5 Hitta resterande basvektorer i \mathbb{R}^n utifrån en mängd linjärt oberoende vektorer S

För det, måste storleken av S vara mindre än n , annars är S redan en bas för \mathbb{R}^n . Om $S = \{w_1, \dots, w_k\}$, så sätter vi upp dessa vektorer som kolumnelement och sedan löser noll-rummet, som det kan ses nedan.

$$A = \begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_k \end{bmatrix}; B := \text{null}(A) = \ker(A)$$

Varför: Som i 1.0.3 så försöker vi hitta en mängd vektorer (B) som är ortogonala och därmed linjärt oberoende mot varje vektor i S . Detta är ekvivalent med att varje vektor i mängden vektorer vi försöker lösa, B , har skalärprodukten 0 med varje vektor i S . Enligt kraven för linjärt oberoendet av basvektorerna så blir mängden $S \cup B$ en bas för \mathbb{R}^n .

Sats 1.0.6 Sambandet mellan matrisen A och $A^T A$, samt AA^T

Theorem 7.5.8 & 7.5.9 i boken Contemporary Linear Algebra (s. 365)

- A och AA^T har samma kolumnrum
- A och $A^T A$ har samma radrum
- Om A har full kolumnrank $\implies \det(A^T A) \neq 0$
- Om A har full radrank $\implies \det(AA^T) \neq 0$

Vad kan man använda detta till? Om man vill kolla för en större matris om raderna eller kolumnerna är linjärt oberoende, så kan man bestämma determinanten av $A^T A$ respektive AA^T . Om determinanten $\neq 0$ då medför det att kolumnerna respektive raderna i matrisen A är linjärt oberoende. **OBS:** AA^T och $A^T A$ är kvadratiska matriser.

Sats 1.0.7 Ortogonal diagonalisering

Symmetriska matriser ($A^{-1} = A^T$) är ortogonalt diagonaliserbara och kan därmed uttryckas som $A = PDP^T$. Dessutom när det kommer till egenvärde och diagonalisering har symmetriska matriser följande egenskaper (A är en $n \times n$ symmetrisk matris):

- A har n olika reella egenvärden, räknade med multiplicitet.
- Dimensionen av varje egenrum överensstämmer med tillhörande egenvärdes multiplicitet som rot till karaktäristiska ekvationen.
- Egenvektorerna från de olika egenvärden är ortogonala mot varandra \implies spänner upp hela \mathbb{R}^n .

Sats 1.0.8 Symmetriska matriser för kvadratiska former

Om A är en symmetrisk matris för den kvadratiska formen $x^T Ax$ så gäller följande satser:

- $x^T Ax$ är positivt definit ($x^T Ax > 0, \forall x \neq \vec{0}$) om och endast om **alla** egenvärden av A är positiva
- $x^T Ax$ är negativt definit ($x^T Ax < 0, \forall x \neq \vec{0}$) om och endast om **alla** egenvärden av A är negativa
- $x^T Ax$ är indefinit ($x^T Ax > 0 \wedge x^T Ax < 0, \forall x$) om och endast om A har minst en positiv och en negativ egenvärde