

HIIT versus entrenamiento continuo en hipertensión arterial: qué dice la fisiología clínica

Síntesis clínica · 2026-09-14

Resumen ejecutivo

Tanto el entrenamiento continuo moderado como el HIIT reducen la presión arterial en hipertensos. La elección depende de seguridad, preferencia, capacidad basal y supervisión clínica. Esta síntesis orienta la decisión terapéutica en la práctica latinoamericana.

Esta síntesis clínica de Metabolic Fitness Academy traduce evidencia contemporánea en fisiología del ejercicio aplicada a criterios prácticos para médicos, kinesiólogos y fisiólogos clínicos en Latinoamérica.

Efectos hemodinámicos del ejercicio

El ejercicio aeróbico regular disminuye la presión arterial sistólica y diastólica mediante mejoría endotelial, reducción de la rigidez arterial y modulación autonómica. En hipertensos controlados, ambos modelos (continuo e intervalado) muestran beneficios; el HIIT puede ofrecer mayores ganancias de VO₂pico en menor tiempo, con similar o superior reducción de presión en algunos ensayos.

Seguridad y criterios de selección

Antes de HIIT se requiere estabilidad clínica, control farmacológico adecuado y, idealmente, evaluación de esfuerzo. Se desaconseja en crisis hipertensiva, angina inestable o arritmias no controladas. El continuo moderado sigue siendo la puerta de entrada más segura para descondicionados o con alta ansiedad al esfuerzo intenso.

Prescripción pragmática

Una estrategia escalonada funciona bien: 4–6 semanas de continuo moderado, luego introducir intervalos cortos (p. ej. 1:1 o 1:2) si la respuesta es favorable. Monitoree presión pre/post sesión, síntomas y adherencia. La mejor modalidad es la que el paciente sostiene en el tiempo con supervisión adecuada.

Implicaciones clínicas

Prefiera continuo en inicio o alto riesgo; avance a HIIT supervisado si hay estabilidad y objetivo de fitness. Mida PA, RPE y tolerancia en cada progresión.

Referencias y marcos de evidencia

- ESC / ESH guidelines on arterial hypertension and lifestyle therapy.
- Meta-analyses of HIIT versus moderate continuous training in hypertension.