

GEOMETRIE ȘI ALGEBRĂ LINIARĂ

Curs Sisteme de ecuații

Pentru a începe să discutăm despre rezolvarea sistemelor de ecuații liniare, vom introduce în cele ce urmează rangul unei matrice.

Definiția 1. Se numește *rangul* matricei $A \in \mathcal{M}_{m,n}(R)$, $A \neq 0_{m,n}$, ordinul maxim al unui minor nenul al matricii A . Vom nota rangul cu $\text{rang}(A)$. Prin convenție $\text{rang}(0_{m,n}) = 0$.

Așadar $\text{rang}(A) = r \Leftrightarrow A$ are un minor de ordin r nenul și toți minorii de ordin mai mare (dacă există) sunt nuli.

Observația 2. (1) $\text{rang}(A) \leq \min\{m, n\}$
(2) $\text{rang}({}^t A) = \text{rang}(A)$
(3) $\text{rang}(A) = r \Leftrightarrow A$ are un minor de ordin r nenul și toți minorii de ordin $r + 1$ nuli.

Demonstrație: " \Rightarrow " Clar. " \Leftarrow " Din formula Laplace, un minor de ordin $s > r + 1$, deci e nul. Sau altfel: Folosind dezvoltarea după o linie, rezultă că orice minor de ordin $r + 2$ e combinație liniară de ordin $r + 1$, deci nul, și așa mai departe prin inducție.

(4) $\text{rang}(A \cdot B) \leq \min\{\text{rang}(A), \text{rang}(B)\}$ ptr. orice matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(R)$ și $B \in \mathcal{M}_{n,p}(R)$. □

Demonstrație: Din formula Binet-Cauchy un minor de ordin r a matricii $A \cdot B$ este o combinație liniară de minori de ordin r ai matricii A (respectiv B), deci $\text{rang}(A \cdot B) \leq \text{rang}(A)$ și $\text{rang}(A \cdot B) \leq \text{rang}(B)$. □

(5) $A \in \mathcal{M}_{m,n}(R)$, $U \in \mathcal{M}_m(R)$ inversabilă și $V \in \mathcal{M}_n(R)$ inversabilă, atunci $\text{rang}(U \cdot A) = \text{rang}(A) = \text{rang}(A \cdot V)$.

Demonstrație: $\text{rang}(U \cdot A) \leq \min\{\text{rang}(U), \text{rang}(A)\} \leq \text{rang}(A)$ și $\text{rang}(A) = \text{rang}(U^{-1}(U \cdot A)) \leq \text{rang}(U \cdot A)$. Din cele două inegalități ne rezultă prima egalitate. Similar se demonstrează și a doua egalitate. □

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(R)$. Notăm cu $C_1(A), \dots, C_n(A)$ coloanele matricei A . $C_j(A) \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^m$.

Teorema 3 (Kronecker). $\text{rang}(A) = \dim \langle C_1(A), \dots, C_n(A) \rangle$

Deci teorema Kronecker ne spune că $\text{rang}(A)$ este egal cu dimensiunea spațiului generat de coloanele matricei A . Acest spațiu este un subspațiu în \mathbb{R}^m .

Demonstrație: Dacă $A = 0$, este clar. Presupunem $A \neq 0$. Fie $r \in \mathbb{N}^*$ a.i. există un minor nenul de ordin r și toți minorii de ordin $r+1$ care-l bordează, (în caz că există) sunt nuli. Arătăm că $\dim \langle C_1(A), \dots, C_n(A) \rangle = r$. Cum $\text{rang}(A)$ este un astfel de r , va rezulta că $\dim \langle C_1(A), \dots, C_n(A) \rangle = \text{rang}(A)$. În plus, rezultă că orice astfel de r este egal cu $\text{rang}(A)$.

Fără a restrânge generalitatea putem presupune că minorul Δ aflat la intersecția primelor r linii cu primele r coloane din A este nenul. Atunci $C_1(A), \dots, C_r(A)$ sunt liniar independente. Altfel, am avea o relație de tipul $C_j(A) = \sum_{1 \leq i \leq r; i \neq j} \alpha_i C_i(A)$, pentru niște $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq r; i \neq j}$. Notând cu $\widetilde{C_i(A)}$ coloana de lungime r obținută luând primele r linii din $C_i(A)$, obținem $\widetilde{C_j(A)} = \sum_{1 \leq i \leq r; i \neq j} \alpha_i \widetilde{C_i(A)}$, deci în Δ o coloană este combinație de celelalte coloane, de unde $\Delta = 0$, o contradicție. Deci coloanele $C_1(A), \dots, C_r(A)$ sunt liniar independente de unde $\dim \langle C_1(A), \dots, C_n(A) \rangle \geq r$.

Arătăm că $C_j(A) \in \langle C_1(A), \dots, C_r(A) \rangle$ pentru orice $j > r$, de unde va rezulta că $\dim \langle C_1(A), \dots, C_n(A) \rangle = r$.

$$\text{Fie } j > r \text{ c si } 1 \leq i \leq m. \text{ Atunci } \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} & a_{1j} \\ a_{21} & \dots & a_{2r} & a_{2j} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} & a_{rj} \\ a_{i1} & \dots & a_{ir} & a_{ij} \end{vmatrix} = 0 \text{ deoarece pentru}$$

$1 \leq i \leq r$ acest determinant are două linii (i și $r+1$) egale, iar pentru $i > r$ e un minor de ordin $r+1$ care bordează Δ .

Dezvoltând după ultima linie rezultă $d_1 \cdot a_{i1} + \dots + d_r \cdot a_{ir} + \Delta \cdot a_{ij} = 0$, iar d_1, \dots, d_r sunt niște complementări algebrice ce nu depind de i .

Obținem că $a_{ij} = -\Delta^{-1}d_1a_{i1} - \dots - \Delta^{-1}d_ra_{ir}$ pentru orice $1 \leq i \leq m$, de unde $C_j(A) = -\Delta^{-1}d_1C_1(A) - \dots - \Delta^{-1}d_rC_r(A)$, ceea ce doream.

□

Teorema 4 (versiunea pe linii a teoremei Kronecker). $\text{rang}(A) = \dim \langle L_1(A), \dots, L_m(A) \rangle$, unde $L_i(A)$ sunt liniile matricei A , $L_i(A) \in \mathbb{R}^n$.

Demonstrație: Rezultă din faptul că $\text{rang}(A) = \text{rang}(^t A)$.

□

Corolarul 5 (al demonstrației teoremei Kronecker). *Dacă pentru matricea A există un minor de ordin r nenul și toți minorii de ordin $r + 1$ care-l bordează sunt nuli, atunci $\text{rang}(A) = r$.*

Rezolvarea sistemelor de ecuații liniare

Considerăm sistemul de ecuații liniare cu coeficienți reali:

$$(1) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots + \vdots + \vdots + \vdots = \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Sistemul scris mai sus este un sistem de m ecuații cu n necunoscute. Matricea asociată sistemului este $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ iar coloana termenilor liberi este $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R})$.

Sistemul (1) se poate scrie sub formă matriceală $AX = B$, unde $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ e

matricea necunoscutelor.

Considerăm și matricea extinsă,

$$A^* = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \in \mathcal{M}_{m,n+1}(\mathbb{R}).$$

care se obține din matricea A adăugând coloana $n + 1$ formată din membrii dreپți ai sistemului. Fiecare coloană este un vector în \mathbb{R}^m .

Definiția 6. Se numește *soluție* a sistemului de mai sus un vector $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$

care verifică toate ecuațiile sistemului.

Un sistem care admite cel puțin o soluție se numește *compatibil*. Altfel acesta se numește *incompatibil*.

Teorema 7 (Kronecker-Capelli). *Sistemul (1) este compatibil dacă și numai dacă $\text{rang}(A) = \text{rang}(A^e)$.*

Demonstrație: Observăm că $AX = x_1 C_1(A) + \dots + x_n C_n(A)$, deci sistemul (1) este echivalent cu $x_1 C_1(A) + \dots + x_n C_n(A) = B$.

" \Rightarrow " Dacă sistemul (1) este compatibil, fie x_1, x_2, \dots, x_n o soluție. Atunci $B = x_1 C_1(A) + \dots + x_n C_n(A) \in \langle C_1(A), \dots, C_n(A) \rangle$ și deci $\langle C_1(A), \dots, C_n(A), B \rangle = \langle C_1(A), \dots, C_n(A) \rangle$. Avem $\dim(\langle C_1(A), \dots, C_n(A), B \rangle) = \dim(\langle C_1(A), \dots, C_n(A) \rangle)$, și din teorema Kronecker rezultă $\text{rang}(A^e) = \text{rang}(A)$.

" \Leftarrow " Avem $\text{rang}(A) = \text{rang}(A^e) \Rightarrow \dim(\langle C_1(A), \dots, C_n(A) \rangle) = \dim(\langle C_1(A), \dots, C_n(A), B \rangle)$. Dar $\langle C_1(A), \dots, C_n(A) \rangle \subset \langle C_1(A), \dots, C_n(A), B \rangle$, și pentru că avem egalitate de dimensiuni atunci avem egalitatea spațiilor. Rezultă că $B \in \langle C_1(A), \dots, C_n(A) \rangle$, adică există x_1, \dots, x_n a.î. $B = x_1 C_1(A) + \dots + x_n C_n(A) \Rightarrow x_1, \dots, x_n$ este soluție a sistemului (1).

□

Cum se rezolvă sistemul (1) atunci când $\text{rang}(A) = \text{rang}(A^e)$?

Voi prezenta în continuare metoda eliminării Gauss-Jordan.

Observăm că un sistem liniar peste corpul \mathbb{R} este echivalent (adică are aceleași soluții) cu un sistem obținut prin aplicarea de un număr finit de ori a unor operații de tipul:

- permutarea a două ecuații
- înmulțirea unei ecuații cu un scalar $\alpha \in \mathbb{R}^*$
- adunarea la o ecuație a unei alte ecuații înmulțite cu $\alpha \in \mathbb{R}^*$.

Pentru sistemul (1) scris sub forma matriceală $AX = B$, aceste operații înseamnă:

- permutarea a două linii
- înmulțirea unei linii cu $\alpha \in \mathbb{R}^*$
- adunarea la o linie a unei alte linii înmulțite cu $\alpha \in \mathbb{R}^*$

operații aplicate matricelor A și B , deci matricei extinse $A^e = (A|B)$.

Definiția 8. Se numește matrice eșalon o matrice cu proprietățile:

- liniile nule (dacă) există se află sub liniile nenule
- primul element nenul (de la stânga la dreapta) de pe fiecare linie nenulă este 1: acesta numindu-se pivotul liniei

GEOMETRIE ȘI ALGEBRĂ LINIARĂ

- pivotul de pe linia $i + 1$ este la dreapta pivotului de pe linia i , pentru orice i
- orice pivot este singurul element nenul de pe coloana sa

Propoziția 9. *Orice matrice poate fi transformată după un număr finit de operații cu linii într-o matrice eșalon.*

Putem da acum algoritmul după Gauss-Jordan de rezolvare a sistemelor de ecuații.

Scriem matricea A^e a sistemului și o aducem la forma eșalon. Dacă există un pivot pe ultima coloană atunci sistemul este incompatibil (în sistemul echivalent avem o ecuație $0 = 1$).

Altfel, necunoscutele corespunzătoare coloanelor cu pivoți sunt coloanele principale, celelalte secundare. Trecem necunoscutele secundare în membrul drept și le dăm valori arbitrare în \mathbb{R} și apoi calculăm necunoscutele principale în funcție de cele secundare. Sistemul e compatibil determinat (adică are soluție unică) dacă avem un pivot pe fiecare coloană în afară de ultima.

Observăm că numărul pivoților = $\text{rang}(A^e)$ iar $\text{rang}(A)$ numărul pivoților din primele n coloane și totodată numărul variabilelor principale.

Exemplul 1. Fie matricea

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 3 & 2 & -2 \\ 4 & 3 & -2 & -4 \end{pmatrix}. \text{ Vedem că primul element de pe prima linie este } 1, \text{ deci din}$$

definiția pivotului acesta este pivotul primei linii. Cum pivotul este singurul nenul pe coloana sa vom elimina elementele de pe prima coloană folosind acest pivot. Astfel $L'_2 = L_2 + L_1$ și $L'_3 = L_3 - 4L_1$. Avem

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 3 & 2 & -2 \\ 4 & 3 & -2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -10 & -12 \end{pmatrix}. \text{ Vedem că elementul de pe a}$$

doua linie și a doua coloană este nenul. Acesta va fi pivotul celei de-a doua linii. Pentru a obține 1 în acea poziție trebuie să împărțim linia a doua cu 4, deci facem

transformarea $L'_2 = \frac{1}{4}L_2$. Astfel obținem matricea $\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -10 & -12 \end{pmatrix}$. Cu

pivotul al doilea, cel de pe linia a doua, facem eliminări astfel încât acesta să rămână singurul nenul pe coloana sa. Eliminările sunt $L'_1 = L_1 - L_2$, $L'_3 = L_3 + L_2$. Obținem

matricea $\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & -12 \end{pmatrix}$. Elementul nenul de pe linia 3 este -9, pe coloana

a treia. Aici obținem al treilea pivot împărțind L_3 cu -9. După această operație

matricea devine $\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$. În sfârșit vom face ultimele eliminări pe coloana a treia a.î. pivotul să rămână singurul nenul pe coloana sa.

Transformările sunt $L'_1 = L_1 - L_3$ și $L'_2 = L_2 - L_3$. Forma eșalon a matricii este

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

Algoritmul Gauss-Jordan este folositor pentru a obține și inversa unei matrice.

Exemplul 2. Voi considera pentru ușurință matricea $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ care

este formată din primele coloane ale matricei A din exemplul anterior. Vom calcula folosind operații cu linii (înmulțiri la stânga cu matrice inversabile) inversa B^{-1} .

Aplicăm acest algoritm matricii $(B|I_3)$. Înmulțim la stânga cu B^{-1} și avem $B^{-1} \cdot (B|I_3) = (B^{-1} \cdot B | B^{-1} \cdot I_3) = (I_3 | B^{-1})$. Făcând eliminare Gauss-Jordan pentru matricea $(B|I_3)$ vom obține matricea $(I_3 | B^{-1})$, deci în dreapta, inversa lui B .

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} L'_2 = L_2 + L_1 \\ L'_3 = L_3 - 4L_1 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -10 & -4 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} L'_2 = \frac{1}{4}L_2 \\ \sim \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & -1 & -10 & -4 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} L'_1 = L_1 - L_2 \\ L'_3 = L_3 + L_2 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & -9 & -\frac{15}{4} & \frac{1}{4} & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} L'_3 = -\frac{1}{9}L_3 \\ \sim \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{12} & -\frac{1}{36} & -\frac{1}{9} \end{array} \right) \begin{array}{l} L'_1 = L_1 - L_3 \\ L'_2 = L_2 - L_3 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{12} & -\frac{8}{36} & \frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{12} & \frac{10}{36} & \frac{1}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{12} & -\frac{1}{36} & -\frac{1}{9} \end{array} \right).$$

Deci

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{12}{36} & -\frac{8}{36} & \frac{4}{36} \\ -\frac{6}{36} & \frac{10}{36} & \frac{4}{36} \\ \frac{15}{36} & -\frac{1}{36} & -\frac{4}{36} \end{pmatrix} = \frac{1}{-36} \begin{pmatrix} -12 & 8 & -4 \\ 6 & -10 & -4 \\ -15 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Numitorul -36 este bineînțeles $\det(B)$. Se verifică ușor că $B \cdot B^{-1} = I_3$.

Este un algoritm mult mai economic decât cel de aflare a adjunctei matricii (deci a cofactorilor). Inversa este adjuncta înmulțită cu inversul determinantului matricii.

O ultimă observație, anume că forma eșalon a unei matrice inversabile este matricea unitate I_n . În acest exemplu forma eșalon a matricii B este I_3 .

Sisteme liniare omogene

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Considerăm sistemul liniar $AX = 0$, unde $0 \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R})$, adică

$$(2) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots + \vdots + \vdots + \vdots = \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Bineînțeles că un sistem omogen are întotdeauna soluția nulă, deci orice sistem omogen este compatibil.

Aplicăm același algoritm de rezolvare ca și în cazul sistemelor cu coloana termenilor liberi nenulă. Începem cu calculul rangului matricei. Cel mai economic este aplicarea algoritmului Gauss-Jordan, care ne dă nu numai rangul matricii, dar și o formă simplă, echivalentă, a sistemului de unde aflăm cu ușurință soluția.

Exemplul 3. Să rezolvăm sistemul omogen $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 4x_4 = 0 \end{cases}$

Matricea sistemului este $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 3 & 2 & -2 \\ 4 & 3 & -2 & -4 \end{pmatrix}$, matricea din **exemplul 1**.

Forma eșalon știm că este $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$.

Rangul este 3, primele trei necunoscute sunt principale și depind de a patra necunoscută, cea secundară. Sistemul devine $\begin{cases} x_1 + \frac{2}{3}x_4 = 0 \\ x_2 - \frac{4}{3}x_4 = 0 \\ x_3 + \frac{4}{3}x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{2}{3}x_4 \\ x_2 = \frac{4}{3}x_4 \\ x_3 = -\frac{4}{3}x_4 \end{cases}$

Soluția are un parametru, $x_4 \in \mathbb{R}$.

Mulțimea soluțiilor este $S = \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{2}{3}\alpha \\ \frac{4}{3}\alpha \\ -\frac{4}{3}\alpha \\ \alpha \end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\} \subset \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^1$.