

Kontrolltöö 2

Andmebaasid
2022

Küsimus 1

Küsimus 1

Õige

Hindepunkte
1.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Olgu relatsioon R seisundiga

A	B	C	D
1	2	1	2
2	1	2	2

$\sigma_{\alpha}(R) = \{ \langle 1, 2, 1, 2 \rangle \}$ kui $\alpha = (A = 1, B = 2, C \leq 1, D = 2)$

väär



$\sigma_{\alpha}(R) = \{ \langle 1, 2, 1, 2 \rangle \}$ kui $\alpha = (A = 1 \ \& \ B = 2 \ \& \ C \leq 1 \ \& \ D \neq 2)$

väär



$\sigma_{\alpha}(R) = \{ \langle 1, 2, 1, 2 \rangle \}$ kui $\alpha = (A = 1 \ \& \ B = 2 \ \& \ C \leq 1 \ \& \ D = 2)$

tõene



Teie vastus on õige.

Õige vastus on:

$\sigma_{\alpha}(R) = \{ \langle 1, 2, 1, 2 \rangle \}$ kui $\alpha = (A = 1, B = 2, C \leq 1, D = 2) \rightarrow$ väär,

$\sigma_{\alpha}(R) = \{ \langle 1, 2, 1, 2 \rangle \}$ kui $\alpha = (A = 1 \ \& \ B = 2 \ \& \ C \leq 1 \ \& \ D \neq 2) \rightarrow$ väär,

$\sigma_{\alpha}(R) = \{ \langle 1, 2, 1, 2 \rangle \}$ kui $\alpha = (A = 1 \ \& \ B = 2 \ \& \ C \leq 1 \ \& \ D = 2) \rightarrow$ tõene

Küsimus 1

Küsimus 1

Õige

Hindepunkte
1.00/1.00

🚩 Eemalda
märgistus

Olgu relatsioon Sõbrad seisundiga:

sugu	eesnimi	perenimi
M	Tiit	Tamm
M	Toomas	Tulikas
N	Mari	Murakas
M	Toomas	Tulp

Mis on järgneva projektsiooni tulemus:

π_{sugu} (Sõbrad)

Valige üks:

Teie vastus on õige.

Õige vastus on:

sugu
N
M

Küsimus 1

Küsimus 1

Vale

Hindepunkte
0.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Olgu relatsioon $R(A_1, A_2, A_3)$ seisundiga:

$r = \{ \langle 1, 1, 1 \rangle, \langle 1, 3, 1 \rangle, \langle 2, 3, 1 \rangle, \langle 3, 1, 1 \rangle, \langle 2, 1, 1 \rangle \}$

Mis on järgneva projektsiooni tulemus:

$\pi_{A_2, A_3}(R)$

Valige üks:

- ☒ $\{ \langle 1, 3, 1 \rangle, \langle 2, 3, 1 \rangle \}$
- ☐ $\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$
- ☐ $\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$
- ☐ $\{ \langle 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3 \rangle, \langle 2 \rangle \}$



Teie vastus on vale.

Õige vastus on: $\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$

Küsimus 1

Õige

Hindpunkte
1.00/1.00Märgistatud
küsimus

Olgu relatsioon R seisundiga

A	B	C
1	2	1
2	1	2
1	1	1

 $\sigma_a(R) = \{ \langle 1, 2, 1 \rangle \}$ kui $\alpha = (A = 1 \ \& \ C = 2)$

väär

 $\sigma_a(R) = \{ \langle 1, 2, 1 \rangle, \langle 1, 1, 1 \rangle \}$ kui $\alpha = (A = 1 \ \& \ C = 1)$

tõene

 $\sigma_a(R) = \{ \langle 1, 2, 1 \rangle, \langle 1, 1, 1 \rangle \}$ kui $\alpha = (A = 1 \ \& \ B = 1 \ \& \ C = 1)$

väär



Teie vastus on õige.

Õige vastus on:

 $\sigma_a(R) = \{ \langle 1, 2, 1 \rangle \}$ kui $\alpha = (A = 1 \ \& \ C = 2) \rightarrow$ väär, $\sigma_a(R) = \{ \langle 1, 2, 1 \rangle, \langle 1, 1, 1 \rangle \}$ kui $\alpha = (A = 1 \ \& \ C = 1) \rightarrow$ tõene, $\sigma_a(R) = \{ \langle 1, 2, 1 \rangle, \langle 1, 1, 1 \rangle \}$ kui $\alpha = (A = 1 \ \& \ B = 1 \ \& \ C = 1) \rightarrow$ väär

Küsimus 2

Küsimus 2

Õige

Hindepunkte
1.00/1.00

Märgistatud
küsimus

Olgu R ja S kooskõlalised ning

R

A	B	C
1	1	2
1	2	1
2	2	2

S

D	E	F
2	2	1
1	1	2
1	2	1

Mis on R u S tulemus?

Valige üks või mitu:

☐

A	B	C
1	1	2
1	2	1
2	2	2
1	2	1

☐

A	B	C
2	2	2

☒

A	B	C
1	1	2
1	2	1
2	2	2
2	2	1

☐

A	B	C
1	1	2
1	2	1
2	2	1

☐

A	B	C
1	1	2
1	2	1

Teie vastus on õige.

Õige vastus on:

A	B	C
1	1	2
1	2	1
2	2	2
2	2	1

Küsimus 2

Küsimus 2

Õige

Hindepunkte
1.00/1.00

🚩 Märkistatud
küsimus

Olgu R ja S kooskõlalised ja

R			S		
A	B	C	D	E	F
2	2	1	1	2	1

Mis tehete tulemuseks saame :

A	B	C
2	2	1

Valige üks või mitu:

- ☐ Sellist tehet pole
- ☐ $R \cup S$
- ☐ $R \cap S$
- ☒ $R - S$
- ☐ $R \times S$



Teie vastus on õige.

Õige vastus on: $R - S$

Küsimus 2

Küsimus **2**

Õige

Hindepunkte
1.00/1.00

🚩 Eemalda
märgistus

Olgu R ja S kooskõlalised ning

R

A	B	C
1	1	2
1	2	1
2	2	2

S

D	E	F
2	2	1
1	1	2
1	2	1

Mis on $S - R$ tulemus?

Teie vastus on õige.

Õige vastus on:

D	E	F
2	2	1

Küsimus 2

Küsimus **2**

Õige

Hindepunkte
1.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Olgu R ja S kooskõlalised ning

R	S
---	---

A	B	C
2	2	1
1	1	2

D	E	F
2	2	1
2	1	2

Mis tehte tulemuseks saame :

A	B	C
2	2	1
1	1	2
2	1	2

Valige üks:

☐ $R \cap S$

☒ $R \cup S$ ✓

☐ $R \times S$

☐ Sellist tehet pole

☐ $R - S$

Teie vastus on õige.

Õige vastus on: $R \cup S$

Küsimus 3

Küsimus **3**

Õige

Hindepunkte
1.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Olgu R relatsiooni seisund, kus on 6 veergu ja 2 rida ning S relatsiooni seisund, kus on 2 veergu ja 6 rida.

Nende otsekorrutises $R \times S$ on  korteeži ning igas korteežis on  elementi.

Küsimus 3

Küsimus **3**

Õige

Hindepunkte
1.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Olgu R relatsiooni seisund, kus on 3 veergu ja 5 rida ning S relatsiooni seisund, kus on 4 veergu ja 2 rida.

Nende otsekorrutises $R \times S$ on ✓ korteeži ning igas korteežis on ✓ elementi.

Küsimus 3

Küsimus **3**

Õige

Hindepunkte 1.00/1.00

🚩 Märgistatud küsimus

Olgu R relatsiooni seisund, kus on 1 veerg ja 2 rida ning S relatsiooni seisund, kus on 2 veergu ja 1 rida.

Nende otsekorrutises $R \times S$ on

2



korteeži ning igas korteežis on

3



elementi.

Küsimus 4

Küsimus 4

Punkte

1.00

Arvustatud

Küsimus

Olgu antud relatsioon $R(Q, S, T, U, \underline{W})$, kus primaarvõti on QW ja kehtivad funktsionaalsed sõltuvused $F=\{QW \rightarrow S, QW \rightarrow T, QWS \rightarrow U, QWT \rightarrow U\}$. Kas relatsioon R on teisel normaalkujul?

Valige üks:

- ☒ a. Jah
- ☐ b. Ei



-

Õige vastus on: Jah

Küsimus 4

Küsimus 4

Vale

Hindpunkte

0.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Olgu antud relatsioon $R(\underline{A}, B, C, \underline{D}, E)$, kus primaarvõti on AD ja kehtivad funktsionaalsed sõltuvused $F=\{A \rightarrow BC, D \rightarrow E\}$. Kas relatsioon R on teisel normaalkujul?

Valige üks:

☒ a. Jah

☐ b. Ei



-

Õige vastus on: Ei

Küsimus 4

Küsimus 4

Õige

Hindepunkte 1.00/1.00

🚩 Märgistatud küsimus

Olgu antud relatsioon $R(\underline{L}, M, N, O, P)$, kus primaarvõti on L ja kehtivad funktsionaalsed sõltuvused $F=\{LM \rightarrow N, L \rightarrow OP, L \rightarrow M\}$. Kas relatsioon R on teisel normaalkujul?

Valige üks:

☐ a. Ei

☒ b. Jah



-

Õige vastus on: Jah

Küsimus 5

Küsimus **5**

Õige

Hindepunkte

1.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Olgu antud relatsioon $R(G, H, I, J, K)$, kus primaarvõti on I ja kehtivad funktsionaalsed sõltuvused $F=\{I \rightarrow GH, GH \rightarrow J, I \rightarrow K\}$. Kas relatsioon R on kolmandal normaalkujul?

Valige üks:

- ☐ a. Jah
- ☒ b. Ei



-

Õige vastus on: Ei

Küsimus 5

Küsimus 5

Vale

Hindepunkte
0.00/1.00

🚩 Eemalda
märgistus

Olgu antud relatsioon $R(Q, \underline{S}, \underline{T}, U, W)$, kus primaarvõti on ST ja kehtivad funktsionaalsed sõltuvused $F=\{S \rightarrow Q, T \rightarrow U, ST \rightarrow W\}$. Kas relatsioon R on kolmandal normaalkujul?

Valige üks:

- ☐ a. Ei
- ☒ b. Jah ✖

-

Õige vastus on: Ei

Küsimus 5

Küsimus 5

Vale

Hindepunkte
0.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Olgu antud relatsioon $R(\underline{A}, \underline{B}, C, D, E)$, kus primaarvõti on AB ja kehtivad funktsionaalsed sõltuvused $F = \{AB \rightarrow CD, AB \rightarrow E\}$. Kas relatsioon R on kolmandal normaalkujul?

Valige üks:

- ☐ a. Jah
☒ b. Ei



-

Õige vastus on: Jah

Küsimus 5

Küsimus **5**

Õige

Hindepunkte 1.00/1.00

🚩 Märjastatud küsimus

Olgu antud relatsioon $R(\underline{A}, \underline{B}, C, D, E)$, kus primaarvõti on AB ja kehtivad funktsionaalsed sõltuvused $F=\{AB \rightarrow CD, AB \rightarrow E\}$. Kas relatsioon R on kolmandal normaalkujul?

Valige üks:

- ☒ a. Jah
- ☐ b. Ei



-

Õige vastus on: Jah

Küsimus 6

Küsimus 6

Õige

Hindepunkte

1.00/1.00

✓ Märgistatud
küsimus

Miks viiakse filtritega seotud loogilised avaldised esimese sammuna konjunktiivsele normaalkujule (rida konjunktsiooniga seotud alamlauseid)?

Valige üks:

- ☐ a. Siis saab nad ühekaupa tõsta puu juure lähedale ja rakendada koos päringu lõpptulemusele.
- ☒ b. Siis saab nad lammutada filtrite kaskaadiks ja liigutada iga alamavaldist eraldi päringupuus nii sügavale kui võimalik. ✓
- ☐ c. Siis saab nad kõik korraga täita ja sellega aega võita.

Sinu vastus on õige.

Õige vastus on: Siis saab nad lammutada filtrite kaskaadiks ja liigutada iga alamavaldist eraldi päringupuus nii sügavale kui võimalik.

Küsimus 6

Küsimus 6

Vale

Hindepunkte
0.00/1.00

🚩 Eemalda
märgistus

Miks viiakse filtritega seotud loogilised avaldised esimese sammuna konjunktiivsele normaalkujule (rida konjunktsiooniga seotud alamlauseid)?

Valige üks:

- ☐ a. Siis saab nad lammutada filtrite kaskaadiks ja liigutada iga alamavaldist eraldi päringupuus nii sügavale kui võimalik.
- ☐ b. Siis saab nad ühekaupa tõsta puu juure lähedale ja rakendada koos päringu lõpptulemusele.
- ☒ c. Siis saab nad kõik korraga täita ja sellega aega võita.



Sinu vastus on vale.

Õige vastus on: Siis saab nad lammutada filtrite kaskaadiks ja liigutada iga alamavaldist eraldi päringupuus nii sügavale kui võimalik.

Küsimus **6**

Õige

Hindpunkte
1.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Mis tasemel optimeerib andmebaasi juhtimissüsteem päringuid?

Valige üks:

- ☐ a. otse SQL-keelset päringuteksti
- ☒ b. Relatsioonalgebral põhinevat puukujulist sisekuju.
- ☐ c. Masinkoodi transleeritud päringut.

Sinu vastus on õige.

Õige vastus on: Relatsioonalgebral põhinevat puukujulist sisekuju.

Небольшое описание

Внимание! - В данной презентации могут быть не все вопросы, что присутствуют в тесте. Если вы нашли еще вопросы и ответили на них правильно, то добавьте их в данную презентацию.

Давайте будем помогать другу другу и доведем все тесты до ума.)