

症状

偏头痛发作前可出现的一些特定先兆症状，这些症状可能包括视觉、感觉、言语和语言、脑干、运动和视网膜方面的异常。常见的偏头痛视觉先兆包括闪光性暗点、同侧偏盲、火花、斑点、光幻视、环形闪光等。

头痛症状取决于头痛的类型。不同原因导致的头痛发作频率和症状强度也可能不同。常见的头痛症状包括头沉不适、搏动性头痛、刺痛、钝痛，可能伴有颈后不适、畏光、头晕及恶心呕吐症状。

原发性头痛主要以紧张型头痛、偏头痛、丛集性头痛为主，具体症状如下：

紧张型头痛

表现为头部两侧压迫感或紧缩感。以女性为多，多在 30 岁前后发病

主要症状：

头痛多位于两额及枕、颈部，呈持续性钝痛，头部有紧箍感和重压感，不伴恶心和呕吐；

头痛可于晨间醒来时或起床后不久出现，可逐渐加重呈持续性；

可与偏头痛并存。

偏头痛

发作常在白天，但夜间也可发作。偏头痛一般都局限于头的一侧，逐渐加重，几分钟或 1~2 小时达到高峰，之后恶心、呕吐后有所好转。在安静、黑暗环境内或睡眠后可缓解。可持续几个小时乃至几天，随后头痛逐渐减弱或消失。偏头痛发作前可有先兆症状，比如视觉症状（看东西有闪烁、闪光或有偏盲、黑蒙，有的患者出现视物变形、颜色改变）、感觉症状（面部或肢体麻木）和言语困难等。

丛集性头痛

丛集性头痛分为急性发作性和慢性发作性，发作可持续数周乃至数月。急性发作型典型表现为一连串密集头痛发作，发作呈周期性，无前驱症状。发作时疼痛从一侧眼窝周围开始，急速扩展至额颞部，严重时可涉及对侧。呈搏动性，兼有钻痛或灼痛，可于睡眠中痛醒。

继发性头痛

病因不同症状多种多样，从轻度到中重度疼痛均可见。根据继发性头痛的不同病因，患者可能出现脑梗死、颅内出血甚至昏迷等严重症状。

就医

播报

编辑

出现以下情况应立即就诊：头痛突然发作，迅速加重或是从未有过的疼痛感；头痛伴发热或颈部僵硬；运动或轻微损伤后不久即开始的头痛；新发头痛，尤其是孕妇或 40 岁以上者；头痛伴随无力、麻木或视觉问题；经常头痛或重度头痛者也应就诊。

就诊科室

神经内科、急诊科