

RMC voor lineaire ODEs

Isidoor Pinillo Esquivel

$$y_t = A(t)y(t). \quad (1)$$

Euler:

$$\frac{\tilde{y}(t_k + \Delta t) - \tilde{y}(t_k)}{\Delta t} = A(t_k)\tilde{y}(t_k) \quad (2)$$

$$\tilde{y}(t_{k+1}) = (I + \Delta t A(t_k))\tilde{y}(t_k) \quad (3)$$

$$Y(T_{k+1}) = (I + \Delta t A(T_{k+1}))Y(T_k) \quad (4)$$


$T_{k+1} = T_k + \text{Exp}(\Delta t)$, exponentiële verdeelde stappen.

$$y(T_k) = E[Y(T_k)]. \quad (5)$$

Overzicht

- 1 Introductie
- 2 Motivatie
- 3 Monte Carlo
- 4 Main Poisson algoritme
- 5 Geavanceerde methoden
- 6 Conclusie

Veralgemeenen van WoS algoritme van (Sawhney e.a. 2022) naar tijd



Monte Carlo

- 1 Introductie
- 2 Motivatie
- 3 Monte Carlo**
- 4 Main Poisson algoritme
- 5 Geavanceerde methoden
- 6 Conclusie

Random sample efficientie van optelling

Probleem: benader $\bar{x} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i$ met $n \ll k$ van x_i 's $\in [0, 1]$
(symmetrisch in x_i)

⁰Heinrich en Novak 2001.

Random sample efficientie van optelling

Probleem: benader $\bar{x} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i$ met $n \ll k$ van x_i 's $\in [0, 1]$
(symmetrisch in x_i)

Vertrouwensinterval kans $= 1 \sim \frac{k-n}{k} = 1 - \frac{n}{k} \approx 1$
(worst case $\frac{1}{k}$ uit elkaar)

⁰Heinrich en Novak 2001.

Random sample efficientie van optelling

Probleem: benader $\bar{x} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i$ met $n \ll k$ van x_i 's $\in [0, 1]$
(symmetrisch in x_i)

Vertrouwensinterval kans $= 1 \sim \frac{k-n}{k} = 1 - \frac{n}{k} \approx 1$
(worst case $\frac{1}{k}$ uit elkaar)

Samplen of termen willekeurig weg laten (Russische roulette)

$$\bar{x} \cong \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{I_i} \cong \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k B_i x_i. \quad (6)$$

$$(E[B_i] = 1, P[B_i = 0] = 1 - \frac{n}{k})$$

⁰Heinrich en Novak 2001.

Random sample efficientie van optelling

Probleem: benader $\bar{x} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i$ met $n \ll k$ van x_i 's $\in [0, 1]$
(symmetrisch in x_i)

Vertrouwensinterval kans $= 1 \sim \frac{k-n}{k} = 1 - \frac{n}{k} \approx 1$
(worst case $\frac{1}{k}$ uit elkaar)


Samplen of termen willekeurig weg laten (Russische roulette)

$$\bar{x} \cong \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{I_i} \cong \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k B_i x_i. \quad (6)$$

$(E[B_i] = 1, P[B_i = 0] = 1 - \frac{n}{k})$

Variantie = RMSE $\sim O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ en ook vertrouwensintervallen kans < 1
(CLT of Chebychev's ongelijkheid)

⁰Heinrich en Novak 2001.



Monte Carlo integratie

Integratie \approx sommatie, integreerbare $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$:

$$\int_0^1 f(s) ds = E[f(U)] \quad (7)$$

$$\cong \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f(U_j) \quad (8)$$

$$\text{met } U_j \sim \text{Uniform}(0, 1) \quad (9)$$

Overzicht integratie

Beschouw $f : [0, 1]^d \rightarrow [0, 1]$ k -keer Lipschitz-differentieerbaar:

$$\int_{[0,1]^d} f(x) dx. \quad (10)$$

Overzicht integratie

Beschouw $f : [0, 1]^d \rightarrow [0, 1]$ k -keer Lipschitz-differentieerbaar:

$$\int_{[0,1]^d} f(x) dx. \quad (10)$$

CVMC = Control Variate MC, +0.5 orde over DET algoritmes

FFT = Clenshaw-Curtis/Gauss Quadrature.

Overzicht integratie

Beschouw $f : [0, 1]^d \rightarrow [0, 1]$ k -keer Lipschitz-differentieerbaar:

$$\int_{[0,1]^d} f(x) dx. \quad (10)$$

CVMC = Control Variate MC, +0.5 orde over DET algoritmes

FFT = Clenshaw-Curtis/Gauss Quadrature.

	$k = -1$	$0 \leq k \leq 2$	$3 \leq k \leq 5$	$k > 5$
$d = 1$	MC	CVMC	?	FFT
$2 \leq d \leq 5$	MC	CVMC	CVMC	?
$d > 5$	MC	MC	MC	MC

Tabel: Overzicht integratie algoritmes.

- 1 Introductie
- 2 Motivatie
- 3 Monte Carlo
- 4 Main Poisson algoritme**
- 5 Geavanceerde methoden
- 6 Conclusie

Main Poisson algoritme

$$y_t = A(t)y, \quad A(t) \text{ meetbaar en } \sup_t \|A(t)\| < \infty \Leftrightarrow \quad (11)$$

(14)

(15)

Main Poisson algoritme

$$y_t = A(t)y, \quad A(t) \text{ meetbaar en } \sup_t \|A(t)\| < \infty \Leftrightarrow \quad (11)$$

$$y_t + \sigma y = (\sigma I + A(t))y \Leftrightarrow \quad (12)$$

$$(14)$$

$$(15)$$

Main Poisson algoritme

$$y_t = A(t)y, \quad A(t) \text{ meetbaar en } \sup_t \|A(t)\| < \infty \Leftrightarrow \quad (11)$$

$$y_t + \sigma y = (\sigma I + A(t))y \Leftrightarrow \quad (12)$$

$$e^{-\sigma t}(e^{\sigma t}y)_t = (\sigma I + A(t))y \Leftrightarrow \quad (13)$$

$$(14)$$

$$(15)$$

Main Poisson algoritme

$$y_t = A(t)y, \quad A(t) \text{ meetbaar en } \sup_t \|A(t)\| < \infty \Leftrightarrow \quad (11)$$

$$y_t + \sigma y = (\sigma I + A(t))y \Leftrightarrow \quad (12)$$

$$e^{-\sigma t}(e^{\sigma t}y)_t = (\sigma I + A(t))y \Leftrightarrow \quad (13)$$

$$y(t) = e^{-\sigma t}y(0) + \int_0^t e^{(s-t)\sigma} ((\sigma I + A(s))y(s)) ds, \quad (14)$$

$$(15)$$

Main Poisson algoritme

$$y_t = A(t)y, \quad A(t) \text{ meetbaar en } \sup_t \|A(t)\| < \infty \Leftrightarrow \quad (11)$$

$$y_t + \sigma y = (\sigma I + A(t))y \Leftrightarrow \quad (12)$$

$$e^{-\sigma t}(e^{\sigma t}y)_t = (\sigma I + A(t))y \Leftrightarrow \quad (13)$$

$$y(t) = e^{-\sigma t}y(0) + \int_0^t e^{(s-t)\sigma} ((\sigma I + A(s))y(s)) ds, \quad (14)$$

doe volgende substitutie $e^{(s-t)\sigma} = \tau$, equivalent aan exponentieel te samplen

(15)

Main Poisson algoritme

$$y_t = A(t)y, \quad A(t) \text{ meetbaar en } \sup_t \|A(t)\| < \infty \Leftrightarrow \quad (11)$$

$$y_t + \sigma y = (\sigma I + A(t))y \Leftrightarrow \quad (12)$$

$$e^{-\sigma t}(e^{\sigma t}y)_t = (\sigma I + A(t))y \Leftrightarrow \quad (13)$$

$$y(t) = e^{-\sigma t}y(0) + \int_0^t e^{(s-t)\sigma} ((\sigma I + A(s))y(s)) ds, \quad (14)$$

doe volgende substitutie $e^{(s-t)\sigma} = \tau$, equivalent aan exponentieel te samplen

$$y(t) = \int_0^{e^{-\sigma t}} y(0)d\tau + \int_{e^{-\sigma t}}^1 \left(I + \frac{A(s)}{\sigma} \right) y(s)d\tau. \quad (15)$$

Main Poisson algoritme

$$y_t = A(t)y, \quad A(t) \text{ meetbaar en } \sup_t \|A(t)\| < \infty \Leftrightarrow \quad (11)$$

$$y_t + \sigma y = (\sigma I + A(t))y \Leftrightarrow \quad (12)$$

$$e^{-\sigma t}(e^{\sigma t}y)_t = (\sigma I + A(t))y \Leftrightarrow \quad (13)$$

$$y(t) = e^{-\sigma t}y(0) + \int_0^t e^{(s-t)\sigma} ((\sigma I + A(s))y(s)) ds, \quad (14)$$

doe volgende substitutie $e^{(s-t)\sigma} = \tau$, equivalent aan exponentieel te samplen

$$y(t) = \int_0^{e^{-\sigma t}} y(0)d\tau + \int_{e^{-\sigma t}}^1 \left(I + \frac{A(s)}{\sigma} \right) y(s)d\tau. \quad (15)$$

sample τ uniform, equivalent aan een Poisson proces te samplen.

Main Poisson algoritme (recursie)

$$y(t) = \int_0^{e^{-\sigma t}} y(0) d\tau + \int_{e^{-\sigma t}}^1 \left(I + \frac{A(s)}{\sigma} \right) y(s) d\tau. \quad (16)$$

sample τ uniform, equivalent aan een Poisson proces te samplen.

Main Poisson algoritme (recursie)

$$y(t) = \int_0^{e^{-\sigma t}} y(0) d\tau + \int_{e^{-\sigma t}}^1 \left(I + \frac{A(s)}{\sigma} \right) y(s) d\tau. \quad (16)$$

sample τ uniform, equivalent aan een Poisson proces te samplen.

Doe dit recursief verder:

$$Y(t) = \begin{cases} y(0) & \text{als } e^{-\sigma t} \leq \tau \\ \left(I + \frac{A(S)}{\sigma} \right) Y(S) & \text{anders} \end{cases}, \quad (17)$$

met $S = t + \frac{\ln(\tau)}{\sigma}$.

Main Poisson algoritme (recursie)

$$y(t) = \int_0^{e^{-\sigma t}} y(0) d\tau + \int_{e^{-\sigma t}}^1 \left(I + \frac{A(s)}{\sigma} \right) y(s) d\tau. \quad (16)$$

sample τ uniform, equivalent aan een Poisson proces te samplen.



Doe dit recursief verder:

$$Y(t) = \begin{cases} y(0) & \text{als } e^{-\sigma t} \leq \tau \\ \left(I + \frac{A(S)}{\sigma} \right) Y(S) & \text{anders} \end{cases}, \quad (17)$$

met $S = t + \frac{\ln(\tau)}{\sigma}$.

$$y(t) = E \left[\prod_{k=1}^{N_t} \left(I + \frac{A(T_k)}{\sigma} \right) \right] y(0). \quad (18)$$

Main Poisson algoritme (convergentie)



Figuur: Realizaties van de norm van de fout, met $nsim = 1$ en σ variabel of $nsim$ variabel en $\sigma = 1$. Hoeveelheid samples van A per simulatie = $\text{Poisson}(\sigma)$.

Main Poisson algoritme (opmerkingen)

$$y(t) \cong Y(t) = \prod_{k=1}^{N_t} \left(I + \frac{A(T_k)}{\sigma} \right) y(0). \quad (19)$$

- TB: $E[Y(t)], \text{Var}[Y(t)] < \infty$
- Parallele complexiteit
- Volgorde matrix vermenigvuldigen $v^T y(t)$
- Inspiratie uit Acebrón en Ribeiro 2016

- Stabiliteit \rightarrow Kettunen e.a. 2021 (efficiënte unbiased $e^{\int A(s)ds}y(0)$)
- Biased voor non-lineaire ODEs

- Random ODEs
- Specifieke ODEs