

# Daubenmire Datasheet

Date: 6/18/18

Observer: KEF

Recorder: KEF

Team lead: KEF

\*dense white clover

\*tons of parsnip.

Site:

byd1

Transsect:

tbyd1a

Round:

100m

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed	Common ramet #	Swamp ramet #	Butterfly ramet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	1	0	98	0	0	0	0	0	0	16	1.00
10 m	0	0	98	0	0	0	0	0	0	16	0.25
20 m	3	0	98	0	0	0	0	0	16	38	1.25
30 m	3	0	98	0	0	0	0	0	1	16	0.50
40 m	3	0	98	0	0	0	0	0	1	16	0.50
50 m	38	0	98	0	0	0	0	0	1	16	1.25
60 m	16	0	98	0	0	0	0	0	0	16	0.05
70 m	0	0	98	0	0	0	0	0	1	16	0.75
80 m	0	0	819	3	1	0	0	0	3	163	1.00
90 m	3	0	98	0	0	0	0	0	1	38	3.00

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	5	3	2	2	4	3	3	2	4	2
E	3	2	8	5	9	6	7	10	6	2
S	2	2	3	3	4	3	3	10	3	3
W	3	2	2	5	2	4	7	10	5	2

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm