

Daubenmire Datasheet

Date: Kelsen 7/13/17

Observer: Kelsen

Recorder: Kelsen

Team lead: Kelsen

Site: byd2 -
Transect: tbyd2a -
Round: 2 -
100m

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed	Common ramet #	Swamp ramet #	Butterfly ramet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	0	1	86	0	0	0	0	0	1	16	2.0
10 m	0	1	98	0	0	0	0	0	0	1	0.5
20 m	0	3	98	0	0	0	0	0	0	1	1.0
30 m	0	16	38	0	0	0	0	0	3	38	0.5
40 m	0	38	16	0	0	0	0	0	1	38	0.75
50 m	0	16	38	0	0	0	0	0	3	38	1.5
60 m	0	16	63	0	0	0	0	0	3	38	2.0
70 m	0	63	16	0	0	0	0	0	1	38	2.0
80 m	0	38	63	0	0	0	0	0	1	16	2.0
90 m	0	38	86	0	0	0	0	0	0	0	0

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	1	1	1	2	3	1	1	2	2	2
E	1	1	1	0	1	1	1	2	1	1
S	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2
W	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm