

Daubeamire Datasheet

Date: 6-19-18

Observer: Sekh A

Recorder: Sekh A

Team lead: Sekh A

avg of 8 native forbs/m²

Site: prd2
Transsect: tprd2a
Round: 1
100m

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed	Common rarnet #	Swamp rarnet #	Butterfly rarnet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	86	0	16	0	0	0	0	0	1	98	1.5
10 m	86	3	16	0	0	0	0	0	16	86	0.75
20 m	86	16	3	0	0	0	0	0	1	98	1.0
30 m	86	16	16	0	0	0	0	0	16	86	0.5
40 m	63	16	38	0	0	0	0	0	16	63	0.5
50 m	86	3	16	0	0	0	0	0	38	63	0.25
60 m	38	38	38	6	0	0	0	0	16	86	0.25
70 m	63	16	16	0	0	0	0	0	1	98	0.75
80 m	63	16	38	0	0	0	0	0	16	86	0.5
90 m	86	3	16	0	0	0	0	0	16	86	0.5

Robel Pole:

counted lead plant as a forb

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	3	6	3	5	3	4	6	6	6	4
E	5	5	4	6	6	6	8	8	4	5
S	4	6	5	4	4	5	6	4	3	4
W	4	5	4	5	4	4	6	4	3	4

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm