

Daubenmire 0 ta Sheet

Sampling Date and Year: Nov 2 2012

Site: NW 2

Data Collected by: Teresa

on this date: 6-30-16

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed		Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth	
1	0	0	0	0		0	63	0	0	
2	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	
3	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	
4	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	
5	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	
6	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	
7	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	
8	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	
9	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	
10	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	

Robel Pole:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
S	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
W	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

All ~2-3

Categories: 0 - absent 1 - trace 3 - trace-5% 16 - 5%-25% 38 - 25%-50% 63 - 50%-75% 86 - 75%-95% 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material), Litter Depth - to nearest .25 cm