

Daubenmire Datasheet

Date: 8/14/17

Observer: ton / nancy

Recorder: ton

Team lead: ton / sydney

Site: arm2
Transect: tarm2a
Round: 3
100m

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed	Common ramet #	Swamp ramet #	Butterfly ramet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	38	16	38	Ø				Ø	3	86	1
10 m	38	16	16	Ø				Ø	Ø	98	3
20 m	38	16	16	Ø				Ø	Ø	86	5
30 m	43	16	16	Ø				Ø	16	63	1
40 m	86	16	16	Ø				Ø	1	38	1
50 m	38	16	38	Ø				Ø	16	63	6
60 m	38	38	38	Ø				Ø	16	38	6
70 m	38	38	38	Ø				Ø	16	38	7
80 m	16	16	43	Ø				Ø	16	38	3
90 m	43	38	3	Ø				Ø	16	38	2

mowed residue (SRA)

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
E	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4
S	4	5	4	3	4	4	4	4	3	4
W	3	9	4	3	5	4	5	3	4	5

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm