Daubenmire Datasheet

Date: 7/13/17
Observer: Kelsey
Recorder: Kelainy
Team lead: Kelainy

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed	Common ramet #	Swamp ramet #	Butterfly ramet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	3	16	16	0	0	0	0	0	16	38	0.5
10 m	3	16	16	0	0	0	0	0	0	86	0.5
20 m	1	16	38	3	2	0	0	0	16	63	0.5
30 m	1	16	38	0	0	0	3	0	3	63	0.25
40 m	3	38	16	16	3	0	0	0	0	63	2.0
50 m	1	16	16	0	0	0	0	0	3	63	2.0
60 m	16	16	16	0	0	0	0	0	3	63	1.5
70 m	38	0	38	0	0	0	0	0	1	63	0.25
80 m	16	16	16	16	4	0	0	0	1	63	0.5
90 m	38	3	16	0	0	0	0	0	16	38	0.25

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	2	2	2	2	1	3	2	2	2	1
E	2	2	1	2	1	2	2	2	3	2
S	2	1	2	1	1	3	2	2	1	2
W	2	1	2	1	1	4	1	1	3	2

Categories: 0 – absent | 1 – trace | 3 – trace-5% | 16 – 5%-25% | 38 – 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%
CSG - cool season grasses (including sedges)
WSG - warm season grasses
Forbs - forbs not including milkweed
Wood - woody cover
Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies
Leaf Litter (horizontal dead material)
Litter Depth - to nearest .25 cm