

2) `> branch_data <- read.table("Exercise.txt", header = TRUE, sep = ",")`


3)

4)

```
> boxplot(branch_data$Sales_X1, main="Box plot for Sales", outline=TRUE, outpch=8, horizontal= TRUE)
```

```
> |
+   return("Numeric (Ratio Scale)")
+ } else if (is.factor(x) || is.character(x)) {
+   return("categorical (Nominal Scale)")
+ } else {
+   return("other")
+ }
+ }
> sapply(branch_data, check_variable)
      Branch      Sales_X1 Advertising_X2
"Numeric (Ratio Scale)" "Numeric (Ratio Scale)" "Numeric (Ratio Scale)"
      Years_X3
"Numeric (Ratio Scale)"
> |
```

Box plot for Sales



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

5)

```
> summary(branch_data$Branch)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  1.00   8.25   15.50   15.50  22.75   30.00
> summary(branch_data$Sales_X1)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 2.500   3.125   3.850   3.790   4.375   5.100
> summary(branch_data$advertising_X2)
Length Class  Mode
 0      NULL  NULL
> summary(branch_data$Years_X3)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  1.00   3.25   5.50   5.70   7.75   12.00
> IQR(branch_data$Branch)
[1] 14.5
> IQR(branch_data$Sales_X1)
[1] 1.25
> IQR(branch_data$advertising_X2)
[1] NA
> IQR(branch_data$Years_X3)
[1] 4.5
> |
```

6)

```

> get.outliers(branch_data$Branch)
[1] "Upper bound = 44.5"
[1] "Lower bound = -13.5"
[1] "Outliners = ,"
> get.outliers(branch_data$Sales_X1)
[1] "Upper bound = 6.25"
[1] "Lower bound = 1.25"
[1] "Outliners = ,"
> get.outliers(branch_data$advertising_X2)
[1] "Upper bound = NA"
[1] "Lower bound = NA"
[1] "Outliners = ,"
> get.outliers(branch_data$Years_X3)
[1] "Upper bound = 14.5"
[1] "Lower bound = -3.5"
[1] "Outliners = ,"
> get.outliers<-function(z){
+   q1<-quantile(z)[2]
+   q3<-quantile(z)[4]
+   iqr<- q3-q1
+
+   ub <-q3+1.5*iqr
+   lb <-q1-1.5*iqr
+
+   print(paste("Upper bound = ",ub))
+   print(paste("Lower bound = ",lb))
+   print(paste("Outliners = ",paste(sort(z[z<lb | z>ub]),collapes=",")))
+ }
> get.outliers(branch_data$Branch)
[1] "Upper bound = 44.5"
[1] "Lower bound = -13.5"
[1] "Outliners = ,"
> get.outliers(branch_data$Sales_X1)
[1] "Upper bound = 6.25"
[1] "Lower bound = 1.25"
[1] "Outliners = ,"
> get.outliers(branch_data$advertising_X2)
[1] "Upper bound = NA"
[1] "Lower bound = NA"
[1] "Outliners = ,"

```

```
[1] "Outliers = ",  
> get.outliers(branch_data$Sales_X1)  
[1] "Upper bound = 6.25"  
[1] "Lower bound = 1.25"  
[1] "Outliers = ",  
> get.outliers(branch_data$advertising_X2)  
[1] "Upper bound = NA"  
[1] "Lower bound = NA"  
[1] "Outliers = ",  
> get.outliers(branch_data$Years_X3)  
[1] "Upper bound = 14.5"  
[1] "Lower bound = -3.5"  
[1] "Outliers = ",  
> |
```