

ANÁLISIS DEL ABSENTISMO LABORAL

Comportamiento social y factores de riesgo — RapidExpress · People Analytics

Daniel Nuez · Cristina Melgosa

1. Introducción

Este informe analiza el absentismo laboral en RapidExpress identificando patrones asociados al consumo social de alcohol y tabaco y a los antecedentes disciplinarios.

A diferencia de enfoques tradicionales, incorpora modelización estadística para cuantificar el efecto de cada factor controlando variables de perfil como edad, IMC y antigüedad.

El objetivo es orientar acciones preventivas basadas en evidencia.

2. Distribución del absentismo

El dataset comprende 1.056 registros clasificados en cuatro niveles: Sin ausencia, Baja (1–8h), Media (9–24h) y Alta (>24h).

La distribución es muy asimétrica: el 84.4% de los registros corresponde al nivel Baja, mientras que los niveles Media y Alta representan solo el 9.9% combinado.

Este desbalance justifica la aplicación de técnicas de corrección de clases en el modelo para evitar infraestimar los niveles más críticos de absentismo.

3. Factores de comportamiento

Consumo de alcohol

Es el factor con mayor asociación al absentismo de mayor duración.

Los bebedores sociales registran una media de 8.6h frente a 6.8h de los no bebedores, y presentan mayor presencia en el nivel Media (7.9% vs 2.2%).

El modelo confirma un OR de 2.06 en ausencias medias y 1.40 en ausencias prolongadas, una vez controladas las variables de perfil.

Consumo de tabaco

Presenta un patrón diferenciado:

Mayor presencia en ausencias de corta duración (OR Baja: 1.72) y menor en ausencias prolongadas (OR Alta: 0.68).

Este comportamiento sugiere una posible asociación con ausencias leves y recurrentes, aunque no con absentismo de mayor gravedad.

Falta disciplinaria

Muestra un OR muy elevado en el nivel Sin ausencia.

Este comportamiento podría indicar una posible infrarrepresentación de las ausencias en este grupo, por lo que los resultados deben interpretarse con cautela, especialmente debido al tamaño reducido de la muestra.

4. Perfil de riesgo

El perfil de mayor riesgo identificado es el empleado bebedor social sin falta disciplinaria.

Representa el 52.9% del dataset (559 registros) y presenta una mayor presencia relativa en niveles medios y altos de absentismo.

El modelo predice para este grupo una probabilidad significativamente superior de ausencias medias en comparación con los no bebedores.

Actuar sobre este perfil permite focalizar las acciones preventivas en un segmento relevante de la plantilla.

5. Recomendaciones

Se proponen tres líneas de actuación principales:

- Prevención del consumo de alcohol mediante la promoción de hábitos saludables
- Seguimiento del absentismo de corta duración para detectar patrones tempranos
- Fomento de una cultura de bienestar que integre prácticas saludables en el entorno laboral

Estas acciones permiten abordar el absentismo desde un enfoque preventivo y orientado a la mejora del bienestar laboral.

6. Conclusión

El análisis muestra que el consumo de alcohol es el factor más claramente asociado al incremento del absentismo de mayor duración.

El tabaco presenta un impacto más limitado, centrado en ausencias de corta duración.

Algunas variables, como la falta disciplinaria, requieren una interpretación prudente debido a las características de los datos.

En conjunto, los resultados permiten orientar estrategias de prevención basadas en evidencia, priorizando aquellas con mayor potencial de impacto en la organización.