

ANÁLISIS DEL ABSENTISMO LABORAL

Autores:

Daniel Nuez

Cristina Melgosa

1. Introducción

El presente informe analiza el comportamiento del absentismo laboral en la empresa RapidExpress con el objetivo de identificar su magnitud, las principales causas y los patrones temporales asociados a las ausencias. El análisis se basa en los registros de horas de ausencia de los trabajadores, así como en su distribución por causa médica, mes, estación del año y día de la semana.

Comprender estos patrones permite evaluar el impacto del absentismo en la actividad operativa de la empresa y detectar posibles áreas de mejora en la gestión de recursos humanos.

2. Magnitud del absentismo

Durante el periodo analizado se registraron 5.043 horas totales de ausencia frente a un total de 75.168 horas laborables, lo que supone una tasa global de absentismo del 6,71 %.

Este valor se sitúa dentro de los niveles habituales observados en sectores intensivos en trabajo físico como el transporte o la logística, donde las tasas de absentismo suelen situarse aproximadamente entre el 5 % y el 7 %. No obstante, incluso tasas moderadas pueden tener un impacto relevante en la operativa diaria cuando las ausencias se concentran en determinados periodos o causas específicas.

El análisis de la duración de las ausencias muestra una distribución desigual. La mediana de horas de ausencia se sitúa en 3 horas, lo que indica que la mayoría de las bajas son de corta duración. Sin embargo, la media alcanza las 7,14 horas, lo que refleja la existencia de algunas ausencias prolongadas que incrementan el promedio. El valor máximo registrado alcanza 120 horas de ausencia, lo que evidencia que un número reducido de casos puede generar una parte significativa del impacto total.

3. Causas del absentismo

El análisis de las causas médicas muestra que los trastornos musculoesqueléticos constituyen el principal origen de las horas de ausencia. Esta categoría presenta el mayor volumen de horas acumuladas y destaca especialmente durante los meses de marzo, abril y junio, donde se registran los picos más elevados.

Las lesiones e intoxicaciones también representan una causa relevante de absentismo, especialmente durante el primer semestre del año. Por su parte, las consultas médicas generales presentan una distribución más uniforme a lo largo del periodo analizado, con un ligero incremento hacia los últimos meses.

Las consultas dentales y las enfermedades digestivas muestran valores más moderados en comparación con las categorías anteriores, aunque presentan variaciones puntuales según el momento del año.

En conjunto, los resultados indican que una parte significativa del absentismo está asociada a afecciones físicas relacionadas con el esfuerzo o la carga laboral, lo que sugiere la posible influencia de factores ergonómicos y de condiciones de trabajo.

4. Distribución temporal anual

El análisis de la evolución del absentismo a lo largo del año muestra la existencia de patrones estacionales. A nivel de estaciones, el invierno registra el mayor volumen de horas de ausencia.

A nivel mensual se identifican picos de absentismo en marzo y julio, meses en los que se concentra un mayor volumen de horas perdidas. Este comportamiento indica que el absentismo no se distribuye de forma homogénea durante el año y presenta momentos de mayor incidencia claramente identificables.

5. Distribución semanal

El análisis por día de la semana muestra que las ausencias también presentan variaciones dentro de la semana laboral.

Las lesiones presentan una mayor incidencia al inicio de la semana, especialmente el lunes, mientras que las afecciones musculoesqueléticas muestran un pico muy marcado a mitad de semana, destacando especialmente el miércoles.

Las consultas médicas generales mantienen una distribución relativamente estable durante la semana, mientras que las consultas dentales tienden a concentrarse hacia los últimos días. Por su parte, las enfermedades digestivas presentan mayor presencia en los primeros días de la semana.

6. Conclusión

El absentismo en RapidExpress presenta una tasa moderada del 6,71 %, aunque con una distribución desigual en términos de duración, causas y momentos temporales. La mayoría de las ausencias son de corta duración, pero algunos casos prolongados generan un impacto significativo en el total de horas perdidas.

Los trastornos musculoesqueléticos destacan como la principal causa de absentismo, y el análisis temporal revela patrones claros tanto a lo largo del año como dentro de la semana laboral.

7. Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos se proponen las siguientes medidas:

- Implementar programas de prevención ergonómica orientados a reducir los trastornos musculoesqueléticos, incluyendo formación en higiene postural, pausas activas y revisión ergonómica de los puestos de trabajo.
- Revisar la planificación operativa al inicio de la semana y reforzar la organización de turnos para reducir el impacto de las ausencias que se concentran en determinados días.
- Planificar recursos adicionales o mecanismos de sustitución en los periodos del año con mayor incidencia de ausencias, especialmente en los meses donde se registran picos de absentismo.
- Establecer un sistema de seguimiento periódico de los indicadores de absentismo que permita detectar tendencias y anticipar posibles incrementos en las ausencias.