

з вищої математики

Тема: Матриці та дії над ними. Визначники. Системи лінійних рівнянь.

Викладач: доцент Воробйова А.І.,

Варіант 0.

1. Дано матриці A, B, C, D, E, F, K . Потрібно знайти:

- 1) Обчислити визначники: $\det A$, $\det B$, $\det C$, $\det D$, $\det K$.
- 2) Виконати дії над матрицями: а) $3A+2B$; б) $AB-BA$; в) $CD-DC$; г) EF ; д) FE ; е) EK ; є) KF .
- 3) Обчислити $f(A)$, $\varphi(C)$, $\varphi(K)$, якщо $f(x)=x^3-3x^2+4x+5$, $\varphi(x)=x^2-4x+2$.
- 4) Знайти обернену матрицю: а) A^{-1} ; б) B^{-1} ; в) C^{-1} ; г) D^{-1} ; д) K^{-1} .
- 5) Розв'язати матричні рівняння: а) $AX=B$; б) $XB=A$; в) $CX=D$.

Варіант	A	B	C	D	E	F	K
18	$\begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & 10 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & 4 \\ 4 & 10 & 4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 0 & -2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

1)

$$\det A = \det \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = (-3) \cdot (-1) - (-4) \cdot 0 = 3$$

$$\det B = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot 0 - 2 \cdot 1 = -2$$

$$\det C = \det \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & 10 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix} = 5 \cdot 10 \cdot 10 + 7 \cdot 8 \cdot 6 + 6 \cdot 7 \cdot 8 - 6 \cdot 10 \cdot 6 - 5 \cdot 8 \cdot 8 - 7 \cdot 7 \cdot 10 = 2$$

$$\det D = \det \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & 4 \\ 4 & 10 & 4 \end{pmatrix} = 3 \cdot 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 10 + 4 \cdot 3 \cdot 4 - 3 \cdot 3 \cdot 4 - 3 \cdot 4 \cdot 10 - 4 \cdot 3 \cdot 4 = 0$$

$$\det K = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot 5 \cdot (-3) \cdot 5 + 1 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 \cdot (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 3 -$$

$$-1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \cdot (-3) \cdot 3 - 5 \cdot (-1) \cdot 5 \cdot 2 - 0 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 = -58$$

2) Сумою двох матриць А і В називається матриця, обумовлена рівністю:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13}+b_{13} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & a_{23}+b_{23} \\ a_{31}+b_{31} & a_{32}+b_{32} & a_{33}+b_{33} \end{pmatrix}$$

Добутком числа m на матрицю А називається матриця, обумовлена рівністю

$$m \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ma_{11} & ma_{12} & ma_{13} \\ ma_{21} & ma_{22} & ma_{23} \\ ma_{31} & ma_{32} & ma_{33} \end{pmatrix}$$

Добуток двох матриць А і В позначається символом АВ і визначається рівністю

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^3 a_{1j}b_{j1} & \sum_{j=1}^3 a_{1j}b_{j2} & \sum_{j=1}^3 a_{1j}b_{j3} \\ \sum_{j=1}^3 a_{2j}b_{j1} & \sum_{j=1}^3 a_{2j}b_{j2} & \sum_{j=1}^3 a_{2j}b_{j3} \\ \sum_{j=1}^3 a_{3j}b_{j1} & \sum_{j=1}^3 a_{3j}b_{j2} & \sum_{j=1}^3 a_{3j}b_{j3} \end{pmatrix}$$

А)

$$3A+2B = 3 \cdot \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot (-3) + 2 \cdot 2 & 3 \cdot (-4) + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -10 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$$

Б)

$$AB - BA = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} (-3) \cdot 2 + (-4) \cdot 2 & (-3) \cdot 1 + (-4) \cdot 0 \\ 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 2 & 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \cdot (-3) + 1 \cdot 0 & 2 \cdot (-4) + 1 \cdot (-1) \\ 2 \cdot (-3) + 0 \cdot 0 & 2 \cdot (-4) + 0 \cdot (-1) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -14 & -3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -6 & -9 \\ -6 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 - (-6) & -3 - (-9) \\ -2 - (-6) & 0 - (-8) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

В)

$$CD - DC = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & 10 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & 4 \\ 4 & 10 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & 4 \\ 4 & 10 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & 10 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 5 \cdot 3 + 7 \cdot 4 + 6 \cdot 4 & 5 \cdot 3 + 7 \cdot 3 + 6 \cdot 10 & 5 \cdot 3 + 7 \cdot 4 + 6 \cdot 4 \\ 7 \cdot 3 + 10 \cdot 4 + 8 \cdot 4 & 7 \cdot 3 + 10 \cdot 3 + 8 \cdot 10 & 7 \cdot 3 + 10 \cdot 4 + 8 \cdot 4 \\ 6 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 10 \cdot 4 & 6 \cdot 3 + 8 \cdot 3 + 10 \cdot 10 & 6 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 10 \cdot 4 \end{pmatrix} - \\
&- \begin{pmatrix} 3 \cdot 5 + 3 \cdot 7 + 3 \cdot 6 & 3 \cdot 7 + 3 \cdot 10 + 3 \cdot 8 & 3 \cdot 6 + 3 \cdot 8 + 3 \cdot 10 \\ 4 \cdot 5 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 6 & 4 \cdot 7 + 3 \cdot 10 + 4 \cdot 8 & 4 \cdot 6 + 3 \cdot 8 + 4 \cdot 10 \\ 4 \cdot 5 + 10 \cdot 7 + 4 \cdot 6 & 4 \cdot 7 + 10 \cdot 10 + 4 \cdot 8 & 4 \cdot 6 + 10 \cdot 8 + 4 \cdot 10 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 67 & 96 & 67 \\ 93 & 131 & 93 \\ 90 & 142 & 90 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 54 & 75 & 72 \\ 65 & 90 & 88 \\ 114 & 160 & 144 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 67-54 & 96-75 & 67-72 \\ 93-65 & 131-90 & 93-88 \\ 90-114 & 142-160 & 90-144 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 21 & -5 \\ 28 & 41 & 5 \\ -24 & -18 & -54 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Г)

$$EF = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix} = (2 \cdot 4 + 7 \cdot 4 + 0 \cdot (-6) + (-2) \cdot 1) = (34)$$

Д)

$$FE = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 7 & 0 & -2 \end{pmatrix} = (4 \cdot 2 + 4 \cdot 7 + (-6) \cdot 0 + 1 \cdot (-2)) = (34)$$

Е)

$$\begin{aligned}
EK &= \begin{pmatrix} 2 & 7 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \\
&= (2 \cdot 1 + 7 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot 1 \quad 2 \cdot 3 + 7 \cdot 5 + 0 \cdot 2 + (-2) \cdot 2 \quad 2 \cdot 2 + 7 \cdot 1 + 0 \cdot (-3) + (-2) \cdot 3 \quad 2 \cdot 1 + 7 \cdot 3 + 0 \cdot 4 + (-2) \cdot 5) = \\
&= (0 \quad 37 \quad 5 \quad 13)
\end{aligned}$$

Є)

$$KF = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot (-6) + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 4 + 5 \cdot 4 + 1 \cdot (-6) + 3 \cdot 1 \\ (-1) \cdot 4 + 2 \cdot 4 + (-3) \cdot (-6) + 4 \cdot 1 \\ 1 \cdot 4 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-6) + 5 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 17 \\ 26 \\ -1 \end{pmatrix}$$

3)

А) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 5$

$$f(A) = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 5 =$$

$$x = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$x^2 = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3) \cdot (-3) + (-4) \cdot 0 & (-3) \cdot (-4) + (-4) \cdot (-1) \\ 0 \cdot (-3) + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 16 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x^3 = \begin{pmatrix} 9 & 16 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \cdot (-3) + 16 \cdot 0 & 9 \cdot (-4) + 16 \cdot (-1) \\ 0 \cdot (-3) + 1 \cdot 0 & 0 \cdot (-4) + 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -27 & -52 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$f(A) = x^3 - 3x^2 + 4x + 5 = \begin{pmatrix} -27 & -52 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} 9 & 16 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 5 =$$

$$= \begin{pmatrix} -27 - 3 \cdot 9 + 4 \cdot (-3) & -52 - 3 \cdot 16 + 4 \cdot (-4) \\ 0 - 3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 & -1 - 3 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) \end{pmatrix} + 5 = \begin{pmatrix} -66 & -116 \\ 0 & -8 \end{pmatrix} + 5$$

Б) $\varphi(x) = x^2 - 4x + 2$

$$\varphi(C) = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & 10 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & 10 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix} - 4 \cdot \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & 10 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix} + 2$$

$$x = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & 10 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix}$$

$$x^2 = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & 10 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & 10 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 5 + 7 \cdot 7 + 6 \cdot 6 & 5 \cdot 7 + 7 \cdot 10 + 6 \cdot 8 & 5 \cdot 6 + 7 \cdot 8 + 6 \cdot 10 \\ 7 \cdot 5 + 10 \cdot 7 + 8 \cdot 6 & 7 \cdot 7 + 10 \cdot 10 + 8 \cdot 8 & 7 \cdot 6 + 10 \cdot 8 + 8 \cdot 10 \\ 6 \cdot 5 + 8 \cdot 7 + 10 \cdot 6 & 6 \cdot 7 + 8 \cdot 10 + 10 \cdot 8 & 6 \cdot 6 + 8 \cdot 8 + 10 \cdot 10 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 110 & 153 & 146 \\ 153 & 213 & 202 \\ 146 & 202 & 200 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(C) = \begin{pmatrix} 110 & 153 & 146 \\ 153 & 213 & 202 \\ 146 & 202 & 200 \end{pmatrix} - 4 \cdot \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & 10 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix} + 2 = \begin{pmatrix} 110 - 4 \cdot 5 & 153 - 4 \cdot 7 & 146 - 4 \cdot 6 \\ 153 - 4 \cdot 7 & 213 - 4 \cdot 10 & 202 - 4 \cdot 8 \\ 146 - 4 \cdot 6 & 202 - 4 \cdot 8 & 200 - 4 \cdot 10 \end{pmatrix} + 2 =$$

$$= \begin{pmatrix} 90 & 125 & 122 \\ 125 & 173 & 170 \\ 122 & 170 & 160 \end{pmatrix} + 2$$

Б) $\varphi(x) = x^2 - 4x + 2$

$$\varphi(K) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} - 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} + 2$$

$$x = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$x^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot (-3) + 1 \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 5 \\ 0 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 & 0 \cdot 3 + 5 \cdot 5 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 2 & 0 \cdot 2 + 5 \cdot 1 + 1 \cdot (-3) + 3 \cdot 3 & 0 \cdot 1 + 5 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 3 \cdot 5 \\ (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-3) \cdot (-1) + 4 \cdot 1 & (-1) \cdot 3 + 2 \cdot 5 + (-3) \cdot 2 + 4 \cdot 2 & (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 1 + (-3) \cdot (-3) + 4 \cdot 3 & (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 3 + (-3) \cdot 4 + 4 \cdot 5 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) + 5 \cdot 1 & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-3) + 5 \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 5 \cdot 5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 24 & 2 & 23 \\ 2 & 33 & 11 & 34 \\ 6 & 9 & 21 & 13 \\ 3 & 29 & 10 & 44 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(K) = \begin{pmatrix} 0 & 24 & 2 & 23 \\ 2 & 33 & 11 & 34 \\ 6 & 9 & 21 & 13 \\ 3 & 29 & 10 & 44 \end{pmatrix} - 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} + 2 =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 - 4 \cdot 1 & 24 - 4 \cdot 3 & 2 - 4 \cdot 2 & 23 - 4 \cdot 1 \\ 2 - 4 \cdot 0 & 33 - 4 \cdot 5 & 11 - 4 \cdot 1 & 34 - 4 \cdot 3 \\ 6 - 4 \cdot (-1) & 9 - 4 \cdot 2 & 21 - 4 \cdot (-3) & 13 - 4 \cdot 4 \\ 3 - 4 \cdot 1 & 29 - 4 \cdot 2 & 10 - 4 \cdot 3 & 44 - 4 \cdot 5 \end{pmatrix} + 2 =$$

$$= \begin{pmatrix} -4 & 12 & -6 & 19 \\ 2 & 13 & 7 & 22 \\ 10 & 1 & 33 & -3 \\ -1 & 21 & -2 & 24 \end{pmatrix} + 2$$

4) Знайти обернену матрицю: а) A^{-1} ; б) B^{-1} ; в) C^{-1} ; г) D^{-1} ; д) K^{-1} .

Матриця, обернена матриці A , позначається через A^{-1} . Обернена матриця обчислюється по формулі:

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

де A_{ij} - алгебраїчні доповнення елементів a_{ij} .

A)

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 3$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot (-1) = -1; \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot 0 = 0; \quad A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot (-4) = 4; \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot (-3) = -3$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Б)

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det B = -2$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \cdot 0 = 0; \quad B_{12} = (-1)^{1+2} \cdot 2 = -2; \quad B_{21} = (-1)^{2+1} \cdot 1 = -1; \quad B_{22} = (-1)^{2+2} \cdot 2 = 2$$

$$B^{-1} = \frac{1}{-2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

В)

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & 10 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\det C = 2$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 10 & 8 \\ 8 & 10 \end{vmatrix} = 36; \quad C_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 10 \end{vmatrix} = -22; \quad C_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 7 & 10 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = -4;$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 7 & 6 \\ 8 & 10 \end{vmatrix} = -22; \quad C_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 10 \end{vmatrix} = 14; \quad C_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = 2;$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 7 & 6 \\ 10 & 8 \end{vmatrix} = -4; \quad C_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 2; \quad C_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 7 & 10 \end{vmatrix} = 1$$

$$C^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 36 & -22 & -4 \\ -22 & 14 & 2 \\ -4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 & -11 & -2 \\ -11 & 7 & 1 \\ -2 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Г)

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & 4 \\ 4 & 10 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det D = 0$$

D^{-1} - не існує.

Д)

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\det K = -58$$

$$K_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -101; K_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & -3 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -9; K_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 5 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 33;$$

$$K_{14} = (-1)^{1+4} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 4; K_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 73; K_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -3 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -9;$$

$$K_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = -25; K_{24} = (-1)^{2+4} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 4; K_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -37;$$

$$K_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -1; K_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 23; K_{34} = (-1)^{3+4} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -6;$$

$$K_{41} = (-1)^{4+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{vmatrix} = 6; K_{42} = (-1)^{4+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & -3 & 4 \end{vmatrix} = 8; K_{43} = (-1)^{4+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -10;$$

$$K_{44} = (-1)^{4+4} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = -10$$

$$K^{-1} = \frac{1}{-58} \cdot \begin{pmatrix} -101 & 73 & -37 & 6 \\ -9 & -9 & -1 & 8 \\ 33 & -25 & 23 & -10 \\ 4 & 4 & -6 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{101}{58} & -\frac{73}{58} & \frac{37}{58} & -\frac{6}{58} \\ \frac{9}{58} & \frac{9}{58} & \frac{1}{58} & -\frac{8}{58} \\ -\frac{33}{58} & \frac{25}{58} & -\frac{23}{58} & \frac{10}{58} \\ -\frac{4}{58} & -\frac{4}{58} & \frac{6}{58} & \frac{10}{58} \end{pmatrix}$$

5) Розв'язати матричне рівняння: а) $AX=B$; б) $XB=A$; в) $CX=D$.

А) $AX=B \rightarrow X=A^{-1}B$

$$\begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X_{11} & X_{21} \\ X_{12} & X_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} X_{11} & X_{21} \\ X_{12} & X_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{4}{3} \cdot 2 & -\frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{4}{3} \cdot 0 \\ 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 2 & 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{3} \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Б)

$$X B = A \rightarrow X = A B^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} X_{11} & X_{21} \\ X_{12} & X_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} X_{11} & X_{21} \\ X_{12} & X_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3) \cdot 0 + (-4) \cdot 1 & (-3) \cdot \frac{1}{2} + (-4) \cdot (-1) \\ 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 & 0 \cdot \frac{1}{2} + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & \frac{5}{2} \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

B)

$$C X = D \rightarrow X = C^{-1} D$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & 10 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & X_{13} \\ X_{21} & X_{22} & X_{23} \\ X_{31} & X_{32} & X_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & 4 \\ 4 & 10 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & X_{13} \\ X_{21} & X_{22} & X_{23} \\ X_{31} & X_{32} & X_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 & -11 & -2 \\ -11 & 7 & 1 \\ -2 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & 4 \\ 4 & 10 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 18 \cdot 3 + (-11) \cdot 4 + (-2) \cdot 4 & 18 \cdot 3 + (-11) \cdot 3 + (-2) \cdot 10 & 18 \cdot 3 + (-11) \cdot 4 + (-2) \cdot 4 \\ (-11) \cdot 3 + 7 \cdot 4 + 1 \cdot 4 & (-11) \cdot 3 + 7 \cdot 3 + 1 \cdot 10 & (-11) \cdot 3 + 7 \cdot 4 + 1 \cdot 4 \\ (-2) \cdot 3 + 1 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 4 & (-2) \cdot 3 + 1 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 10 & (-2) \cdot 3 + 1 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Обчислити детермінант:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 5 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 2 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 6 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 15 \end{vmatrix}$$

Проведемо тотожні перетворення:

Віднімаємо з рядка 2 рядок 1 помножену на $\frac{a_{21}}{a_{11}} = -\frac{1}{5}$, з рядка 3 рядок 1 помножену

на $\frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{4}{5}$, з рядка 4 рядок 1 помножену на $\frac{a_{41}}{a_{11}} = \frac{2}{5}$, з рядка 5 рядок 1 помножену

на $\frac{a_{51}}{a_{11}} = \frac{8}{5}$, одержуємо:

$$\left| \begin{array}{ccccc} 5 & 5 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 2 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 6 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 15 \end{array} \right| \rightarrow \left| \begin{array}{ccccc} 5 & 5 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{17}{5} & \frac{17}{5} & \frac{16}{5} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{19}{5} \\ 0 & -1 & \frac{16}{5} & \frac{21}{5} & \frac{28}{5} \\ 0 & 1 & \frac{34}{5} & \frac{39}{5} & \frac{67}{5} \end{array} \right|$$

Оскільки на головній діагоналі 0, міняємо місцями рядка 2 і 4:

$$\left| \begin{array}{ccccc} 5 & 5 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{17}{5} & \frac{17}{5} & \frac{16}{5} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{19}{5} \\ 0 & -1 & \frac{16}{5} & \frac{21}{5} & \frac{28}{5} \\ 0 & 1 & \frac{34}{5} & \frac{39}{5} & \frac{67}{5} \end{array} \right| \rightarrow \left| \begin{array}{ccccc} 5 & 5 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & \frac{16}{5} & \frac{21}{5} & \frac{28}{5} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{19}{5} \\ 0 & 0 & \frac{17}{5} & \frac{17}{5} & \frac{16}{5} \\ 0 & 1 & \frac{34}{5} & \frac{39}{5} & \frac{67}{5} \end{array} \right|$$

Віднімаємо з рядка 5 рядок 2 помножену на $\frac{a_{52}}{a_{22}} = -1$:

$$\left| \begin{array}{ccccc} 5 & 5 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & \frac{16}{5} & \frac{21}{5} & \frac{28}{5} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{19}{5} \\ 0 & 0 & \frac{17}{5} & \frac{17}{5} & \frac{16}{5} \\ 0 & 1 & \frac{34}{5} & \frac{39}{5} & \frac{67}{5} \end{array} \right| \rightarrow \left| \begin{array}{ccccc} 5 & 5 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{16}{5} & -\frac{21}{5} & -\frac{28}{5} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{19}{5} \\ 0 & 0 & \frac{17}{5} & \frac{17}{5} & \frac{16}{5} \\ 0 & 0 & 10 & 12 & 19 \end{array} \right|$$

Віднімаємо з рядка 4 рядок 3 помножену на $\frac{a_{43}}{a_{33}} = \frac{17}{2}$, віднімаємо з рядка 5 рядок 3

помножену на $\frac{a_{53}}{a_{33}} = 25$

$$\left| \begin{array}{ccccc} 5 & 5 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & \frac{16}{5} & \frac{21}{5} & \frac{28}{5} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{19}{5} \\ 0 & 0 & \frac{17}{5} & \frac{17}{5} & \frac{16}{5} \\ 0 & 0 & 10 & 12 & 19 \end{array} \right| \square \left| \begin{array}{ccccc} 5 & 5 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{16}{5} & -\frac{21}{5} & -\frac{28}{5} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{19}{5} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{17}{2} & \frac{71}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 27 & 114 \end{array} \right|$$

Віднімаємо з рядка 5 рядок 4 помножену на $\frac{a_{54}}{a_{44}} = \frac{54}{17}$:

$$\left| \begin{array}{ccccc} 5 & 5 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & \frac{16}{5} & \frac{21}{5} & \frac{28}{5} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{19}{5} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{17}{2} & \frac{71}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 27 & 114 \end{array} \right| \square \left| \begin{array}{ccccc} 5 & 5 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{16}{5} & -\frac{21}{5} & -\frac{28}{5} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{19}{5} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{17}{2} & \frac{71}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{21}{17} \end{array} \right|$$

Одержали діагональну матрицю, визначник якої дорівнює добутку елементів головної діагоналі:

$$\Delta = 5 \cdot 1 \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{17}{2} \cdot \frac{21}{17} = 21$$

3. Розв'язати матричне рівняння.

$$X \cdot A = B \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X \cdot A = B \Rightarrow X = B \cdot A^{-1}$$

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= 1 \cdot (-1) \cdot 2 + (-2) \cdot 2 \cdot 3 + (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) - (-2) \cdot (-1) \cdot (-1) - 1 \cdot 3 \cdot (-1) - 2 \cdot (-1) \cdot 2 = -6$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1; \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -3; \quad A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 5;$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -4; \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 0; \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -2;$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -1; \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3; \quad A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -4 & -1 \\ -3 & 0 & -3 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = B \cdot A^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & X_{13} \\ X_{21} & X_{22} & X_{23} \\ X_{31} & X_{32} & X_{33} \end{pmatrix} = -\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -4 & -1 \\ -3 & 0 & -3 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-3) + (-1) \cdot 5 & (-1) \cdot (-4) + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot (-2) & (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot (-3) + (-1) \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 + (-1) \cdot (-3) + 2 \cdot 5 & 3 \cdot (-4) + (-1) \cdot 0 + 2 \cdot (-2) & 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-3) + 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-3) + 1 \cdot 5 & 2 \cdot (-4) + 2 \cdot 0 + 1 \cdot (-2) & 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -9 & 6 & -3 \\ 16 & -16 & 2 \\ 1 & -10 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{6} & -\frac{6}{6} & \frac{3}{6} \\ -\frac{16}{6} & \frac{16}{6} & -\frac{2}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{10}{6} & \frac{7}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ -\frac{8}{3} & \frac{8}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{5}{3} & \frac{7}{6} \end{pmatrix}$$

4. Розв'язати систему рівнянь матричним способом:

$$\begin{cases} 2x + 3y - 2z = 15 \\ x - 3y + z = -8 \\ 3x - 2y + 5z = -5 \end{cases}$$

Представимо у вигляді матричного рівняння:

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ -8 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Розв'язок матричного рівняння має вигляд: $X = A^{-1}B$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 2 \cdot (-3) \cdot 5 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-2) \cdot 1 \cdot (-2) - (-2) \cdot (-3) \cdot 3 - 3 \cdot 1 \cdot 5 - 1 \cdot 2 \cdot (-2) = -46$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = -13; A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -2; A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 7;$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = -11; A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 16; A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 13;$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -3; A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -4; A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -9$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{46} \cdot \begin{pmatrix} -13 & -11 & -3 \\ -2 & 16 & -4 \\ 7 & 13 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= -\frac{1}{46} \cdot \begin{pmatrix} -13 & -11 & -3 \\ -2 & 16 & -4 \\ 7 & 13 & -9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 15 \\ -8 \\ -5 \end{pmatrix} = \\
 &= -\frac{1}{46} \cdot \begin{pmatrix} (-13) \cdot 15 + (-11) \cdot (-8) + (-3) \cdot (-5) \\ (-2) \cdot 15 + 16 \cdot (-8) + (-4) \cdot (-5) \\ 7 \cdot 15 + 13 \cdot (-8) + (-9) \cdot (-5) \end{pmatrix} = -\frac{1}{46} \cdot \begin{pmatrix} -92 \\ -138 \\ 46 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{92}{46} \\ \frac{138}{46} \\ -\frac{46}{46} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$x_1 = 2; \quad x_2 = 3; \quad x_3 = -1$$

5. Розв'язати систему лінійних рівнянь методом Крамера:

$$\begin{cases} 2x + 3y + z + 3u = 3 \\ 3x + 2y - 5z + 2u = 24 \\ 4x + 2y - 6z + 5u = 18 \\ 7x - 4y + 6z + 3u = -25 \end{cases}$$

Метод Крамера полягає в знаходженні розв'язку системи лінійних рівнянь по

формулах: $x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}$; $x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$; $x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}$; ...; $x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$;

Де: Δ - визначник матриці коефіцієнтів системи рівнянь, $\Delta_1; \Delta_2; \Delta_3; \dots; \Delta_n$ - визначники матриць коефіцієнтів системи рівнянь, у яких відповідні стовпці замінені на стовпець вільних членів.

Для нашої системи рівнянь:

$$\begin{aligned}
 \Delta &= \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -5 & 2 \\ 4 & 2 & -6 & 5 \\ 7 & -4 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot (-6) \cdot 3 + 3 \cdot (-5) \cdot 5 \cdot 7 + 3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 3 + 4 \cdot (-4) \cdot 1 \cdot 2 - \\
 &\quad - 7 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot 3 - 4 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 - 2 \cdot (-4) \cdot (-6) \cdot 2 - 3 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 5 = 519
 \end{aligned}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 1 & 3 \\ 24 & 2 & -5 & 2 \\ 18 & 2 & -6 & 5 \\ -25 & -4 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot (-6) \cdot 3 + 3 \cdot (-5) \cdot 5 \cdot (-25) + 24 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 3 + 18 \cdot (-4) \cdot 1 \cdot 2 -$$

$$-(-25) \cdot 2 \cdot (-5) \cdot 3 - 18 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 - 3 \cdot (-4) \cdot (-6) \cdot 2 - 24 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 5 = 1557$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 24 & -5 & 2 \\ 4 & 18 & -6 & 5 \\ 7 & -25 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 24 \cdot (-6) \cdot 3 + 3 \cdot (-5) \cdot 5 \cdot 7 + 3 \cdot 18 \cdot 6 \cdot 3 + 4 \cdot (-25) \cdot 1 \cdot 2 -$$

$$-7 \cdot 18 \cdot (-5) \cdot 3 - 4 \cdot 24 \cdot 1 \cdot 3 - (-25) \cdot (-6) \cdot 2 \cdot 2 - 3 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 5 = 2076$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 24 & 2 \\ 4 & 2 & 18 & 5 \\ 7 & -4 & -25 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot 18 \cdot 3 + 3 \cdot 24 \cdot 5 \cdot 7 + 3 \cdot 2 \cdot (-25) \cdot 3 + 4 \cdot (-4) \cdot 3 \cdot 2 -$$

$$-7 \cdot 2 \cdot 24 \cdot 3 - 4 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 - (-4) \cdot 18 \cdot 2 \cdot 2 - 3 \cdot 3 \cdot (-25) \cdot 5 = -1557$$

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -5 & 24 \\ 4 & 2 & -6 & 18 \\ 7 & -4 & 6 & -25 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot (-6) \cdot (-25) + 3 \cdot (-5) \cdot 18 \cdot 7 + 3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 3 + 4 \cdot (-4) \cdot 1 \cdot 24 -$$

$$-7 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot 3 - 4 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (-25) - (-4) \cdot (-6) \cdot 24 \cdot 2 - 3 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 18 = -2076$$

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{1557}{519} = 3; x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{2076}{519} = 4; x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-1557}{519} = -3; x_4 = \frac{\Delta_4}{\Delta} = \frac{-2076}{519} = -4;$$

6. Розв'язати систему лінійних рівнянь. Визначити загальний і дві часток розв'язку системи лінійних рівнянь.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 5x_5 = -1 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 3 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 - x_5 = 5 \\ 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 + 4x_4 - 6x_5 = 7 \end{cases}$$

Розв'яжемо систему методом Гаусса:

Визначимо спільність системи рівнянь. По теоремі Кронекера-Копелли для того, що б система лінійних алгебраїчних рівнянь була сумісна (мала розв'язок), необхідно й досить, що б ранг основної матриці:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 4 & -3 & -1 \\ 3 & -2 & 7 & 4 & -6 \end{pmatrix}$$

і ранг розширеної матриці

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & -4 & 5 & -1 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & -1 & 4 & -3 & -1 & 5 \\ 3 & -2 & 7 & 4 & -6 & 7 \end{pmatrix}$$

були рівні.

Тому що $\text{rang}(A) = 5$ рівний $\text{rang}(B) = 5$ і дорівнює кількості невідомих $n = 5$, то система має єдиний розв'язок.

Приведемо розширену матрицю до трикутного виду, тобто до такого виду, при якому всі елементи нижче головної діагоналі рівні 0.

Віднімемо 1 рядок від нижніх рядків так, щоб в 1 стовпці всі нижчестоящі елементи звернулися в 0, домножая на 1, 5, 2, 3, відповідно:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & -4 & 5 & -1 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & -1 & 4 & -3 & -1 & 5 \\ 3 & -2 & 7 & 4 & -6 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 2 & -5 & -3 & 5 \\ 0 & -5 & 4 & 1 & -9 & 7 \end{pmatrix}$$

Віднімемо 2 рядок від нижніх рядків так, щоб в 2 стовпці всі нижчестоящі елементи звернулися в 0, домножая на -1, -3, -5, відповідно:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 2 & -5 & -3 & 5 \\ 0 & -5 & 4 & 1 & -9 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -20 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 14 & -24 & 11 & 2 \end{pmatrix}$$

Тому що елемент в 3-ій рядку й 3-ом стовпці рівний 0, то поміняємо місцями 3-ю й 4-ю рядки:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -20 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 14 & -24 & 11 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -20 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 14 & -24 & 11 & 2 \end{pmatrix}$$

Розділимо 3 рядок на 8, щоб елемент в 3 стовпці й в 3 рядку став рівний 1:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -20 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 14 & -24 & 11 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{9}{8} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 14 & -24 & 11 & 2 \end{pmatrix}$$

Віднімемо 3 рядок від нижніх рядків так, щоб в 3 стовпці всі нижчестоящі елементи звернулися в 0, домножая на 0, 14, відповідно:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{9}{8} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 14 & -24 & 11 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{9}{8} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 11 & -\frac{19}{4} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Розділимо 4 рядок на, що б елемент в 4 стовпці й в 4 рядку став рівний 1:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{9}{8} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 11 & -\frac{19}{4} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{9}{8} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 11 & -\frac{19}{4} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Віднімемо 4 рядок від нижніх рядків так, що б в 4 стовпці всі нижчестоящі елементи звернулися в 0, домножая на 11, соответственно:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{9}{8} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 11 & -\frac{19}{4} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{9}{8} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5}{8} & \frac{5}{4} \end{pmatrix}$$

Розділимо в 5 рядку елементи в 5 і 6 стовпцях на елемент в 5 стовпці:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{9}{8} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5}{8} & \frac{5}{4} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{9}{8} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

На цьому кроці можна завершити перетворення матриці, але для полегшення розрахунків приведемо матрицю до такого виду, що б елементи й над головною діагоналлю звернулися в 0.

Віднімемо 5 рядок з вищих, що б елементи 5 стовпці звернулися в 0, домножая на $-\frac{3}{8}$, $\frac{9}{8}$, 4 , 1 , відповідно:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{9}{8} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Відніmemo 4 рядок з вищих, що б елементи 4 стовпці звернулися в 0, домножая на $-\frac{5}{2}$, -5 , 1 , відповідно:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Відніmemo 3 рядок з вищих, що б елементи 3 стовпці звернулися в 0, домножая на 2 , 1 , відповідно:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Відніmemo 2 рядок з вищих, що б елементи 2 стовпці звернулися в 0, домножая на 1 , відповідно:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Елементи, що перебувають в 6 стовпці і є розв'язок системи рівнянь: $x_1 = 1$; $x_2 = 2$; $x_3 = 0$; $x_4 = -1$; $x_5 = -2$