

# Aula 5 - Definições de limites e Teorema do sanduiche

Muller Moreira S Lopes


Universidade Federal do Rio Grande do Norte

23 de agosto de 2023

# Limite - Definição formal

Dado uma função  $f(x)$  definida em um intervalo aberto que contenha um ponto  $x = a$ , exceto (possivelmente) no ponto  $a$ .

- Valor Limite:  $L$ .
- Tolerância:  $\epsilon$ .



Obs:

- a afirmação "exceto (possivelmente) no ponto  $a$ " quer dizer que  $a$  pode ser "bolinha tanto aberta quanto fechada" no intervalo.

# Limite - Definição formal


$L$  é o valor limite de  $f(a)$  quando  $x \rightarrow a$  se, para qualquer tolerância  $\epsilon > 0$ , for possível encontrar um valor  $\delta > 0$  tal que:

Se:


$$0 < |x - a| < \delta$$

Então:

$$|f(x) - L| < \epsilon$$



- A idéia é determinar algum sub-intervalo de  $(a - \delta, a + \delta)$  em que todos os valores  $f(x)$  da imagem estejam entre  $(L - \epsilon, L + \epsilon)$ .
- O intervalo  $(a - \delta_1, a + \delta_1)$  não precisa ser o maior possível.



# Como verificar um limite usando a definição formal

- Assumir um valor  $\epsilon > 0$  genérico.
- Encontrar algum valor  $\delta$  em função de  $\epsilon$  tal que, se:

$$0 < |x - a| < \delta$$

Então:

$$|f(x) - L| < \epsilon$$

# Exemplo 1

Usar a definição de limites para provar que

$$\lim_{x \rightarrow 4} (3x - 5) = 7$$

# Exemplo 1

- Assumir um valor  $\epsilon$  genérico.
- Tomando a tolerância em  $\epsilon$ :

$$|f(x) - L| < \epsilon$$

$$|(3x - 5) - 7| < \epsilon$$

$$|3x - 12| < \epsilon$$

# Exemplo 1

- Assumir um valor  $\epsilon$  genérico.
- Tomando a tolerância em  $\epsilon$ :

$$|f(x) - L| < \epsilon$$

$$|(3x - 5) - 7| < \epsilon$$

$$|3x - 12| < \epsilon$$



# Exemplo 1

- Como  $x \rightarrow 4$  neste exemplo, temos que extrair o termo  $|x - 4|$  nesta inequação:

$$|3x - 12| < \epsilon$$

$$|3(x - 4)| < \epsilon$$

$$|3| |x - 4| < \epsilon$$

$$|x - 4| < \frac{1}{3}\epsilon$$

- Assim podemos obter o valor  $\delta = \frac{1}{3}\epsilon$  que satisfaz a definição de limites.

## Exemplo 1 - verificação

Se:

$$0 < |x - 4| < \delta \quad \rightarrow \quad 0 < |x - 4| < \frac{1}{3}\epsilon$$

Então:

$$0 < 3|x - 4| < \epsilon$$

$$0 < |3x - 12| < \epsilon$$

$$0 < |3x - 5 - 7| < \epsilon$$

Assim:

$$0 < |f(x) - 7| < \epsilon$$

## Exemplo 2

Usar a definição de limites para provar que

$$\lim_{x \rightarrow 5} x^2 = 25$$

## Exemplo 2

- Assumir um valor  $\epsilon$  genérico.
- Tomando a tolerância em  $\epsilon$ :

$$|f(x) - L| < \epsilon$$

$$|x^2 - 25| < \epsilon$$

## Exemplo 2

- Assumir um valor  $\epsilon$  genérico.
- Tomando a tolerância em  $\epsilon$ :

$$|f(x) - L| < \epsilon$$

$$|x^2 - 25| < \epsilon$$

## Exemplo 2

Caso 1) Se  $x > 5$ :

$$x^2 - 25 < \epsilon$$

$$x < \sqrt{\epsilon + 25}$$

$$x - 5 < \sqrt{\epsilon + 25} - 5$$

Como  $x > 5$ :

$$|x - 5| < \sqrt{\epsilon + 25} - 5$$

Logo:

$$\delta_+ = \sqrt{\epsilon + 25} - 5$$

## Exemplo 2

Caso 1) Se  $x > 5$ :

$$x^2 - 25 < \epsilon$$

$$x < \sqrt{\epsilon + 25}$$

$$x - 5 < \sqrt{\epsilon + 25} - 5$$

Como  $x > 5$ :

$$|x - 5| < \sqrt{\epsilon + 25} - 5$$

Logo:

$$\delta_+ = \sqrt{\epsilon + 25} - 5$$

## Exemplo 2

Caso 1) Se  $x > 5$ :

$$x^2 - 25 < \epsilon$$

$$x < \sqrt{\epsilon + 25}$$

$$x - 5 < \sqrt{\epsilon + 25} - 5$$

Como  $x > 5$ :

$$|x - 5| < \sqrt{\epsilon + 25} - 5$$

Logo:

$$\delta_+ = \sqrt{\epsilon + 25} - 5$$



## Exemplo 2

Caso 2) Se  $x < 5$ :

$$-(x^2 - 25) < \epsilon$$

$$-x^2 + 25 < \epsilon$$

$$-x^2 < \epsilon - 25$$

$$x^2 > -(\epsilon - 25)$$

Assumindo  $x > 0$  por simplicidade:

$$x > \sqrt{-\epsilon + 25}$$

$$x - 5 > \sqrt{-\epsilon + 25} - 5$$

## Exemplo 2

Caso 2) Se  $x < 5$ :

$$-(x^2 - 25) < \epsilon$$

$$-x^2 + 25 < \epsilon$$

$$-x^2 < \epsilon - 25$$

$$x^2 > -(\epsilon - 25)$$

Assumindo  $x > 0$  por simplicidade:

$$x > \sqrt{-\epsilon + 25}$$

$$x - 5 > \sqrt{-\epsilon + 25} - 5$$

## Exemplo 2

Caso 2) Se  $x < 5$ :

$$-(x^2 - 25) < \epsilon$$

$$-x^2 + 25 < \epsilon$$

$$-x^2 < \epsilon - 25$$

$$x^2 > -(\epsilon - 25)$$

Assumindo  $x > 0$  por simplicidade:

$$x > \sqrt{-\epsilon + 25}$$

$$x - 5 > \sqrt{-\epsilon + 25} - 5$$

## Exemplo 2

Caso 2) Se  $x < 5$ :

$$-(x^2 - 25) < \epsilon$$

$$-x^2 + 25 < \epsilon$$

$$-x^2 < \epsilon - 25$$

$$x^2 > -(\epsilon - 25)$$

Assumindo  $x > 0$  por simplicidade:

$$x > \sqrt{-\epsilon + 25}$$

$$x - 5 > \sqrt{-\epsilon + 25} - 5$$

## Exemplo 2

Caso 2) Se  $x < 5$ :

$$-(x^2 - 25) < \epsilon$$

$$-x^2 + 25 < \epsilon$$

$$-x^2 < \epsilon - 25$$

$$x^2 > -(\epsilon - 25)$$

Assumindo  $x > 0$  por simplicidade:

$$x > \sqrt{-\epsilon + 25}$$

$$x - 5 > \sqrt{-\epsilon + 25} - 5$$

## Exemplo 2

Caso 2) Se  $x < 5$ :

$$-(x^2 - 25) < \epsilon$$

$$-x^2 + 25 < \epsilon$$

$$-x^2 < \epsilon - 25$$

$$x^2 > -(\epsilon - 25)$$

Assumindo  $x > 0$  por simplicidade:

$$x > \sqrt{-\epsilon + 25}$$

$$x - 5 > \sqrt{-\epsilon + 25} - 5$$

## Exemplo 2

Multiplicando esta relação por  $-1$ :

$$-(x - 5) < -\sqrt{-\epsilon + 25} + 5$$

Como  $x < 5$ , então  $|x - 5| = -(x - 5)$ . Portanto:

$$|x - 5| < -\sqrt{-\epsilon + 25} + 5$$

Logo:

$$\delta_- = -\sqrt{-\epsilon + 25} + 5$$

## Exemplo 2

Conhecendo os dois casos de  $\delta$ , definimos o subintervalo  $(5 - \delta_1, 5 + \delta_1)$  em que:

$$\delta_1 = \min(\delta_+, \delta_-) = \min(\sqrt{\epsilon + 25} - 5, -\sqrt{-\epsilon + 25} + 5) = \delta_+$$



## Exemplo 2 - verificação

Se:

$$0 < |x - 5| < \delta_1 \quad \rightarrow \quad 0 < |x - 5| < \sqrt{\epsilon + 25} - 5$$

- Caso 1) Assumindo  $x > 5$ :

Somando 5 em todos os termos da desigualdade:

$$5 < |x - 5| + 5 < \sqrt{\epsilon + 25}$$

Como todos os termos da desigualdade são positivos, é possível elevar todos ao quadrado sem preocupação com os sinais  $>$  e  $<$ .

$$25 < (|x - 5| + 5)^2 < \epsilon + 25$$

$$25 < |x - 5|^2 + 10|x - 5| + 25 < \epsilon + 25$$

$$0 < |x - 5|^2 + 10|x - 5| < \epsilon$$

## Exemplo 2 - verificação

Se:

$$0 < |x - 5| < \delta_1 \quad \rightarrow \quad 0 < |x - 5| < \sqrt{\epsilon + 25} - 5$$

- Caso 1) Assumindo  $x > 5$ :

Somando 5 em todos os termos da desigualdade:

$$5 < |x - 5| + 5 < \sqrt{\epsilon + 25}$$

Como todos os termos da desigualdade são positivos, é possível elevar todos ao quadrado sem preocupação com os sinais  $>$  e  $<$ .

$$25 < (|x - 5| + 5)^2 < \epsilon + 25$$

$$25 < |x - 5|^2 + 10|x - 5| + 25 < \epsilon + 25$$

$$0 < |x - 5|^2 + 10|x - 5| < \epsilon$$

## Exemplo 2 - verificação

Como  $x > 5$ :

$$0 < (x - 5)^2 + 10(x - 5) < \epsilon$$

$$0 < x^2 - 10x + 25 + 10x - 50 < \epsilon$$

$$0 < x^2 - 25 < \epsilon$$

Como  $x > 5$ , então  $x^2 - 25 = |x^2 - 25|$ , logo:

$$0 < |x^2 - 25| < \epsilon$$

$$0 < |f(x) - L| < \epsilon$$

## Exemplo 2 - verificação

- Caso 2) Assumindo  $x < 5$ :

$$0 < |x - 5| < \sqrt{\epsilon + 25} - 5$$

Como  $\delta_1 < \delta_-$ :

$$0 < |x - 5| < \sqrt{\epsilon + 25} - 5 < \delta_-$$

$$0 < |x - 5| < \delta_-$$

$$0 < |x - 5| < -\sqrt{-\epsilon + 25} + 5$$

## Exemplo 2 - verificação

Subtraindo 5 de todos os termos:

$$-5 < |x - 5| - 5 < -\sqrt{-\epsilon + 25}$$

Multiplicando por  $-1$

$$5 > -|x - 5| + 5 > \sqrt{-\epsilon + 25}$$

$$25 > (-|x - 5| + 5)^2 > -\epsilon + 25$$

$$25 > 25 - 10|x - 5| + |x - 5|^2 > -\epsilon + 25$$

## Exemplo 2 - verificação

Subtraindo 25 de todos os termos:

$$0 > -10|x - 5| + |x - 5|^2 > -\epsilon$$

Multiplicando por  $-1$

$$0 < 10|x - 5| - |x - 5|^2 < \epsilon$$

Como  $x < 5$

$$0 < 10(-(x - 5)) - (-(x - 5))^2 < \epsilon$$

$$0 < -10x + 50 - (x^2 - 10x + 25) < \epsilon$$

$$0 < -10x + 50 - x^2 + 10x - 25 < \epsilon$$

$$0 < -x^2 + 25 < \epsilon$$

## Exemplo 2 - verificação

Como  $x < 5$  e  $(x > 0$  por simplicidade), então  $|x^2 - 25| = -(x^2 - 25) = -x^2 + 25$ , logo:

$$0 < |x^2 - 25| < \epsilon$$

Portanto:

$$0 < |f(x) - L| < \epsilon$$

# Limite envolvendo o infinito positivo - Definição formal


$L$  é o valor limite de  $f(a)$  quando  $x \rightarrow \infty$  se, para qualquer tolerância  $\epsilon > 0$ , existe um valor  $M > 0$  tal que:

Se:

$$x > M$$

Então:

$$|f(x) - L| < \epsilon$$





# Limite envolvendo o infinito negativo - Definição formal


$L$  é o valor limite de  $f(a)$  quando  $x \rightarrow -\infty$  se, para qualquer tolerância  $\epsilon > 0$ , existe um valor  $N < 0$  tal que:

Se:

$$x < N$$

Então:

$$|f(x) - L| < \epsilon$$



## Exemplo 3

Usar a definição de limites para provar que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 2 + \frac{1}{x} = 2$$

- Tomando a tolerância em  $\epsilon$ :

$$|f(x) - L| < \epsilon$$

$$\left| 2 + \frac{1}{x} - 2 \right| < \epsilon$$

$$\left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

- Como  $x > 0$ :

$$\frac{1}{x} < \epsilon$$

$$\frac{1}{\epsilon} < x$$

- Assim, obtemos o valor  $M = \frac{1}{\epsilon}$

## Exemplo 3

Usar a definição de limites para provar que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 2 + \frac{1}{x} = 2$$

- Tomando a tolerância em  $\epsilon$ :

$$|f(x) - L| < \epsilon$$

$$|2 + \frac{1}{x} - 2| < \epsilon$$

$$|\frac{1}{x}| < \epsilon$$

- Como  $x > 0$ :

$$\frac{1}{x} < \epsilon$$

$$\frac{1}{\epsilon} < x$$

- Assim, obtemos o valor  $M = \frac{1}{\epsilon}$

## Exemplo 3 - verificação

- Tomando:

$$M < x \quad \rightarrow \quad \frac{1}{\epsilon} < x$$

- Então:

$$\frac{1}{\epsilon} < x$$

$$\frac{1}{x} < \epsilon$$

Como  $x$  é positivo:

$$\left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$


$$\left| \frac{1}{x} + 2 - 2 \right| < \epsilon$$

- Portanto

$$|f(x) - 2| < \epsilon$$

# Teorema do Sanduíche

Suponhamos  $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$  para todo o  $x$  em um intervalo aberto contendo um valor  $a$ .



# Teorema do Sanduíche


Suponhamos  $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$  para todo o  $x$  em um intervalo aberto contendo um valor  $a$ .

Se:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Então:

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$



- Utilidade: determinar limites de funções em que a fatoração não for possível

## Calcule o limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen} \left( \frac{1}{x^2} \right)$$

- Considerando a imagem da função seno, temos:

$$-1 \leq \operatorname{sen} \left( \frac{1}{x^2} \right) \leq 1$$

$$-x^2 \leq x^2 \operatorname{sen} \left( \frac{1}{x^2} \right) \leq x^2$$

## Calcule o limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen} \left( \frac{1}{x^2} \right)$$

- Considerando a imagem da função seno, temos:

$$-1 \leq \operatorname{sen} \left( \frac{1}{x^2} \right) \leq 1$$

$$-x^2 \leq x^2 \operatorname{sen} \left( \frac{1}{x^2} \right) \leq x^2$$



- Tomando os limites quando  $x \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} -x^2 \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen} \left( \frac{1}{x^2} \right) \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2$$

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen} \left( \frac{1}{x^2} \right) \leq 0$$

- Assim, pelo teorema do sanduiche:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen} \left( \frac{1}{x^2} \right) = 0$$