

Calculo diferencial e integral tomo 1  
Nikolai Piskunov

Resolución de problemas por FODE

---

# Índice general

<b>1. Número, variable y función</b>	<b>3</b>
1.1. Números reales. Representación de número reales por medio de puntos en el eje numérico . .	3
1.2. Valor absoluto del número real . . . . .	3

## Número, variable y función

### 1.1. Números reales. Representación de número reales por medio de puntos en el eje numérico

**Definición 1.1** El número racional puede expresarse como la razón  $\frac{p}{q}$  de dos números enteros  $p$  y  $q$ .

El número entero  $p$  se puede considerar como la razón de dos números enteros  $\frac{p}{1}$ .

**Definición 1.2** Los números en forma de fracciones decimales indefinidas no periódicas, se denominan números irracionales.

**Definición 1.3** Para cualquier par de números reales  $x$  e  $y$  existen una correlación, y sólo una, de las siguientes:

$$x < y, \quad x = y, \quad x > y$$

**Teorema 1.1** Todo número irracional  $\alpha$  se puede expresar con cualquier grado de precisión por medio de números racionales.

*Demostración.-* En efecto, siendo el número irracional  $\alpha > 0$ , calculamos  $\alpha$  con un error no mayor de  $\frac{1}{n}$  (por ejemplo, de  $\frac{1}{10}, \frac{1}{100}$ , etc.)

Cualquiera que sea el número  $\alpha$ , está comprendido entre dos números enteros consecutivos  $N$  y  $N + 1$ . Dividamos el segmento comprendido entre  $N$  y  $N + 1$  en  $n$  partes, entonces el número  $\alpha$  resulta comprendido entre los números racionales  $N + \frac{m}{n}$  y  $N + \frac{m+1}{n}$ . Dado que la diferencia entre estos números es  $\frac{1}{n}$ , cada uno de ellos expresa  $\alpha$  con un grado de precisión predeterminado: El primero por defecto y el segundo por exceso.

### 1.2. Valor absoluto del número real