

CÁLCULO DE UNA VARIABLE

James Stewart

Resolución de problemas por FODE

Índice general

1. Funciones y modelos	3
1.1. Ejercicios	3

Funciones y modelos

Definición 1.1 Una **función** f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto D exactamente un elemento, llamado $f(x)$, de un conjunto E .

$$\{(x, f(x)) / x \in D\}$$

la función f consta de todos los puntos (x, y) en el plano coordenado tales que $y = f(x)$ y x está en el dominio de f

Definición 1.2 Una función se llama **creciente** sobre un intervalo I si

$$f(x_1) < f(x_2) \text{ siempre que } x_1 < x_2 \text{ en } I$$

Se llama **decreciente** sobre I si

$$f(x_1) > f(x_2) \text{ siempre que } x_1 < x_2 \text{ en } I$$

1.1. Ejercicios

1. Si $f(x) = x + \sqrt{2-x}$ y $g(u) = u + \sqrt{2-u}$. ¿Es verdad que $f = g$?

Respuesta.- Es verdad ya que no afecta en nada el símbolo que se podría colocar a la variable dependiente.

2. Si $f(x) = \frac{x^2 - x}{x - 1}$ y $g(x) = x$ ¿Es verdad que $f = g$?

Respuesta.- No es verdad ya que el dominio de la función g son todos los reales contrariamente a la función f que no se cumple para $x = 1$

3. La gráfica de una función f está dada.

(a) Indique el valor de $f(1)$

Respuesta.- El valor es 3

(b) Calcule el valor de $f(-1)$

Respuesta.- El valor es $-0,3$ aproximadamente.

(c) ¿Para qué valores de x es $f(x) = 1$?

Respuesta.- Por definición solo se cumple para 0

(d) Calcule el valor de x tal que $f(x) = 0$

Respuesta.- El valor es aproximadamente $-0,7$

(e) Indique el dominio y el rango de f

Respuesta.- $f_D = \{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x \leq 4\}$, y $f_R = \{y \in \mathbb{R} / -1 \leq y \leq 3\}$

(f) ¿En qué intervalo f es creciente?

Respuesta.- Es creciente en el intervalo $[-2, 1]$

4. Las gráficas de f y g están dadas.

(a) Indique los valores de $f(-4)$ y $g(3)$

Respuesta.- $f(-4) = -2$ y $g(3) = 4$

(b) ¿Para qué valores de x es $f(x) = g(x)$?

Respuesta.- Para 2 , y -2

(c) Estime la solución de la ecuación $f(x) = -1$

Respuesta.- $x = -3$

(d) ¿Sobre qué intervalo f es decreciente?

Respuesta.- Sobre $[0, 4]$

(e) Establezca el dominio y el rango de f

Respuesta.- El dominio de f es $[-4, 4]$ y el rango de $[-2, 3]$

(f) Establezca el dominio y el rango de g

Respuesta.- El dominio es de $[-4, 3]$ y el rango de $[0, 5, 4]$

5. La gráfica de la figura 1 fue registrada por un instrumento operado por el departamento de minas y geología de California en el hospital Universitario de California del Sur de Los Ángeles. Utilice esta gráfica para estimar el rango de la función aceleración vertical de suelo, en la Universidad de California del Sur, durante el terremoto de Northridge.

Respuesta.- El rango de la función de aceleración vertical del suelo es dado por el intervalo $[-1, 3]$

6. En esta sección se discuten ejemplos de funciones cotidianas: la población es una función del tiempo, el costo, de envío postal es una función del peso, la temperatura del agua es una función del tiempo. De otros tres ejemplos de funciones de la vida cotidiana que se describen verbalmente. ¿Qué puede decir sobre el dominio y el rango de cada una de sus funciones? Si es posible, trace una gráfica de cada función.

Respuesta.-

7. No cumple con la definición de función.

8. Cumple con la definición de función por lo tanto $f_D = \{x / -2 \leq x \leq 2\}$ y $f_R = \{y \in f(x) / -1 \leq y \leq 2\}$

9. Cumple con la definición de función por lo tanto $f_D = \{x / -3 \leq x < -2 \cup -2 \leq x \leq 2\}$ y $f_R = \{y \in f(x) / -3 \leq x < -2 \cup -2 \leq y \leq 2,6\}$

10. No cumple con la definición de función por lo tanto no se tiene un dominio y rango.

11. En la figura se muestra una gráfica de la temperatura media global T durante el siglo XX . Estime lo siguiente.

(a) La temperatura media mundial en 1950

Respuesta.- 14.5 grados centígrados.

(b) El año en que la temperatura promedio fue de 14,2 C.

Respuesta.- Aproximadamente en 1905

(c) ¿En qué año la temperatura fue más baja? ¿Más alta?

Respuesta.- Fue más baja en 1920 y más alta en 2010

(d) El rango de T

Respuesta.- El rango se encuentra en el intervalo de $[12,8, 14,8]$

- 12.** Los arboles crecen más rápido y forman anillos más amplios en los años cálidos y crecen más lentamente y forman anillos más angostos en los años más fríos. La figura muestra anillos anchos del pino Siberiano de 1500 a 2000.

(a) ¿Cuál es el rango de la función de ancho de anillo?

Respuesta.- El rango es de 0,1 a 1,41 aproximadamente.


(b) ¿Qué dice la gráfica acerca de la temperatura de la tierra? ¿La gráfica refleja las erupciones volcánicas de la mitad del siglo *XIX*?

Respuesta.- La temperatura cada vez es más cálida mientras pasa los años.

Se ve un pequeño realce entre 1800 – 1890 donde podría haber existido algunas erupciones volcánicas.

- 13.** Se ponen unos cubitos de hielo en un vaso, se llena el vaso con agua fría y luego se coloca sobre una mesa. Describa cómo cambia la temperatura del agua conforme transcurre el tiempo. Luego trace una gráfica de la temperatura del agua como una función del tiempo transcurrido.

Respuesta.- La temperatura va disminuyendo constantemente en función a la temperatura ambiente y del tiempo.



- 14.** Tres corredores compiten en una carrera de 100 metros. La gráfica muestra la distancia recorrida como una función del tiempo de cada corredor. Describa en palabras lo que la gráfica indica acerca de esta carrera. ¿Quién ganó la carrera? ¿Cada corredor terminó la carrera?

Respuesta.- Gano la carrera el competidor A. Efectivamente cada competidor acabo la carrera.

- 15.** La gráfica muestra el consumo de energía para un día de septiembre en San Francisco. (P se mide en megawatts; t se registra en horas a partir de la medianoche).


- (a) ¿Cual fue el consumo de potencia a las 6 : 00? ¿A las 18 : 00?

Respuesta.- Para las 6 : 00 el consumo de potencia es 500 megawatts. y para las 18 : 00 es 720 megawatts.

- (b) ¿Cuándo fue el consumo de energía más bajo? ¿Cuándo fue el más alto? ¿Estos tiempos parecen razonables?

Respuesta.- El más bajo fue a hrs. 4 : 00 y el mas alto fue en a hrs. 12 : 00. Los tiempos son razonables por la actividad que se puede realizar a esas horas.

16. Trace una gráfica aproximada del número de horas de luz en función de la época del año.
17. Trace una gráfica de la temperatura exterior en función del tiempo, durante un día típico de primavera.
18. Trace una gráfica aproximada del valor de mercado de un nuevo automóvil en función del tiempo, durante un periodo de 20 años. Suponga que el automóvil se mantiene en buen estado.
19. Trace la gráfica de la cantidad de una determinada marca de café vendido por una tienda en función del precio del café.
20. Coloque una tarta congelada en un horno y caliéntela durante una hora. Luego sáquela y déjela enfriar antes de comerla. Describa cómo cambia la temperatura de la tarta conforme pasa el tiempo. Luego trace una gráfica de la temperatura de la tarta en función del tiempo.
21. El propietario de una casa poda el césped cada miércoles por la tarde. Trace una gráfica de la altura del césped como una función del tiempo, en el transcurso de un periodo de cuatro semanas.



22. Un avión despegue desde un aeropuerto y aterriza una hora más tarde en otro aeropuerto a 400 km de distancia. Si t representa el tiempo en minutos desde que el avión ha dejado la terminal. $x(t)$ es la distancia horizontal recorrida y $y(t)$ la altitud del avión, trace
- (a) Una posible gráfica de $x(t)$
- (b) Una posible gráfica de $y(t)$

(c) Una posible gráfica de la rapidez respecto al suelo.

(d) Una posible gráfica de la velocidad vertical.

- 23.** Las siguientes lecturas de temperatura T (en C°) se registraron cada tres horas desde la medianoche a las 15 : 00 en Montreal, el 13 de junio de 2004. El tiempo t se midió en horas a partir de la medianoche.

(a) Utilice las lecturas para trazar una gráfica de T como una función de t .

(b) Utilice la gráfica para estimar la temperatura a las 11 : 00

- 24.** Los investigadores midieron la concentración de alcohol en la sangre de ocho sujetos masculinos adultos después de consumir en forma rápida 30 mL de etanol. La tabla muestra los datos que se obtuvieron promediando la BAC de los ocho hombres.

(a) Utilice las lecturas para trazar la gráfica de la BAC en función de t .

(b) Utilice la gráfica para describir cómo el efecto del alcohol varía con el tiempo.

- 25.** Si $f(x) = 2x^2 - x + 2$, determine $f(2)$, $f(-2)$, $f(a)$, $f(-a)$, $f(a+1)$, $2f(a)$, $f(2a)$, $f(a^2)$, $[f(a)]^2$, y $f(a+h)$

Respuesta.-

$$\begin{aligned}f(2) &= 2 \cdot 2^2 - 2 + 2 = 8 \\f(-2) &= 2 \cdot (-2)^2 - 2 + 2 = 12 \\f(a) &= 2a^2 - a + 2 \\f(-a) &= 2(-a)^2 - (-a) + 2 \\f(a+1) &= 2(a+1)^2 - (a+1) + 2 \\2f(a) &= 2(2a^2 - a + 2) \\f(2a) &= 2(2a)^2 - 2a + 2 \\f(a^2) &= 2(a^2)^2 - a^2 + 2 \\f(a)^2 &= (2a^2 - a + 2)^2 \\f(a+h) &= 2(a+h)^2 - (a+h) + 2\end{aligned}$$

- 26.** Un globo esférico con radio de r centímetros tiene volumen $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Encuentre una función que represente la cantidad de aire necesaria para inflar el globo de un radio de r centímetros a un radio $r+1$ centímetros.

Respuesta.- $V(r+1) - V(r) = \frac{4}{3}\pi(r+1)^3 - \frac{4}{3}\pi r^3$

(27–30) Evalúe el cociente de diferencia de cada una de las siguientes funciones. Simplifique su respuesta.

27. $f(x) = 4 + 3x - x^2, \quad \frac{f(3+h) - f(3)}{h}$

Respuesta.- Se tiene

$$\frac{4 + 3(3+h) - (3+h)^2 - 4 + 9 - 9}{h} = \frac{9 + 3h - 9 - 6h - h^2}{h} = \frac{-h^2 - 3h}{h} = -(h+3)$$

28. $f(x) = x^3, \quad \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

Respuesta.- $\frac{(a+h)^3 - a^3}{h} = \frac{a^3 + 3a^2h + 3ah^3 + h^3 - a^3}{h} = \frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h} = h^2 + 3a^2 + 3ah$

29. $f(x) = \frac{1}{x}, \quad \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

Respuesta.-

$$\frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x - a} = \frac{\frac{a - x}{xa}}{x - a} = \frac{-(x - a)}{xa(x - a)} = -\frac{1}{xa}$$

30. $f(x) = \frac{x+3}{x+1}, \quad \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$

Respuesta.-

$$\frac{\frac{x+3}{x+1} - 2}{x - 1} = \frac{\frac{x+3 - 2(x+1)}{x+1}}{x - 1} = \frac{\frac{-x - 1}{x+1}}{x - 1} = \frac{-(x+1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{-1}{x-1}$$

31 – 37 Encuentre el dominio de cada una de las funciones siguientes.

31. $f(x) = \frac{x+4}{x^2-9}$

Respuesta.- Debemos tomar en cuenta que no podemos dividir por 0. Por lo tanto igualamos el denominador a 0.

$$x^2 - 9 = 0 \Rightarrow (x-3)(x+3) = 0$$

entonces el dominio esta dado por todo $x - \{-3, 3\}$

32. $f(x) = \frac{2x^3 - 5}{x^2 + x - 6}$

Respuesta.- Ponemos a prueba

$$x^2 + x - 6,$$

entonces $(x+2)(x-3) = 0$ por lo tanto El dominio esta dado para todo $x - \{-2, 3\}$

33. $f(t) = \sqrt[3]{2t-1}$

Respuesta.- El dominio es dado para todo x , ya que la raíz cubica puede ser evaluada para número no positivos.

34. $g(t) = \sqrt{3-y} - \sqrt{2+t}$

Respuesta.- Evaluamos raíces cuadradas para números no negativos por lo tanto, $3-t \geq 0$; $2+t \geq 0$ entonces el dominio de la función esta dado por $-2 \leq t \leq 3$.

35. $h(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x^2-5x}}$

Respuesta.- Sea $x^2 - 5x \geq 0$, de donde $x(x-5) \geq 0$, así, $x \geq 0 \wedge x-5 \geq 0 \vee x \leq 0 \wedge x-5 \leq 0$, por lo tanto el dominio esta dado por $x \leq 0 \vee x \geq 5$.

36. $f(u) = \frac{u+1}{1+\frac{1}{u+1}}$

Respuesta.- Primeramente evaluamos $u+1 = 0$, entonces $u = -1$, luego evaluamos $1 + \frac{1}{u+1} = 0$, de donde $u = -2$, por lo tanto $\{x/x \neq -1, -2\}$

37. $F(p) = \sqrt{2-\sqrt{p}}$

Respuesta.- Evaluamos primero \sqrt{p} de donde $p \geq 0$ luego evaluamos $\sqrt{2-\sqrt{p}} \geq 0$, así $p \leq 4$ por lo tanto el dominio esta dado por $0 \leq x \leq 4$


38. Encuentre el dominio y el rango, y dibuje la gráfica de la función $h(x) = \sqrt{4-x^2}$

Respuesta.- Evaluamos el dominio de la función,

$$4 - x^2 \geq 0 \Rightarrow -(x^2 - 4) \geq 0 \Rightarrow x^2 - 4 \leq 0 \Rightarrow (x-2)(x+2) \leq 0$$

por lo tanto el dominio esta dado por $\{x/-2 \leq x \leq 2\}$.


Luego es fácil evaluar el rango, $\{f(x)/0 \leq f(x) \leq 2\}$



39 – 40 Encuentre el dominio y grafique cada una de las funciones siguientes:


39. $f(x) = 1,6x - 2,4$

Respuesta.- El dominio viene dado por todos los reales.



40. $g(t) = \frac{t^2 - 1}{t + 1}$

Respuesta.- El dominio esta dado por $\{x/x \neq -1\}$




41 – 44 Evalúe $f(-3)$, $f(0)$ y $f(2)$ para la función definida por partes. Luego trace la gráfica de la función.

41. $f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < 0 \\ 1 - x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

Respuesta.-


- $f(-3) = x + 2 = -3 + 2 = -1.$
- $f(0) = 1 - x = 1 - 0 = 1.$
- $f(2) = 1 - x = 1 - 2 = -1.$



$$42. f(x) = \begin{cases} 3 - \frac{1}{2}x & \text{si } x < 2 \\ 2x - 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Respuesta.-


- $f(-3) = 3 - \frac{1}{2}x = 3 - \frac{1}{2}(-3) = \frac{9}{2}.$
- $f(0) = 3 - \frac{1}{2}x = 3 - \frac{1}{2}(0) = 3.$
- $f(2) = 2x - 5 = 2 \cdot 2 - 5 = -1.$



43. $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$

Respuesta.-


- $f(-3) = x + 1 = -3 + 1 = -2.$
- $f(0) = x^2 = 0^2 = 0.$
- $f(2) = x^2 = 2^2 = 4.$



44. $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \leq 1 \\ 7 - 2x & \text{si } x > 1 \end{cases}$

Respuesta.-


- $f(-3) = -1.$
- $f(0) = -1.$
- $f(2) = 7 - 2x = 7 - 2 \cdot 2 = 3.$



45 – 50 Trace la gráfica de la función.


45. $f(x) = x + |x|$

Respuesta.-




46. $f(x) = |x + 2|$

Respuesta.-




47. $g(t) = |1 - 3t|$

Respuesta.-




48. $h(t) = |t| + |t + 1|$

Respuesta.-




49. $f(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } |x| \leq 1 \\ 1 & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$

Respuesta.-



50. $g(x) = ||x| - 1|$

Respuesta.-



51 – 56 Encuentre una expresión para la función cuya gráfica es la curva dada.

51. El segmento de recta que une los puntos $(1, -3)$ y $(5, 7)$

Respuesta.-

52. El segmento de recta que une los puntos $(-5, 10)$ y $(7, -10)$

Respuesta.-