

## Cotas superiores mínimas

**Definición 1.1.** Un conjunto  $A$  de números reales está acotado superiormente si existe un número  $x$  tal que

$$x \geq a \text{ para todo } a \text{ de } A.$$

este número  $x$  se denomina una cota superior de  $A$ .

$A$  está acotado superiormente si y sólo si existe un número  $x$  que es una cota superior de  $A$ . (y en este caso existirán muchas cotas superiores de  $A$ );

**Definición 1.2.** Un número  $x$  es una cota superior mínima de  $A$  si

- (1)  $x$  es una cota superior de  $A$ ,
- (2) si  $y$  es una cota superior de  $A$ , entonces  $x \leq y$ .

El término **supremo** de  $A$  es sinónimo al de cota superior mínima y tiene una ventaja: se puede abreviar mediante un símbolo muy adecuado

$$\sup A$$

Si  $x$  e  $y$  son ambas cotas superiores mínimas de  $A$ , entonces  $x = y$ .

Demostración.- En efecto, en este caso

$$\begin{array}{ll} x \leq y, & \text{ya que } y \text{ es una cota superior, y } x \text{ es una cota superior mínima,} \\ y \leq x & \text{ya que } x \text{ es una cota superior, e } y \text{ es una cota superior mínima.} \end{array}$$

por lo tanto,  $x = y$ .

**Definición 1.3.** Un conjunto  $A$  de números reales está acotado inferiormente si existe un número  $x$  tal que

$$x \leq a \text{ para todo } a \text{ de } A.$$

Dicho número  $x$  se denomina una cota inferior de  $A$ .

**Definición 1.4.** Un número  $x$  es la cota inferior máxima de  $A$  si

- (1)  $x$  es una cota inferior de  $A$ , y
- (2) si  $y$  es una cota inferior de  $A$ , entonces  $x \geq y$ .

La cota inferior máxima de  $A$  se denomina también el **ínfimo** de  $A$ , abreviadamente

$$\inf A$$

**Propiedad .1** (Propiedad de la cota superior mínima). Si  $A$  es un conjunto de números reales,  $A \neq \emptyset$ , y  $A$  está acotado superiormente, entonces  $A$  posee una cota superior mínima.

El enorme significado de P13 se hará patente sólo de manera gradual, aunque ya estamos en condiciones de comprobar su importancia dando las demostraciones que omitimos en el Capítulo 7.

**Teorema 7.1.** Si  $f$  es continua en  $[a, b]$  y  $f(a) < 0 < f(b)$ , entonces existe algún número  $x$  de  $[a, b]$  tal que  $f(x) = 0$ .

Demostración.- La demostración es tan sólo una versión rigurosa del método esbozado al final del capítulo 7: localizaremos el menor número  $x$  de  $[a, b]$  tal que  $f(x) = 0$ .

Definamos el conjunto  $A$ , de la manera siguiente:

$$A = \{x : a \leq x \leq b, \text{ y } f \text{ negativa en el intervalo } [a, x]\}.$$

Obviamente  $A \neq \emptyset$  ya que  $a$  pertenece a  $A$ ; de hecho, existe un  $\delta > 0$  tal que  $A$  contiene a todos los puntos  $x$  que satisfacen  $a \leq x < a + \delta$  ya que  $f$  es continua en  $[a, b]$  y  $f(a) < 0$ . Análogamente,  $b$  es una cota superior de  $A$  y, de hecho, existe un  $\delta > 0$  tal que todos los puntos  $x$  que satisfacen  $b - \delta < x \leq b$  son cotas superiores de  $A$ ; esto también se deduce del Problema 6-16, ya que  $f(b) > 0$ .

A partir de estas observaciones se deduce que  $A$  posee cota superior mínima  $\alpha$  y que  $a < \alpha < b$ . Ahora demostraremos que  $f(\alpha) = 0$ , excluyendo las posibilidades  $f(\alpha) < 0$  y  $f(\alpha) > 0$ .

Supongamos primero que  $f(\alpha) < 0$ . Según el teorema 6-3, existe un  $\delta > 0$  tal que  $f(x) < 0$  si  $\alpha - \delta < x < \alpha + \delta$ . Ha de existir un número  $x_0$  de  $A$  que satisface  $\alpha - \delta < x_0 < \alpha$  (ya que sino  $\alpha$  no sería la mínima cota superior de  $A$ ). Esto significa que  $f$  es negativa en todo el intervalo  $[a, x_0]$ . Pero si  $x_1$  es un número situado entre  $\alpha$  y  $\alpha + \delta$ , entonces  $f$  también es negativa en todo el intervalo  $[a, x_1]$ . Pero esto contradice el hecho de que  $\alpha$  sea una cota superior de  $A$ ; concluimos pues que la suposición que hemos hecho anteriormente, de que  $f(\alpha) < 0$  se debe ser falsa.

Supongamos ahora que  $f(\alpha) > 0$ . Entonces existe un número  $\delta > 0$  tal que  $f(x) > 0$  si  $\alpha - \delta < x < \alpha + \delta$ . Una vez más, sabemos que existe un  $x_0$  de  $A$  que satisface  $\alpha - \delta < x_0 < \alpha$ ; pero esto significa que  $f$  es negativa en  $[a, x_0]$ , lo cual es imposible ya que  $f(x_0) > 0$ . Así pues, la suposición de que  $f(\alpha) > 0$  conduce a una contradicción, quedando sólo la posibilidad de que  $f(\alpha) = 0$ .

Las demostraciones de los teoremas 2 y 3 del capítulo 7 requieren un sencillo resultado preliminar, que va a desempeñar una función muy similar a la del teorema 6-3 en la demostración anterior.

**Teorema 8.1.** Si  $f$  es continua en  $a$ , existe un número  $\delta > 0$  tal que  $f$  está acotada superiormente en el intervalo  $(a - \delta, a + \delta)$ .

Demostración.- Como el  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ , para cada  $\epsilon > 0$ , existe un  $\delta > 0$  tal que, para todo  $x$ ,

$$\text{si } |x - a| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - f(a)| < \epsilon,$$

Tan sólo es necesario aplicar esta propiedad a algún  $\epsilon$  en particular, por ejemplo  $\epsilon = 1$ . Deducimos pues que existe un  $\delta > 0$  tal que, para todo  $x$ ,

si  $|x - a| < \delta$ , entonces  $|f(x) - f(a)| < 1$ ,

y, en particular, si  $|x - a| < \delta$  entonces  $f(x) - f(a) < 1$ . Esto completa la demostración: en el intervalo  $(a - \delta, a + \delta)$  la función  $f$  está acotada superiormente por  $f(a) + 1$ .

Por supuesto, ahora podríamos demostrar también que  $f$  está acotada inferiormente en algún intervalo  $(a - \delta, a + \delta)$ , concluyendo, por tanto, que  $f$  está acotada en algún intervalo abierto que contiene a  $a$ . En este sentido, cabe destacar en particular la observación de que si  $\lim_{x \rightarrow a^+}$ , entonces existe un  $\delta > 0$  tal que  $f$  está acotada en el conjunto  $\{x : a \leq x < a + \delta\}$ , pudiendo hacerse una observación análoga si  $\lim_{x \rightarrow b^-} = f(b)$ .

**Teorema 7.2.** Si  $f$  es continua en  $[a, b]$ , entonces  $f$  está acotada superiormente en  $[a, b]$ .

Demostración.- Sea,

$$A = \{x : a \leq x \leq b \text{ y } f \text{ está acotada superiormente en } [a, x]\}$$

Obviamente  $A \neq \emptyset$  (ya que  $a$  pertenece a  $A$ ), y está acotada superiormente por  $b$ , de manera que  $A$  posee una cota superior mínima  $\alpha$ . Observemos que estamos aplicando el término acotado superiormente tanto al conjunto  $A$ , localizado en el eje horizontal, como a la función  $f$ , es decir, a conjuntos del tipo  $\{f(y) : a \leq y \leq x\}$ , localizados en el eje vertical.

La primera etapa de la demostración consiste en probar que  $\alpha = b$ . Supongamos, por el contrario, que  $a < b$ . Según el teorema 1 existe un  $\delta > 0$  tal que  $f$  está acotada en  $(a - \delta, a + \delta)$ . Como  $\alpha$  es la cota superior mínima de  $A$  existe algún  $x_0$  de  $A$  que satisface  $\alpha - \delta < x_0 < \alpha$ . Esto significa que  $f$  está acotada en  $[a, x_0]$ . Pero si  $x_1$  es cualquier número tal que  $\alpha < x_1 < \alpha + \delta$ , entonces  $f$  también está acotada en  $[x_0, x_1]$ . Por lo tanto  $f$  está acotada en  $[a, x_1]$ , de manera que  $x_1$  pertenece a  $A$ , lo que contradice el hecho de que  $\alpha$  sea una cota superior a  $A$ . Esta contradicción demuestra que  $\alpha = b$ . Debemos mencionar un detalle: en la demostración hemos puesto implícitamente que  $a < \alpha$  de manera que  $f$  está definida en algún intervalo  $(\alpha - \delta, \alpha + \delta)$ ; la posibilidad  $a = \alpha$  puede excluirse de manera similar, utilizando el hecho de que existe un  $\delta > 0$  tal que  $f$  está acotada en  $\{x : a \leq x < a + \delta\}$ .

La demostración todavía no es completa; únicamente sabemos que  $f$  está acotada en  $[a, x]$  para todo  $x < b$ , no necesariamente que  $f$  está acotada en  $[a, b]$ . Sin embargo, sólo es necesario añadir una pequeña observación.

Existe un  $\delta > 0$  tal que  $f$  está acotada en  $\{x : b - \delta < x \leq b\}$ . Existe también un  $x_0$  de  $A$  tal que  $b - \delta < x_0 < b$ . De manera que  $f$  está acotada en  $[a, x_0]$  y también en  $[x_0, b]$ , por tanto  $f$  está acotada en  $[a, b]$ .

**Teorema 7.3.** Si  $f$  es continua en  $[a, b]$ , entonces existe un número  $y$  de  $[a, b]$  tal que  $f(y) \geq f(x)$  para todo  $x$  de  $[a, b]$ .

Demostración.- Sabemos que  $f$  está acotada en  $[a, b]$ , lo que significa que el conjunto

$$\{f(x) : x \text{ pertenezca a } [a, b]\}$$

está acotado. Además, dicho conjunto es, obviamente, distinto del  $\emptyset$ , de manera que admite una cota superior mínima  $\alpha$ . Como  $\alpha \geq f(x)$  para  $x$  de  $[a, b]$ , basta demostrar que  $\alpha = f(y)$  para algún  $y$  de  $[a, b]$ . Supongamos, por el contrario, que  $\alpha \neq f(y)$  para todo  $y$  de  $[a, b]$ . Entonces la función  $g$  definida mediante

$$g(x) = \frac{1}{\alpha - f(x)}, \quad x \in [a, b]$$

es continua en  $[a, b]$ , ya que el denominador de la expresión del lado derecho de la igualdad nunca vale 0. Por otra parte,  $\alpha$  es la mínima cota superior de  $\{f(x) : x \text{ pertenezca a } [a, b]\}$ , esto significa que

para cada  $\epsilon > 0$  existe un  $x$  de  $[a, b]$  con  $\alpha - f(x) < \epsilon$ .

Esto, a su vez, significa que

para cada  $\epsilon > 0$  existe un  $x$  de  $[a, b]$  con  $g(x) > 1/\epsilon$ .

Pero esto quiere decir que  $g$  no está acotada en  $[a, b]$ , lo que contradice el resultado del teorema anterior.

**Teorema 8.2.**  $\mathbb{N}$  no está acotado superiormente.

Demostración.- Supongamos que  $\mathbb{N}$  estuviera acotado superiormente. Como  $\mathbb{N} = \emptyset$ , existiría una cota superior mínima  $\alpha$  de  $\mathbb{N}$ . Entonces

$$\alpha \geq n \text{ para todo } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

Por consiguiente,

$$\alpha \geq n + 1 \text{ para todo } n \text{ de } \mathbb{N},$$

ya que si  $n$  pertenece a  $\mathbb{N}$ ,  $n + 1$  también. Pero esto significa que

$$\alpha - 1 \geq n \text{ para todo } n \text{ de } \mathbb{N},$$

lo cual quiere decir que  $\alpha - 1$  también es una cota superior de  $\mathbb{N}$ , lo que contradice el hecho de que  $\alpha$  sea la cota superior mínima de  $\mathbb{N}$ .

**Teorema 8.3.** Para cualquier  $\epsilon > 0$  existe un número natural  $n$  con  $1/n < \epsilon$ .

Demostración.- Supongamos que no fuese así; entonces  $1/n \geq \epsilon$  para todo  $n$  de  $\mathbb{N}$ . Por tanto,  $n \leq 1/\epsilon$  para todo  $n$  de  $\mathbb{N}$ . Pero esto significa que  $1/\epsilon$  es una cota superior de  $\mathbb{N}$ , lo cual contradice el resultado del teorema 8.2.

## 8.1 Problemas

1. Hallar la cota superior mínima y la cota inferior máxima (si existe) de los siguientes conjuntos. Decida también cuáles de ellos poseen un elemento máximo y un elemento mínimo (es decir, en qué casos la cota superior mínima y cota inferior máxima pertenecen al conjunto).

(i)  $\left\{ \frac{1}{n} : n \text{ en } \mathbb{N} \right\}.$

Respuesta.- Sea  $A$  el conjunto dado. Vemos que el  $\sup A = \max A = 1$ ,  $\inf A = 0$  y  $\min A$  no existe.

(ii)  $\left\{ \frac{1}{n} : n \text{ en } \mathbb{Z} \text{ y } n \neq 0 \right\}.$

Respuesta.- Sea  $A$  el conjunto dado. Podemos ver que  $\sup A = \max A = 1$  y  $\inf A = \min A = -1$ .

(iii)  $\{x : x = 0 \text{ o } x = 1/n \text{ para algún } n \text{ en } \mathbb{N}\}$ .

Respuesta.- Llamemos  $A$  al conjunto dado. Todos los números están en el intervalo  $[0, 1]$ . De donde el 0 es el mayor límite inferior y el 1 es el menor límite superior, es decir,  $\sup A = \max A = 1$  y  $\inf A = \min A = 0$ .

(iv)  $\{x : 0 \leq x \leq \sqrt{2} \text{ y } x \text{ racional}\}$ .

Respuesta.- Sea  $A$  el conjunto dado. En este caso 0 es el mayor límite inferior y está contenido en el conjunto y  $\sqrt{2}$  es el límite superior mínimo pero no está en el conjunto, por lo tanto,  $\inf A = \min A = 0$  y  $\sup A = \sqrt{2}$ .

(v)  $\{x : x^2 + x + 1 \geq 0\}$ .

Respuesta.- No existe ni máximo ni mínimo, tampoco supremo o ínfimo.

(vi)  $\{x : x^2 + x - 1 < 0\}$ .

Respuesta.- Sea  $A = \{x : x^2 + x - 1 < 0\}$ , entonces se tiene

$$x^2 + x - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} < x < \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

. Por lo tanto  $\sup A = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$  y  $A = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$  los dos no contenidos en  $A$ .

(vii)  $\{x : x < 0 \text{ y } x^2 + x - 1 < 0\}$ .

Respuesta.- Designemos al conjunto dado con  $A$ . Luego ya que

$$x < 0 \text{ y } x^2 + x - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} < x < 0$$

Entonces  $\sup A = 0 \notin A$ ,  $\inf A = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \notin A$ .

(viii)  $\left\{\frac{1}{n} + (-1)^n : n \text{ en } \mathbb{N}\right\}$ .

Respuesta.- Sea  $A$  el conjunto designado y sea  $a_n = \frac{1}{n} + (-1)^n$ . Entonces  $a_1 = 0$ , para índices pares  $a_n = \frac{1}{n} + 1$ . La sucesión es decreciente, converge en 1 y el mayor elemento se obtiene en  $n = 2$ ,  $a_2 = \frac{3}{2}$ . Para índices impares  $a_n = \frac{1}{n} - 1$ , la secuencia es decreciente, converge en  $-1$  pero este número no se consigue, por lo que

$$-1 < a_n \leq \frac{3}{2}.$$

De donde concluimos que  $\inf A = -1$  pero no existe el mínimo y  $\sup A = \max A = \frac{3}{2}$ .

2. (a) Suponga que  $A \neq \emptyset$  está acotado inferiormente. Sea  $-A$  el conjunto de todos los  $-x$  con  $x$  en  $A$ . Demuestre que  $-A \neq \emptyset$  está acotado superiormente y que  $-\sup(-A)$  es la cota inferior máxima de  $A$ .

Demostración.- Sabemos que  $A \neq \emptyset \Rightarrow -A \neq \emptyset$ . Luego ya que  $A$  está acotado inferiormente, existe algún  $y$  tal que  $y \leq x$  para todo  $x \in A$ , entonces

$$y \leq x, \forall x \in A \implies -y \geq -x, \forall -x \in -A$$

Por lo tanto,  $-A$  está acotado superiormente.

Sea  $\alpha = \sup(-A)$ , entonces  $\alpha$  es una cota superior de  $-A$ , por tanto invirtiendo el razonamiento que acabamos de hacer concluiremos que  $-\alpha$  es una cota inferior de  $A$ .

Además, si  $\beta$  es cualquier cota inferior de  $A$ , entonces  $-\beta$  es una cota superior de  $-A$ , por tanto  $-\beta \geq \alpha$  y  $\beta \leq -\alpha$ . Por consiguiente  $-\alpha$  es la mayor cota inferior o ínfimo de  $A$ .

- (b) Si  $A \neq \emptyset$  está acotado inferiormente, sea  $B$  el conjunto de todas las cotas inferiores de  $A$ . Demuestre que  $B \neq \emptyset$ , que  $B$  está acotado superiormente y que  $\sup B$  es la cota inferior máxima de  $A$ .

Demostración.- Al estar  $A$  acotado inferiormente,  $B \neq \emptyset$ . Luego puesto que  $A \neq \emptyset$ , existe algún  $x$  en  $A$ . Ningún  $y$  que sea mayor que  $x$  es cota inferior de  $A$ , o sea que ninguno de tales  $y$  pertenece a  $B$ .  $B$  está pues acotado superiormente. Sea  $\alpha = \sup B$ , entonces  $\alpha$  es automáticamente mayor o igual que cualquier cota inferior de  $A$ , con lo que basta demostrar que  $\alpha$  es cota inferior de  $A$ . Ahora bien si  $\alpha$  no fuese cota inferior de  $A$ , existiría en  $A$  algún  $x$  con  $x < \alpha$ . Al ser  $\alpha$  la cota superior mínima de  $B$ , esto significaría que en  $B$  existe algún  $y$  con  $x < y < \alpha$ . Pero esto es imposible, ya que  $x < y$  significa que  $y$  no es cota inferior de  $A$  y por lo tanto  $y$  no puede pertenecer a  $B$ .

3. Sea  $f$  una función continua en  $[a, b]$  con  $f(a) < 0 < f(b)$ .

- (a) La demostración del teorema 7-1 estableció que existe un  $x$  mínimo de  $[a, b]$  con  $f(x) = 0$ . Si existe más de un  $x$  de  $[a, b]$  con  $f(x) = 0$  ¿Existe necesariamente un segundo elemento más pequeño  $x$  tal que  $f(x) = 0$ ? Demuestre que existe un máximo de  $[a, b]$  con  $f(x) = 0$ .

Demostración.-

- (b) La demostración del teorema 7-1 se basaba en considerar el conjunto  $A = \{x : a \leq x \leq b \text{ y } f \text{ negativa en } [a, x]\}$ . De otra demostración del teorema 7-1, basada en considerar  $B = \{x : a \leq x \leq b \text{ y } f(x) < 0\}$ . ¿Qué punto  $x$  de  $[a, b]$  con  $f(x) = 0$  será localizado con esta demostración? Dé un ejemplo en el cual los conjuntos  $A$  y  $B$  sean los mismos.

Demostración.-