

Límites y continuidad

Definición 1.1 (La razón promedio de cambio) de $y = f(x)$ con respecto a x en el intervalo $[x_1, x_2]$ sabiendo que $\Delta x = x_2 - x_1 = h$ es

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}, \quad h \neq 0$$

1.1. Ejercicios

Razones promedio de cambio

En los ejercicios 1 a 6, determine la razón promedio de cambio de la función en el intervalo o intervalos dados.

1. $f(x) = x^3 + 1$

a) $[2, 3]$

Respuesta.- $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(3^3 + 1) - (2^3 + 1)}{3 - 2} = 19$

b) $[-1, 1]$

Respuesta.- $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(1^3 + 1) - ((-1)^3 + 1)}{1 - (-1)} = 1$

2. $g(x) = x^2 - 2x$

a) $[1, 3]$

Respuesta.- $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(3^2 - 2 \cdot 3) - (1^2 - 2 \cdot 1)}{3 - 1} = 2$

b) $[-2, 4]$

$$\text{Respuesta.- } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(4^2 - 2 \cdot 4) - ((-2)^2 - 2 \cdot (-2))}{4 - (-2)} = 0$$

3. $h(t) = \cot t$ (a) $[\pi/4, 3\pi/4]$

$$\text{Respuesta.- } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\cot(\pi/4) - \cot(3\pi/4)}{\pi/4 - 3\pi/4} = \frac{1 + 1}{\frac{\pi - 3\pi}{4}} = \frac{8}{-2\pi}$$

(b) $[\pi/6, \pi/2]$

$$\text{Respuesta.- } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\cot(\pi/6) - \cot(\pi/2)}{\pi/6 - \pi/2} = \frac{-3\sqrt{3}}{\pi}$$

4. $g(t) = 2 + \cos t$ (a) $[0, \pi]$

$$\text{Respuesta.- } \frac{2 + \cos \pi - (2 + \cos 0)}{\pi - 0} = -\frac{2}{\pi}$$

(b) $[-\pi, \pi]$

$$\text{Respuesta.- } \frac{2 + \cos \pi - (2 - \cos \pi)}{\pi + \pi} = \frac{3 - 3}{2\pi} = 0$$

5. $R(\theta) = \sqrt{4\theta + 1}$; $[0, 2]$

$$\text{Respuesta.- } \frac{\sqrt{4 \cdot 2 + 1} + 1 - (\sqrt{4 \cdot 0 + 1} + 1)}{2 - 0} = \frac{2}{2} = 1$$

6. $P(\theta) = \theta^3 - 4\theta^2 + 5\theta$; $[1, 2]$

$$\text{Respuesta.- } \frac{2^3 - 4 \cdot 2^2 + 5 \cdot 2 - (1^3 - 4^2 + 5)}{2 - 1} = 0$$

Pendiente de una curva en un punto

En los ejercicios 7 a 14, utilice el método del ejemplo 3 para determinar *a*) la pendiente de la curva en el punto P dado, y *b*) la ecuación de la recta tangente en P

7. $y = x^2 - 5$, $P(2, -1)$

- a) Iniciamos con una recta secante que pasa por el punto $(2, -1)$ y el punto cercano $(2+h, (2+h)^2 - 5)$, luego hallamos la pendiente de la secante,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+h)^2 - 5 - (2^2 - 5)}{2+h-2} = \frac{4h+h^2}{h} = 4+h$$

Luego aproximamos h a 0 siendo la pendiente $m = 4$.

- b) La ecuación de la recta tangente viene dado por $y = mx + c$ de donde $y = 4x + c$, luego reemplazamos $(2, -1)$, quedándonos $-1 = 4 \cdot 2 + c \implies c = -9$. Por lo tanto

$$y = 4x - 9$$

8. $y = 7 - x^2$, $P(2, 3)$

- a) Sea la recta secante que pasa por el punto $P(2, 3)$ y el punto cercano $Q[2+h, 7 - (2+h)^2]$, hallamos la pendiente de la secante,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{7 - (2+h)^2 - (7 - 2^2)}{2+h-2} = \frac{7 - (2+h)^2 - 3}{h} = \frac{h(-h-4)}{h} = -h-4$$

Con forme Q se aproxima a P a lo largo de la curva, h se aproxima a cero, y la pendiente de la secante $-h-4$ se aproxima a -4 . Tomamos -4 como la pendiente de la parábola en P .

- b) La ecuación de la recta tangente viene dado por $y = mx + c$ de donde $y = -4x + c$, luego reemplazamos $(2, 3)$, así $3 = -4(2) + c \implies c = 11$. Por lo tanto

$$y = -4x + 11$$

9. $y = x^2 - 2x - 3$, $P(2, -3)$

- a) Sea la recta secante que pasa por el punto $P(2, -3)$ y el punto cercano $Q[2+h, (2+h)^2 - 2(2+h) - 3]$, hallamos la pendiente de la secante,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+h)^2 - 2(2+h) - 3 - (-3)}{h} = \frac{h^2 + 2h}{h} = h+2$$

Con forme Q se aproxima a P a lo largo de la curva, h se aproxima a cero, y la pendiente de la secante $h+2$ se aproxima a 2. Tomamos 2 como la pendiente de la parábola en P .

- b) La ecuación de la recta tangente viene dado por $y = mx + c$ de donde $y = 2x + c$, luego reemplazamos $(2, -3)$, así $-3 = 2(2) + c \implies c = -7$. Por lo tanto

$$y = 2x - 7$$

10. $y = x^2 - 4x$, $P(1, -3)$

- a) Sea la recta secante que pasa por el punto $P(1, -3)$ y el punto cercano $Q [1 + h, (1 + h)^2 - 4(1 + h)]$, hallamos la pendiente de la secante,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(1 + h)^2 - 4(1 + h) - (-3)}{1 + h - 1} = \frac{h^2 - 2h}{h} = h - 2$$

Conforme Q se aproxima a P a lo largo de la curva, h se aproxima a cero, y la pendiente de la secante $h - 2$ se aproxima a -2 . Tomamos -2 como la pendiente de la parábola en P .

- b) Tenemos

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = m = \frac{y - y_1}{x - x_1} \implies y - y_1 = m(x - x_1) \implies y = -2(x - 1) + (-3) \implies y = -2x + 2 - 3$$

por lo tanto

$$y = -2x - 1$$

11. $y = x^3$, $P(2, 8)$

- a) Sea la recta secante que pasa por el punto $P(2, 8)$ y el punto cercano $Q [2 + h, (2 + h)^3]$, hallamos la pendiente de la secante,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2 + h)^3 - 8}{2 + h - 2} = \frac{h^3 + 6h^2 + 12h}{h} = h^2 + 6h + 12$$

Conforme Q se aproxima a P a lo largo de la curva, h se aproxima a cero, y la pendiente de la secante $h^2 + 6h + 12$ se aproxima a 12. Tomamos 12 como la pendiente de la parábola en P .

- b) Tenemos

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = m = \frac{y - y_1}{x - x_1} \implies y = m(x - x_1) + y_1 \implies y = 12(x - 2) + 8 \implies y = 12x - 24 + 8$$

por lo tanto

$$y = 12x - 16$$

12. $y = 2 - x^3$, $P(1, 1)$

- a) Sea la recta secante que pasa por el punto $P(1, 1)$ y el punto cercano $Q [1 + h, 2 - (1 + h)^3]$, hallamos la pendiente de la secante,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2 - (1 + h)^3 - 1}{1 + h - 1} = \frac{h^3 + 3h^2 + 3h}{h} = h^2 + 3h + 3$$

Conforme Q se aproxima a P a lo largo de la curva, h se aproxima a cero, y la pendiente de la secante $h^2 + 3h + 3$ se aproxima a 3. Tomamos 3 como la pendiente de la parábola en P .

b) Tenemos

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = m = \frac{y - y_1}{x - x_1} \implies y = m(x - x_1) + y_1 \implies y = 3(x - 1) + 1 \implies y = 3x - 3 + 1$$

por lo tanto

$$y = 3x - 2$$

13. $y = x^3 - 12x$, $P(1, -11)$

a) Sea la recta secante que pasa por el punto $P(1, -11)$ y el punto cercano $Q[1 + h, (1 + h)^3 - 12(1 + h)]$, hallamos la pendiente de la secante,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(1 + h)^3 - 12(1 + h) + 11}{1 + h - 1} = \frac{h^3 + 3h^2 - 9h}{h} = h^2 + 3h - 9$$

Conforme Q se aproxima a P a lo largo de la curva, h se aproxima a cero, y la pendiente de la secante $h^2 + 3h - 9$ se aproxima a -9 . Tomamos -9 como la pendiente de la parábola en P .

b) Tenemos

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = m = \frac{y - y_1}{x - x_1} \implies y = m(x - x_1) + y_1 \implies y = -9(x - 1) - 11 \implies y = -9x + 9 - 11$$

por lo tanto

$$y = -9x - 2$$

14. $y = x^3 - 3x^2 + 4$, $P(2, 0)$

a) Sea la recta secante que pasa por el punto $P(2, 0)$ y el punto cercano $Q[2 + h, (2 + h)^3 - 3(2 + h)^2 + 4]$, hallamos la pendiente de la secante,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2 + h)^3 - 3(2 + h)^2 + 4 - 0}{2 + h - 2} = \frac{h^3 + 3h^2}{h} = h^2 + 3h$$

Conforme Q se aproxima a P a lo largo de la curva, h se aproxima a cero, y la pendiente de la secante $h^2 + 3h$ se aproxima a 0. Tomamos 0 como la pendiente de la parábola en P .

b) Tenemos

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = m = \frac{y - y_1}{x - x_1} \implies y = m(x - x_1) + y_1 \implies y = 0(x - 2) - 0$$

por lo tanto

$$y = 0$$

Razones instantáneas de cambio

- 15.** Rapidez de un automóvil. La siguiente figura muestra la gráfica tiempo-distancia de un automóvil deportivo que acelera desde el reposo.

- a) Determine las pendientes de la secante PQ_1, PQ_2, PQ_3 y PQ_4 , ordenándolas en una tabla como la de la figura 2.6.

Respuesta.-

Q	PQ
$Q_1(10, 220)$	$\frac{650 - 220}{20 - 10} = 43$
$Q_2(14, 380)$	$\frac{650 - 380}{20 - 14} = 45$
$Q_3(17, 480)$	$\frac{650 - 480}{20 - 16} = 43$
$Q_4(17, 550)$	$\frac{650 - 550}{20 - 18} = 50$

Los resultados anteriores son redondeados.

- b) Después estime la rapidez del automóvil para el tiempo $t = 20s$.

Respuesta.- Tomamos el punto mas cercano a P , en este caso Q_4 de donde la velocidad vendrá dado aproximadamente por $50m/s$.

- 16.** La siguiente figura muestra la gráfica de la distancia de caída libre contra el tiempo para un objeto que cae desde un módulo espacial que se encuentra a una distancia de 80 m de la superficie de la Luna.

- a) Estime las pendientes de las secantes PQ_1, PQ_2, PQ_3 y PQ_4 , ordenándolas en una tabla como la de la figura 2.6.

Respuesta.-

Q	PQ
$Q_1(5, 20)$	$\frac{80 - 20}{10 - 5} = 12$
$Q_2(7, 38)$	$\frac{80 - 38}{10 - 7} = 14$
$Q_3(8,5, 56)$	$\frac{80 - 56}{10 - 8,5} = 16$
$Q_4(9,5, 71)$	$\frac{80 - 71}{10 - 9,5} = 18$

- b) ¿Cuál será la rapidez aproximada del objeto cuando choca con la superficie de la Luna?

Respuesta.- Será de $18m/s$.

- 17.** En la siguiente tabla se registran las utilidades de una pequeña empresa en cada uno de sus primeros cinco años de operación:

- a) Trace los puntos que representan las utilidades como una función del año, y únalos mediante una curva suave.
- b) ¿Cuál es la razón promedio de incremento de las utilidades entre 2012 y 2014?

Respuesta.- $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{175 - 63}{2014 - 2012} = 56$

- c) Use su gráfica para estimar la razón a la que cambiaron las utilidades en 2012.

Respuesta.- Sea $\frac{63 - 26}{2012 - 2011} = 37$ y $\frac{112 - 63}{2013 - 2012} = 49$ entonces $\frac{37 + 49}{2} = 43$.

- 18.** Elabore una tabla de valores para la función $F(x) = (x+2)/(x-2)$ en los puntos $x = 1,2, x = 11/10, x = 101/100, x = 1001/1000, x = 10001/10000$ y $x = 1$

x	1,2	11/10	101/100	1001/1000	10001/10000	1
$F(x)$	-4	-31/9	-301/99	3001/999	30001/9999	-3

- a) Determine la razón promedio de cambio de $F(x)$ en los intervalos $[1, x]$ para cada $x \neq 1$ de su tabla.
- b) Si es necesario, amplíe su tabla para intentar determinar la razón de cambio de $F(x)$ en $x = 1$.

- 19.** Sea $g(x) = \sqrt{x}$ para $x \geq 0$

- a) Obtenga la razón promedio de cambio de $g(x)$ con respecto a x en los intervalos $[1, 2], [1, 1,5], [1, 1+h]$

Respuesta.- Para $[1, 2]$ se tiene $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\sqrt{2} - 1}{2 - 1} = \sqrt{2} - 1$.

Para $[1, 1,5]$ se tiene $\frac{\sqrt{1,5} - 1}{1,5 - 1} = \frac{\sqrt{1,5} - 1}{0,5}$.

Para $[1, 1+h]$ se tiene $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\sqrt{1+h} - 1}{1+h-1} = \frac{\sqrt{1+h} - 1}{h}$.

- b) Elabore una tabla de valores de la razón promedio de cambio de g con respecto a x en el intervalo $[1, 1+h]$ para algunos valores de h cercanos a cero, digamos, $h = 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001, 0,00001$ y $0,000001$.

Respuesta.-

h	0,1	0,01	0,001	0,0001	0,00001	0,000001
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0,488	0,4987	0,4998	0,49998	0,499998	0,4999998

- c) De acuerdo con su tabla, ¿cuál es la razón de cambio de $g(x)$ con respecto a x en $x = 1$?

Respuesta.- 0.5

- d) Calcule el límite, cuando h se aproxima a cero, de la razón promedio de cambio de $g(x)$ con respecto a x en el intervalo $[1, 1+h]$.

Respuesta.- 0.5

20. Sea $f(t) = 1/t$ para $t \neq 0$.

- a) Obtenga la razón promedio de cambio de f con respecto a t en los intervalos *i.* de $t = 2$ a $t = 3$, y *ii.* de $t = 2$ a $t = T$.

Respuesta.- Para *i.* se tiene $\frac{\Delta y}{\text{triangle } x} = \frac{1/3 - 1/2}{3 - 2} = -\frac{1}{6}$. Para *ii.* se tiene $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1/T - 1/2}{T - 2} = \frac{2 - T}{2T(T - 2)}$

- b) Elabore una tabla de valores de la razón promedio de cambio de f con respecto a t en el intervalo $[2, T]$ para algunos valores de T cercanos a 2, digamos, $T = 2,1, 2,01, 2,001, 2,0001, 2,00001, 2,000001$.

Respuesta.-

$2,1$	$2,01$	$2,001$	$2,0001$	$2,00001$	$2,000001$
$-0,238$	$-0,2487$	$-0,2498$	$-0,24998$	$-0,24999$	$-0,25$

- c) De acuerdo con su tabla, ¿cuál es la razón de cambio de f con respecto a t en $t = 2$?

Respuesta.- -0.25.

- d) Calcule el límite, cuando T se aproxima a 2, de la razón promedio de cambio de f con respecto a t en el intervalo de 2 a T . Tendrá que hacer algo de álgebra antes de que pueda sustituir $T = 2$.

Respuesta.- Por la parte a), *ii.* tenemos $\frac{2 - T}{2T(T - 2)}$ de donde $-\frac{1}{2T}$ y por lo tanto $-\frac{1}{4}$.

21. La siguiente gráfica muestra la distancia total s , que recorre un ciclista después de t horas.

- a) Estime la velocidad promedio del ciclista en los intervalos de tiempo $[0, 1]$, $[1, 2,5]$ y $[2,5, 3,5]$.

Respuesta.-

$[0, 1]$	$[1, 2,5]$	$[2,5, 3,5]$
15	3,33	10

- b) Estime la velocidad instantánea del ciclista en los tiempos $t = \frac{1}{2}$, $t = 2$ y $t = 3$. Respuesta.-

$\frac{1}{2}$	2	3
12	0	4

- c) Estime la velocidad máxima del ciclista y el tiempo específico en que ésta se registra.

Respuesta.- Tenemos la velocidad máxima dada por $\frac{30 - 20}{3,5 - 3} = 20$ en la hora 3,5.

- 22.** La siguiente gráfica muestra la cantidad total de gasolina A en el tanque de un automóvil después de conducirlo t días.

- a) Estime la razón promedio del consumo de gasolina en los intervalos de tiempo $[0, 3]$, $[0, 5]$ y $[7, 10]$.

Respuesta.-

$[0, 3]$	$[0, 5]$	$[7, 10]$
$-5/3$	$-2,24$	$0,5$

- b) Estime la razón instantánea de consumo de gasolina en los tiempos $t = 1$, $t = 4$ y $t = 8$. Respuesta.-

1	4	8
-1	-4	$-1/2$

- c) Estime la razón máxima de consumo de gasolina y el tiempo específico en que ésta se registra.

Respuesta.- con una razón de -4 , en el día 4.

1.2. Límites de una función y leyes de los límites

Teorema 1.1 Si L, M, c y k son números reales y

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad y \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M, \quad \text{entonces}$$

1. Regla de la suma: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = L + M$

2. Regla de la diferencia: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = L - M$

3. Regla del múltiplo constante: $\lim_{x \rightarrow c} [k \cdot f(x)] = k \cdot L$

4. Regla del producto: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$

5. Regla del cociente: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{L}{M}, M \neq 0$

6. Regla de la potencia: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n, n$ es un entero positivo

7. Regla de la raíz: $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L} = L^{1/n}, n$ es un entero positivo.

Teorema 1.2 (Límites de las funciones polinomiales) Si $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ entonces,

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$$

Teorema 1.3 (Límites de las funciones racionales) Si $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios, y $Q(c) \neq 0$, entonces,

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}.$$

Teorema 1.4 (El teorema del sándwich) *Suponga que $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para toda x en algún intervalo abierto que contenga a c , excepto posiblemente en $x = c$. Suponga también que*

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

entonces $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$.

Teorema 1.5 *Si $f(x) \leq g(x)$ para toda x en un intervalo abierto que contiene a c , excepto posiblemente en $x = c$, y los límites de f y g cuando x se aproxima a c , entonces,*

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

1.2. Ejercicios

Límites a partir de gráficas

1. Para la función $g(x)$ cuya gráficas a continuación, determine los siguientes límites o explique por qué no existen.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$.

Respuesta.- No existe. Cuando x se aproxima a 1 por la derecha, $g(x)$ se aproxima a 0. Cuando x se aproxima a 1 por la izquierda, $g(x)$ se aproxima a 1. No hay un número único L para el que todos los valores de $g(x)$ estén arbitrariamente cerca cuando $x \rightarrow 1$.

b) $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 2$.

c) $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 0$.

d) $\lim_{x \rightarrow 2,5} g(x) = 0,5$.

2. Para la función $f(t)$ cuya gráfica aparece a continuación, determine los siguientes límites o explique por qué no existen.

a) $\lim_{t \rightarrow -2} f(t) = 0$.

b) $\lim_{t \rightarrow -1} f(t) = -1$.

c) $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = 0$.

d) $\lim_{t \rightarrow -0,5} f(t) = -1.$

3. ¿Cuáles de los siguientes enunciados acerca de la función $y = f(x)$, cuya gráfica aparece a continuación, son verdaderos y cuáles son falsos?

a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ existe.

Respuesta.- Verdadero.

b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

Respuesta.- Verdadero.

c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

Respuesta.- Falso.

d) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$

Respuesta.- Falso.

e) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

Respuesta.- Falso.

f) $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe en todos los puntos c en $(-1, 1)$

Respuesta.- Verdadero.

g) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ no existe.

Respuesta.- Verdadero.

4. ¿Cuáles de los siguientes enunciados acerca de la función $y = f(x)$, cuya gráfica aparece a continuación, son verdaderos y cuáles son falsos?

a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ no existe.

Respuesta.- Falso.

b) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$

Respuesta.- Falso.

c) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ no existe.

Respuesta.- Verdadero.

d) $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe en todos los puntos c en $(-1, 1)$.

Respuesta.- Verdadero.

e) $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe en todos los puntos c en $(1, 3)$.

Respuesta.- Verdadero.

Existencia de límites

En los ejercicios 5 y 6, explique por qué los límites no existen.

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$.

Respuesta.- No existe ya que si x se aproxima a 1 por la derecha, $g(x)$ se aproxima a 0. Y cuando x se aproxima a 1 por la izquierda $g(x)$ se aproxima a 1. Por lo tanto no hay un número único L para que todos los valores de $g(x)$ estén arbitrariamente cerca cuando $x \rightarrow 1$.

6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$

Respuesta.- De similar manera al anterior ejercicio se tiene $L = \infty$ cuando x se aproxima por la izquierda. Y $L = -\infty$ cuando x se aproxima por la derecha.

7. Suponga que una función $f(x)$ está definida para todos los valores reales de x , excepto para $x = c$. ¿Qué puede decirse con respecto a la existencia de $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$? Justifique su respuesta.

Respuesta.- El límite existe debido a que x se aproxima a c tanto por la parte derecha como por la parte izquierda lo más que pueda, esto siempre y cuando sea un único L .

8. Suponga que una función $f(x)$ está definida para toda x en $[-1, 1]$. ¿Qué puede decirse con respecto a la existencia de $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$? Justifique su respuesta.

Respuesta.- De similar forma al ejercicio anterior el límite existe.

9. Si $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$, ¿debe estar definida f en $x = 1$? Si es así, ¿ $f(1)$ debe ser igual a 5? ¿Es posible concluir algo con respecto a los valores de f en $x = 1$? Explique.

Respuesta.- No necesariamente debe estar definida en $x = 1$. No necesariamente debe ser igual a 5. No es posible concluir algo concreto.

- 10.** Si $f(1) = 5$ ¿debe existir el $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$? Si es así. ¿ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ debe ser igual a 5? ¿Es posible concluir algo respecto del $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$? Explique.

Respuesta.- Si debería existir. Si debería ser igual a 5. Se puede concluir que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$.

Cálculo de límites

En los ejercicios 11 a 22, encuentre los límites.

11. $\lim_{x \rightarrow -3} (x^2 - 13) = -4.$

17. $\lim_{x \rightarrow -1/2} 4x(3x + 4)^2 = -\frac{25}{2}.$

12. $\lim_{t \rightarrow 2} (-x^2 + 5x - 2) = 12.$

18. $\lim_{y \rightarrow 2} \frac{y + 2}{y^2 + 5y + 6} = \frac{1}{5}.$

13. $\lim_{t \rightarrow 6} (t - 5)(t - 7) = -1.$

19. $\lim_{y \rightarrow -3} (5 - y)^{4/3} = 16.$

14. $\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 2x^2 + 4x + 8) = -16.$

20. $\lim_{z \rightarrow 4} \sqrt{z^2 - 10} = \sqrt{6}.$

15. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x + 5}{11 - x^3} = 3.$

21. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3h + 1} + 1} = \frac{3}{2}.$

16. $\lim_{s \rightarrow 2/3} (8 - 3s)(2s - 1) = 2.$

22. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5h + 4} - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5h + 4} - 2}{h} \cdot \frac{\sqrt{5h + 4} + 2}{\sqrt{5h + 4} + 2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5h}{h\sqrt{5h + 4} + 2} = \frac{5}{4}.$

Límites de cocientes Encuentre los límites en los ejercicios 23 a 42.

23. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{x^2 - 25} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{(x + 5)(x - 5)} = \frac{1}{10}.$

24. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x + 3}{x^2 + 4x + 3} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x + 3}{(x + 3)(x + 1)} = -\frac{1}{2}$

25. $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 + 3x - 10}{x + 5} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -5} \frac{(x + 5)(x - 2)}{x + 5} = -7$

$$26. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 5)(x - 2)}{x - 2} = -3$$

$$27. \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 + t - 2}{t^2 - 1} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t + 2)(t - 1)}{(t + 1)(t - 1)} = \frac{3}{2}$$

$$28. \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2 + 3t + 2}{t^2 - t - 2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(t + 2)(t + 1)}{(t - 2)(t + 1)} = -\frac{1}{3}$$

$$29. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x - 4}{x^3 + 2x^2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2(x + 2)}{x^2(x + 2)} = -\frac{1}{2}$$

$$30. \lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y^3 + 8^2}{3y^3 - 16y^2} \Rightarrow \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2(5y + 8)}{y^2(3^2 - 16)} = -\frac{1}{2}$$

$$31. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{-1} - 1}{x - 1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} -\frac{x + 1}{x(x + 1)} = -1$$

$$32. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}}{x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x(x^2 - 1)} = -2$$

$$33. \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4 - 1}{u^3 - 1} \Rightarrow \lim_{u \rightarrow 1} \frac{(u - 1)(u + 1)(u^2 + 1)}{(u - 1)(u^2 + u + 1)} = \frac{4}{3}$$

$$34. \lim_{u \rightarrow 2} \frac{u^3 - 8}{u^4 - 16} \Rightarrow \lim_{u \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)} = \frac{3}{8}$$

$$35. \lim_{u \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} \Rightarrow \lim_{u \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} \cdot \frac{\sqrt{2} + 3}{\sqrt{x} + 3} \Rightarrow \lim_{u \rightarrow 1} \frac{x - 9}{(x - 9)\sqrt{x} + 3} = \frac{1}{4}$$

$$36. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x - x^2}{2 - \sqrt{x}} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-x(x - 4)}{2 - \sqrt{x}} \cdot \frac{2 + \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-x(x - 4)(2 + \sqrt{x})}{4 - x} = -16$$

$$37. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x + 3} - 2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x + 3} - 2} \cdot \frac{\sqrt{x + 3} + 2}{\sqrt{x + 3} + 2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(\sqrt{x + 3} + 2)}{x - 1} = 4$$

$$38. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 8} + 3}{\sqrt{x^2 + 8} + 3} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x + 1)(\sqrt{x^2 + 8} + 3)} = -\frac{1}{3}$$

$$39. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 12} - 4}{x - 2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 12} - 4}{x - 2} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 12} + 4}{\sqrt{x^2 + 12} + 4} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(\sqrt{x^2 + 12} + 4)} = \frac{1}{2}$$

$$40. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}-3} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}-3} \cdot \frac{\sqrt{x^2+5}+3}{\sqrt{x^2+5}+3} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(\sqrt{x^2+5}+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{3}{2}$$

$$41. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2-\sqrt{x^2-5}}{x+3} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2-\sqrt{x^2-5}}{x+3} \cdot \frac{2+\sqrt{x^2-5}}{2+\sqrt{x^2-5}} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -3} \frac{-(x-3)(x+3)}{(x+3)(2+\sqrt{x^2-5})} = \frac{3}{2}$$

$$42. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{4-x}{5-\sqrt{x^2+9}} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 4} \frac{4-x}{5-\sqrt{x^2+9}} \cdot \frac{5+\sqrt{x^2+9}}{5+\sqrt{x^2+9}} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(4-x)(5+\sqrt{x^2+9})}{(4-x)(x+4)} = \frac{5}{4}$$

Límites con funciones trigonométricas En los ejercicios 43 a 50, encuentre los límites.

$$43. \lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x - 1) = -1$$

$$47. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x+\sin x}{3 \cos x} = \frac{1}{3}$$

$$44. \lim_{x \rightarrow \pi/4} \sin^2 x = \frac{1}{2}$$

$$48. \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - 1)(2 - \cos x) = -1$$

$$45. \lim_{x \rightarrow 0} \sec x = 1$$

$$49. \lim_{x \rightarrow -\pi} \sqrt{x+4} \cos(x+\pi) = \sqrt{4-\pi}$$

$$46. \lim_{x \rightarrow \pi/3} \tan x = \sqrt{3}$$

$$50. \lim_{x \rightarrow 0} = \sqrt{7 + \sec^2 x} = \sqrt{7 + \frac{1}{\cos^2 0}} = \sqrt{8}$$

Aplicaciones de las reglas de los límites.

51. Suponga que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -5$. Señale cuáles reglas del teorema 1 se emplean para obtener los pasos a), b) y c) del siguiente cálculo.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - g(x)}{(f(x) + 7)^{2/3}} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (2f(x) - g(x))}{\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7)^{2/3}} && \text{regla del cociente.} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 2f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{\left[\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7) \right]^{2/3}} && \text{regla de diferencia y de potencia.} \\ &= \frac{2 \lim_{x \rightarrow 0} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{\left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} 7 \right)^{2/3}} && \text{regla de la suma y múltiplo constante.} \\ &= \frac{2 \cdot 1 - (-5)}{(1 + 7)^{2/3}} = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

- 52.** Sean $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 5$, $\lim_{x \rightarrow 1} p(x) = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 1} r(x) = 2$. Señale cuáles reglas del teorema 1 se emplean para obtener los pasos a), b) y c) del siguiente cálculo.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5h(x)}}{p(x)(4-r(x))} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{5h(x)}}{\lim_{x \rightarrow 1} \{p(x)[4-r(x)]\}} && \text{regla del cociente.} \\
 &= \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} 5h(x)}}{\left[\lim_{x \rightarrow 1} p(x) \right] \left[\lim_{x \rightarrow 1} (4-r(x)) \right]} && \text{regla de la raíz y del producto.} \\
 &= \frac{\sqrt{5 \lim_{x \rightarrow 1} h(x)}}{\left[\lim_{x \rightarrow 1} p(x) \right] \left[\lim_{x \rightarrow 1} 4 - \lim_{x \rightarrow 1} r(x) \right]} && \text{regla de la diferencia y múltiplo constante.} \\
 &= \frac{\sqrt{5 \cdot 5}}{1(4-2)} = \frac{5}{2}
 \end{aligned}$$

- 53.** Suponga que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 5$ y $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -2$. Encuentre

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) &\implies \lim_{x \rightarrow c} f(x) \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 5 \cdot (-2) = -10 \\
 \text{b) } \lim_{x \rightarrow c} 2f(x)g(x) &\implies 2 \left(\lim_{x \rightarrow c} f(x) \lim_{x \rightarrow c} g(x) \right) = 2(-10) = -20 \\
 \text{c) } \lim_{x \rightarrow c} (f(x) + 3g(x)) &\implies \lim_{x \rightarrow c} f(x) + 3 \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 5 + 3 \cdot (-2) = -1. \\
 \text{d) } \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{f(x) - g(x)} &\implies \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x)} = \frac{5}{5 + 2} = \frac{5}{7}.
 \end{aligned}$$

- 54.** Suponga que $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = -3$. Encuentre

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \lim_{x \rightarrow 4} (g(x) + 3) &\implies \lim_{x \rightarrow 4} g(x) + \lim_{x \rightarrow 4} 3 = -3 + 3 = 0. \\
 \text{b) } \lim_{x \rightarrow 4} xf(x) &\implies \lim_{x \rightarrow 4} x \cdot \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 4 \cdot 0 = 0. \\
 \text{c) } \lim_{x \rightarrow 4} (g(x))^2 &= (-3)^2 = 9 \\
 \text{d) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{g(x)}{f(x) - 1} &\implies \frac{\lim_{x \rightarrow 4} g(x)}{\lim_{x \rightarrow 4} f(x) - \lim_{x \rightarrow 4} 1} = \frac{-3}{0 - 1} = 3.
 \end{aligned}$$

- 55.** Suponga que $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = 7$ y $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = -3$. Encuentre

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow b} (f(x) + g(x)) \implies \lim_{x \rightarrow b} f(x) + \lim_{g(x)} = 7 + (-3) = 4.$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow b} f(x) \cdot g(x) \implies \lim_{x \rightarrow b} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow b} g(x) = 7 \cdot (-3) = -21.$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow b} 4g(x) \implies \lim_{x \rightarrow b} 4 \cdot \lim_{x \rightarrow b} g(x) = 4 \cdot (-3) = -12$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow b} f(x)/g(x) \implies \frac{\lim_{x \rightarrow b} f(x)}{\lim_{x \rightarrow b} g(x)} = -\frac{7}{3}.$$

56. Suponga que $\lim_{x \rightarrow -2} p(x) = 4$, $\lim_{x \rightarrow -2} r(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow -2} s(x) = -3$. Encuentre

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow -2} (p(x) + r(x) + s(x)) \implies \lim_{x \rightarrow -2} p(x) + \lim_{x \rightarrow -2} r(x) + \lim_{x \rightarrow -2} s(x) = 4 + 0 + (-3) = 1.$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -2} p(x) \cdot r(x) \cdot s(x) \implies \lim_{x \rightarrow -2} p(x) \cdot \lim_{x \rightarrow -2} r(x) \cdot \lim_{x \rightarrow -2} s(x) = 4 \cdot 0 \cdot (-3) = 0.$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow -2} (-4p(x) + 5r(x))/s(x) \implies \frac{-4 \cdot \lim_{x \rightarrow -2} p(x) + 5 \lim_{x \rightarrow -2} r(x)}{\lim_{x \rightarrow -2} s(x)} = \frac{-4 \cdot 4 + 5 \cdot 0}{-3} = \frac{16}{3}.$$

Límites de razones promedio de cambio.

Debido a la relación que existe entre rectas secantes, tangentes y razones instantáneas, límites de la forma

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

aparecen a menudo en cálculo. En los ejercicios 57 a 62, evalúe este límite para el valor de x y la función f dados.

57. $f(x)x^2$, $x = 1$.

$$\text{Respuesta.- } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \implies \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} \implies \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2h+h)}{2} = 2$$

58. $f(x) = x^2$, $x = -2$

$$\text{Respuesta.- } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h-2)^2 - (-2)^2}{h} \implies \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 - 4h + 4 - 4}{h} \implies \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h-4)}{h} = -4.$$

59. $f(x) = 3x - 4$, $x = 2$

$$\text{Respuesta.- } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h) - 4 - (3x - 4)}{h} \implies \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x + 3h - 4 - 3x + 4}{h} = 3.$$

60. $f(x) = 1/x$, $x = -2$

Respuesta.- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1/(x+h) - 1/x}{h} \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x-x-h}{x(x+h)}}{h} \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{1}{x^2+xh} = -\frac{1}{4}.$

61. $f(x) = \sqrt{x}$, $x = 7$

Respuesta.- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{7}}.$

62. $f(x) = \sqrt{3x+1}$, $x = 0$

Respuesta.- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3(x+h)+1} - \sqrt{3x+1}}{h} \cdot \frac{\sqrt{3(x+h)+1} + \sqrt{3x+1}}{\sqrt{3(x+h)+1} + \sqrt{3x+1}} \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x+3h+1-3x-1}{h\sqrt{3(x+h)+1} + \sqrt{3x+1}} = \frac{3}{2}.$

Aplicación del teorema del sándwich.

63. Si $\sqrt{5-2x^2} \leq f(x) \leq \sqrt{5-x^2}$ para $-1 \leq x \leq 1$, determine $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Respuesta.- Sea $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{5-2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{5-x^2} = \sqrt{5}$ entonces $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \sqrt{5}.$

64. Si $2-x^2 \leq g(x) \leq 2\cos x$, determine $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.

Respuesta.- Sea $\lim_{x \rightarrow 0} 2-x^2 = 2 = \lim_{x \rightarrow 0} 2\cos x$, por lo tanto $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 2.$

65. a) Es posible demostrar que las desigualdades

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x \sen x}{2 - 2 \cos x} < 1$$

son válidas para todos los valores de x cercanos a cero. ¿Se puede decir algo acerca del

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sen x}{2 - 2 \cos x}?$$

justifique su respuesta.

Respuesta.- Si $\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \frac{x^2}{6} = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$ entonces por la ley del sandwich tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sen x}{2 - 2 \cos x} = 1$$

b) Dibuje en una misma gráfica $y = 1 - (x^2/6)$, $y = (x \sen x)/(2 - 2 \cos x)$ e $y = 1$ para $-2 \leq x \leq 2$. Comente sobre el comportamiento de las gráficas cuando $x \rightarrow 0$.

Respuesta.- Cuando x tiende a 0 las tres funciones suscitada tienden a 1.

66. (a) Suponga que las desigualdades

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2}$$

Son válidas para los valores de x cercanos a cero. (Así sucede, como véra la sección 9.9). ¿Qué se puede decir, si acaso, acerca del

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}?$$

Justifique su respuesta.

Respuesta.- Sea $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} = \frac{1}{2}$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ entonces por la ley del sandwich se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

(b) Grafique juntas las ecuaciones $y = (1/2) - (x^2/24)$, $y = (1 - \cos x)/x^2$, y $y = 1/2$ para $-2 \leq x \leq 2$. Comente sobre el comportamiento de las gráficas cuando $x \rightarrow 0$.

Respuesta.- Cuando x tiende a 0 las tres funciones tienden a $\frac{1}{2}$.

Estimación de límites.

67. Sea $f(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$.

a) Elabore una tabla con los valores de f en los puntos $x = -3, 1, 3.01, -3.0001$, y así hasta donde lo permita su calculadora. Después, estime $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$. ¿Qué estimación obtendrá si ahora evalúa f en $x = -2.9, .2.99, -2.999...$?

Respuesta.-

x	-3.1	.3.01	-3.001	-3.0001	-3.00001	-3.000001
f(x)	-6.1	-6.01	-6.001	-6.0001	-6.00001	-6.000001

b) Apoye las conclusiones a las que llegó en el inciso a) graficando f cerca de $c = -3$ y empleando las funciones Zoom y Trace de su calculadora para estimar los valores y de la gráfica cuando $x \rightarrow -3$.

c) Determine $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ algebraicamente como en el ejemplo 7.

Respuesta.-

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} \implies \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = 6$$

Los ejercicios 68 al 74 son similares al ejercicio 67.

Teoría y ejemplos.

- 75.** Si $x^4 \leq f(x) \leq x^2$ para x en $[-1, 1]$ y $x^2 \leq f(x) \leq x^4$ para $x < -1$ y $x > 1$. ¿en qué puntos c conocemos automáticamente $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$? ¿Qué se puede decir sobre el valor del límite en esos puntos?.

Respuesta.- $c = 0, 1, -1$; el límite es 0 en $c = 0$, y 1 en $c = 1, -1$.

- 68.** Suponga que $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para toda $x \neq 2$, y suponga que

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} h(x) = -5$$

¿Puede concluirse algo acerca de los valores de f, g y h en $x = 2$? ¿Es posible que $f(2) = 0$? ¿Es posible que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$? Justifique sus respuestas.

Respuesta.- No se puede concluir nada acerca los valores de f, g, h en $x = 2$. Luego $f(2)$ podría ser 0. Luego por el teorema del sandwich se satisface $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -5 \neq 0$.

69.