

Universidad: **Mayor de San Andrés.**  
 Asignatura: **Geometría II.**  
 Práctica: 1.  
 Alumno: **PAREDES AGUILERA CHRISTIAN LIMBERT.**

---

**Ejercicio 1. Encontrar el punto final de  $\vec{a} = (7, 6)$  si el punto inicial es  $P_0(2, -1)$ .**

**Respuesta.-** Sea  $\vec{a} = P_1 - P_0$  y  $P_1 = (x, y)$ , entonces podemos hallar los vectores de la siguiente manera,

$$x - 2 = 7 \quad ; \quad y + 1 = 6$$

de donde  $x = 9$ ,  $y = 5$  y por lo tanto

$$P_1 = (9, 5)$$

**Ejercicio 2. Sean  $\vec{u} = (1, 3)$ ,  $\vec{v} = (2, 1)$  y  $\vec{w} = (4, -1)$ . Encontrar las componentes del vector  $\vec{x}$  que satisfacen  $2\vec{u} - \vec{v} + \vec{x} = 7\vec{x} + \vec{w}$ .**

**Respuesta.-** Despejando  $\vec{x}$  obtenemos

$$6\vec{x} = 2\vec{u} - \vec{v} - \vec{w} \quad \Rightarrow \quad 6\vec{x} = (2, 6) - (2, 1) - (4, -1)$$

de donde

$$6\vec{x} = (0, 5) - (4, -1) \quad \Rightarrow \quad 6\vec{x} = (-4, 6) \quad \Rightarrow \quad \vec{x} = \left(-\frac{2}{3}, 1\right)$$

**Ejercicio 3. Demuéstrese que:  $0\vec{x} = \vec{0}$  y  $r\vec{0} = \vec{0}$ .**

**Demostración.-** sea  $\vec{x} \in V_n$  entonces  $0\vec{x} = 0(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , luego por la multiplicación de un número real por un vector tenemos,

$$0\vec{x} = (0 \cdot x_1, 0 \cdot x_2, \dots, 0 \cdot x_n) = (0, 0, \dots, 0)$$

y por lo tanto se demuestra que  $0\vec{x} = \vec{0}$ . Por otro lado sea  $r \in \mathbb{R}$ , por lo tanto

$$r\vec{0} = r(0, 0, \dots, 0) = (r \cdot 0, r \cdot 0, \dots, r \cdot 0) = (0, 0, \dots, 0)$$

de modo que

$$r\vec{0} = \vec{0}$$

**Ejercicio 4. Demuéstrese que:**

a) Si  $\vec{a} + \vec{b} = \vec{a} + \vec{c} \quad \Rightarrow \quad \vec{b} = \vec{c}$ .

**Demostración.-** Sea  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_n$ , entonces por el inverso aditivo e hipótesis tenemos

$$\begin{array}{lcl} \vec{b} & = & (\vec{b} + \vec{a}) - \vec{a} \\ & = & (\vec{a} + \vec{b}) - \vec{a} \\ & = & (\vec{a} + \vec{c}) - \vec{a} \\ & = & \vec{c} + (\vec{a} - \vec{a}) \\ & = & \vec{c} \end{array} \quad \left| \quad \vec{a} + \vec{b} = \vec{a} + \vec{c} \right.$$

b) Si  $r\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow r = 0 \vee \vec{x} = \vec{0}$ .

**Demostración.-** Será lo mismo demostrar  $r\vec{x} = \vec{0} \wedge r \neq 0 \Rightarrow \vec{x} = \vec{0}$ .

Sea  $r \in \mathbb{R}$  y  $\vec{x} \in V_n$ , entonces

$$r\vec{x} = 0 \text{ implica que } \vec{x} = \frac{\vec{0}}{r}, \text{ ya que } r \neq 0.$$

Luego se sigue que

$$\vec{x} = \vec{0}$$

c) Si  $r\vec{x} = s\vec{x} \wedge \vec{x} \neq \vec{0} \Rightarrow r = s$ .

**Demostración.-** Reescribiendo se tiene: Si  $r\vec{x} = s\vec{x} \wedge r \neq s \Rightarrow \vec{x} = \vec{0}$ .

De donde se tiene

$$\vec{x} = (r - s)\vec{x} \Rightarrow \vec{x} = r\vec{x} - s\vec{x} \text{ ya que } r \neq s,$$

por lo tanto

$$\vec{x} = r(\vec{x} - \vec{x}).$$

Aplicando la unicidad y existencia del inverso aditivo, se sigue

$$\vec{x} = r(0) \Rightarrow \vec{x} = 0.$$

**Ejercicio 5. Demostrar que si  $\vec{c} \neq 0$  y si  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  son paralelos a  $\vec{c}$ , entonces  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  son paralelos. (Vectores paralelos a un mismo vector no nulo son paralelos entre sí).**

**Demostración.-** Sea  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_n$ . Por definición de vectores paralelos se tiene

$$r_1\vec{a} = \vec{c} \text{ y } r_2\vec{b} = \vec{c}$$

de donde

$$r_1\vec{a} = r_2\vec{b},$$

en vista de que  $r_1 \cdot r_2 \neq 0$  entonces

$$\vec{b} = r_1 r_2^{-1} \vec{a},$$

por lo tanto se concluye que  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  son paralelos entre sí.

**Ejercicio 6. Hallar todos los vectores ortogonales a:**

a) **(3, 6)**

**Respuesta.-** Sea  $(r_1, r_2)$  un vector, entonces para hallar vectores paralelos a  $(3, 6)$  utilizamos la definición como sigue,

$$\begin{aligned}(3, 6) \circ (r_1, r_2) &= 0 \\ 3r_1 + 6r_2 &= 0 \\ 3(r_1 + 2r_2) &= 0 \\ r_1 + 2r_2 &= 0 \\ r_1 &= -2r_2\end{aligned}$$

de donde tomamos valores para  $r_2$ , reemplazamos en (1) y obtendremos  $n$  vectores paralelos a  $(3, 6)$ .

b) **(2, -1).**

**Respuesta.-** Análogamente al inciso a) tenemos

$$\begin{aligned}(2, -1) \circ (r_1, r_2) &= 0 \\ 2r_1 + (-r_2) &= 0 \\ r_1 &= \frac{1}{2}r_2\end{aligned}$$

de igual forma al anterior inciso, tomamos valores para  $r_2$ , y hallamos  $n$  valores ortogonales a  $(2, -1)$ .

c) **(2, 3, -1)**

**Respuesta.-** Sea  $(r_1, r_2, r_3)$  un vector en  $V_3$ , entonces,

$$\begin{aligned}(2, 3, -1) \circ (r_1, r_2, r_3) &= 0 \\ 2r_1 + 3r_2 - r_3 &= 0 \\ r_1 &= (r_3 - 3r_2)/2\end{aligned}\quad (1)$$

luego reemplazamos valores a  $r_3$  y  $r_2$  en (1), de donde obtendremos vectores ortogonales a  $(2, 3, -1)$ .

d)  **$(a_1, a_2)$**

**Respuesta.-** Análogo a los anteriores incisos se tiene,

$$(a_1, a_2) \circ (r_1, r_2) = 0 \Rightarrow a_1r_1 + a_2r_2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} a_1 = -a_2r_2/r_1 \\ a_2 = -a_1r_1/r_2 \\ r_1 = -a_2r_2/a_1 \\ r_2 = -a_1r_1/a_1 \end{cases}$$

**Ejercicio 7. Encontrar un vector que sea ortogonal tanto a  $\vec{u}$  como a  $\vec{v}$ .**

a)  $\vec{u} = -7\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$ ,  $\vec{v} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{k}$ .

**Respuesta.-**

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 7 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} k \\ &= (3 \cdot 4 - 1 \cdot 0)i - (7 \cdot 4 - 2 \cdot 1)j + (7 \cdot 0 - 3 \cdot 2)k.\end{aligned}$$

Por lo tanto el vector que deseamos encontrar es

$$\vec{u} \times \vec{v} = (12, -26, -6)$$

b)  $\vec{u} = (-1, -1, -1), \quad \vec{v} = (2, 0, 2)$

**Respuesta.-**

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

de donde

$$\vec{u} \times \vec{v} = -2i + 2k = (-2, 0, 2)$$

**Ejercicio 8. Encontrar todos los vectores posibles de longitud 1 ortogonales tanto a  $\vec{a} = (3, -2, 1)$  como a  $\vec{b} = (-2, 1, -3)$ .**

**Respuesta.-** Partamos encontrando el producto vectorial de los vectores  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$ .

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 5i + 7j - k = (5, 7, -1).$$

Esto nos garantiza que el vector  $\vec{a} \times \vec{b}$  es ortogonal tanto a  $\vec{a}$ , como a  $\vec{b}$ . Luego podemos encontrar cualquier vector de longitud 1 dividiendo el vector por su modulo. Es decir,

$$\frac{\vec{a} \times \vec{b}}{\|\vec{a} \times \vec{b}\|} = 1.$$

de donde,

$$\frac{\vec{a} \times \vec{b}}{\|\vec{a} \times \vec{b}\|} = \frac{(5, 7, -1)}{\sqrt{5^2 + 7^2 + 1^2}} = \frac{(5, 7, -1)}{5\sqrt{3}} = \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{7}{5\sqrt{3}}, -\frac{1}{5\sqrt{3}} \right).$$

Por lo tanto los vectores de longitud 1 ortogonales a  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$ , son

$$\left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{7}{5\sqrt{3}}, -\frac{1}{5\sqrt{3}} \right) \quad \text{y} \quad \left( -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{7}{5\sqrt{3}}, \frac{1}{5\sqrt{3}} \right)$$

El segundo vector cumple con la condición, ya que es el vector contrario a  $\left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{7}{5\sqrt{3}}, -\frac{1}{5\sqrt{3}} \right)$ .

**Ejercicio 9. Sean  $\vec{a} = ti + j$  y  $\vec{b} = 4i + 3j$ . Encontrar el valor de  $t$  tal que**

a)  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  sean ortogonales.

**Respuesta.-** Sea  $\vec{a} = ti + j = (t, 1)$  y  $\vec{b} = 4i + 3j = (4, 3)$ , entonces por definición de ortogonalidad tenemos

$$\vec{a} \circ \vec{b} = 0 \Rightarrow 4t + 3 = 0 \Rightarrow t = -3/4$$

b) El ángulo entre  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  sea  $\pi/4$ .

**Respuesta.-** Aplicando  $\vec{a} \circ \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos(\pi/4)$  tenemos,

$$4t + 3 = \sqrt{t^2 + 1} \cdot \sqrt{25} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow (4t^2 + 3)^2 = (t^2 + 1) \cdot \frac{25}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

de donde,

$$7t^2 + 48 - 7 = 0.$$

Por lo tanto,

$$t = \frac{1}{7} \quad \text{o} \quad t = -7$$

c) El ángulo entre  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  sea  $\pi/6$ .

**Respuesta.-** Análoga al anterior ejercicio tenemos

$$4t + 3 = \sqrt{t^2 + 1} \cdot \sqrt{25} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow (4t^2 + 3)^2 = (t^2 + 1) \cdot \frac{25}{2} \cdot \frac{3}{4} \Rightarrow -11t^2 + 96t - 39 = 0$$

de donde

$$t = \frac{48 + 25\sqrt{3}}{11} \quad \text{o} \quad t = \frac{48 - 25\sqrt{3}}{11}$$

d)  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  sean paralelos.

**Respuesta.-** Sea  $\vec{a} = (t, 1)$  y  $\vec{b} = (4, 3)$  entonces por definición de vectores paralelos tenemos que

$$\vec{a} = c\vec{b} \Rightarrow (t, 1) = c(4, 3) \Rightarrow (t, 1) = (4c, 3c)$$

de donde

$$t = 4c \quad \text{y} \quad 1 = 3c$$

por lo tanto  $c = \frac{1}{3}$ . Se sigue

$$t = \frac{4}{3}$$

**Ejercicio 10.** Los vectores  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  forman un ángulo de  $60^\circ$  con  $\|\vec{a}\| = 5$ ,  $\|\vec{b}\| = 8$ . Determinar  $\|\vec{a} - \vec{b}\|$  y  $\|\vec{a} + \vec{b}\|$ .

**Respuesta.-** Sea

$$\|\vec{a} \pm \vec{b}\|^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 \pm 2\|\vec{a}\|\|\vec{b}\| \cos \theta$$

entonces se tiene,

$$\|a \pm b\|^2 = 5^2 + 8^2 \pm 2 \cdot 5 \cdot 8 \cos \left( 60 \cdot \frac{\pi}{180} \right)$$

por lo tanto

$$\|\vec{a} - \vec{b}\| = 7 \quad \text{y} \quad \|\vec{a} + \vec{b}\| = \sqrt{129}$$

**Ejercicio 11.** Los vectores  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  forman un ángulo de  $30^\circ$  con  $\|\vec{a}\| = 1$ ,  $\|\vec{b}\| = \sqrt{3}$ . Calcular el ángulo formado por los vectores  $\vec{a} + \vec{b}$ ,  $\vec{a} - \vec{b}$ .

**Respuesta.-** Por el teorema de los cosenos, calculamos

$$\|\vec{a} - \vec{b}\|^2 = 1^2 + \sqrt{3}^2 - 2\sqrt{3}\cos 30 = 4 \Rightarrow \|\vec{a} - \vec{b}\| = 2.$$

Luego calculamos el ángulo  $\alpha$  asociado a  $\vec{a}$  y  $\vec{a} - \vec{b}$  de donde,

$$\cos \alpha = \frac{\|\vec{a}\|}{\|\vec{a} - \vec{b}\|} \Rightarrow \alpha = \arccos \left( \frac{\|\vec{a}\|}{\|\vec{a} - \vec{b}\|} \right) = \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3} = 60^\circ.$$

Sea  $a + b$  la diagonal del paralelogramo formado por los lados  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  entonces, el ángulo de  $a + b$  estará dado por  $15^\circ$ . Por lo tanto  $a + b$  y  $a - b$  forman un ángulo de,

$$180 - 60 - 15 = 105^\circ.$$

**Ejercicio 12.** Dados dos vectores  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  que satisfacen la condición  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$  y sabiendo que  $\|\vec{a}\| = 3$ ,  $\|\vec{b}\| = 1$ ,  $\|\vec{c}\| = 4$ . Calcular  $\vec{a} \circ \vec{b} + \vec{b} \circ \vec{c} + \vec{a} \circ \vec{c}$

**Respuesta.-** Si  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$  entonces

$$0 = \|\vec{0}\|^2 = \|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}\|^2.$$

Luego,


$$\begin{aligned} 0 = \|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}\|^2 &= \|\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})\|^2 \\ &= \|\vec{a}\|^2 + 2[\vec{a} \circ (\vec{b} + \vec{c})] + \|\vec{b} + \vec{c}\|^2 \\ &= \|\vec{a}\|^2 + 2\vec{a} \circ \vec{b} + 2\vec{a} \circ \vec{c} + \|\vec{b}\|^2 + 2\vec{b} \circ \vec{c} + \|\vec{c}\|^2 \\ &= \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 + \|\vec{c}\|^2 + 2(\vec{a} \circ \vec{b} + \vec{a} \circ \vec{c} + \vec{b} \circ \vec{c}) \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\vec{a} \circ \vec{b} + \vec{a} \circ \vec{c} + \vec{b} \circ \vec{c} = -\frac{\|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 + \|\vec{c}\|^2}{2} = -\frac{3^2 + 1^2 + 4^2}{2} = -13.$$

**Ejercicio 13.** Dados los puntos  $P(3, 4)$ ,  $Q(1, 1)$  y  $R(5, 2)$ , usar métodos vectoriales para encontrar las coordenadas del cuarto vértice del paralelogramo cuyo lados adyacentes son  $\vec{PQ}$  y  $\vec{QR}$ .

**Respuesta.-** Grafiquemos la idea.



Sea  $S$  el vértice a encontrar. Entonces, por las características de un paralelogramo tenemos

$$\vec{QR} = \vec{PS},$$

por lo tanto

$$\begin{aligned}(1-1)-(5,2) &= (3,4)-S \Rightarrow S = (3,4)-(-4,-1) \\ S &= (7,5).\end{aligned}$$

**Ejercicio 14. Demostrar que  $(4, 5, 2)$ ,  $(4, 7, 9)$ ,  $(8, 5, -6)$  son los vértices de un triángulo equilátero.**

**Respuesta.-** Si  $(4, 5, 2)$ ,  $(4, 7, 9)$ ,  $(8, 5, -6)$  son los vértices de un triángulo equilátero, podemos hallar las longitudes de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\|\vec{a}\| &= \|(4, 7, 9) - (4, 5, 2)\| = \|(0, 2, 7)\| = \sqrt{53}. \\ \|\vec{b}\| &= \|(8, 5, -6) - (4, 7, 9)\| = \|(4, -2, -15)\| = \sqrt{245}. \\ \|\vec{c}\| &= \|(8, 5, -6) - (4, 5, 2)\| = \|(4, 0, -8)\| = \sqrt{80}.\end{aligned}$$

Luego, calculando el ángulo entre dos de los vectores encontrados, tenemos

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|} = \frac{0 \cdot 4 + 2 \cdot (-2) + 7 \cdot (-15)}{\sqrt{53}\sqrt{245}} \Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{-109}{\sqrt{53}\sqrt{245}}\right) = 163^\circ$$

El cual contradice la proposición dada, ya que un triángulo equilátero tiene sus ángulos igual a  $60^\circ$ .


Podemos refutar la proposición dada de otra forma.

Supongamos que las distancias entre  $A, B$  y  $C$  son iguales, lo que implica que

$$\|\vec{a}\| = \|\vec{b}\| = \|\vec{c}\|.$$

Ya que  $\|\vec{a}\| \neq \|\vec{b}\|$  se concluye que los puntos dados no son los vértices de un triángulo equilátero.

Veamos este hecho gráficamente.



**Ejercicio 15. Demostrar que**

a)  $(2, 1, 6)$ ,  $(4, 7, 9)$  y  $(8, 5, -6)$  son los vértices de un triángulo rectángulo.

**Respuesta.-** Para demostrar que los puntos dados son vértices de un triángulo rectángulo, primero hallemos los vectores asociados, de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= (4, 7, 9) - (2, 1, 6) = (2, 6, 3) \\ \vec{b} &= (8, 5, -6) - (4, 7, 9) = (4, -2, -15) \\ \vec{c} &= (8, 5, -6) - (2, 1, 6) = (6, 4, -12)\end{aligned}$$

Luego, por definición de paralelismo de vectores, vemos que no existe un escalar  $r \in \mathbb{Z}$  tal que

$$\vec{a} = r\vec{b}.$$

Es decir,

$$\begin{cases} 2 &= 4r \\ 1 &= -2r \\ 6 &= -15r \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r &= \frac{1}{2} \\ r &= -\frac{1}{2} \\ r &= -\frac{6}{15} \end{cases}$$

Así, podemos afirmar que los puntos dados corresponden a los vértices de un triángulo. Luego, para saber si este triángulo es rectángulo solo debemos hallar dos vectores ortogonales, como sigue:

$$\vec{a} \circ \vec{c} = (2, 6, 3) \circ (6, 4, -12) = 2 \cdot 6 + 6 \cdot 4 + 3 \cdot (-12) = 0$$

Por lo tanto, los puntos dados son vértices de un triángulo rectángulo.

b) **¿En cuál de los vértices está el ángulo de  $90^\circ$ ?**

**Respuesta.-** Se encuentra en el vértice  $(2, 1, 6)$ . Esto por el desarrollo del anterior ejercicio.

c) **Encontrar el área del triángulo.**

**Respuesta.-** Se sabe que el área de un triángulo rectángulo es igual a la mitad del producto de sus catetos. Por lo tanto, el área del triángulo es igual a:

$$A = \frac{1}{2} \|\vec{a} \times \vec{c}\|$$

De donde,

$$\|\vec{a} \times \vec{c}\| = \|[6 \cdot (-12) - 3 \cdot 4; 3 \cdot 6 - 2 \cdot (-12); 2 \cdot 4 - 6 \cdot 6]\| = \|-84, 42, -28\| = 98.$$

Por lo tanto,

$$A = \frac{98}{2} = 49.$$

**Ejercicio 16.** Sean  $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}$ . Demuéstrese que  $\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 - \|\vec{a}^2 - \vec{b}\|^2 = 4\vec{a} \circ \vec{b}$ .

**Demostración.-** Sabemos que

$$\|\vec{a} \pm \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 \pm 2\vec{a} \circ \vec{b} + \|\vec{b}\|^2$$


Por lo tanto se tiene,

$$\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 - \|\vec{a}^2 - \vec{b}\|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \circ \vec{b} + |\vec{b}|^2 - (|\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \circ \vec{b} + |\vec{b}|^2) = 4\vec{a} \circ \vec{b}.$$

**Ejercicio 17.** Demuéstrese que  $\vec{a} + \vec{b}$  y  $\vec{a} - \vec{b}$  son ortogonales si y sólo si  $\|\vec{a}\| = \|\vec{b}\|$ . ¿Cuál es la interpretación geométrica del problema?

**Demostración.-** La interpretación geométrica viene dada por:





Por definición de vectores ortogonales tenemos que:

$$\begin{aligned}
 (\vec{a} + \vec{b}) \circ (\vec{a} - \vec{b}) = 0 &\Leftrightarrow (\vec{a} + \vec{b}) \circ \vec{a} + (\vec{a} + \vec{b}) \circ (-\vec{b}) \\
 &\Leftrightarrow \vec{a} \circ \vec{a} + \vec{a} \circ (-\vec{b}) + \vec{b} \circ \vec{a} + \vec{b} \circ (-\vec{b}) \\
 &\Leftrightarrow \|\vec{a}\|^2 - \vec{a} \circ \vec{b} + \vec{a} \circ \vec{b} - \|\vec{b}\|^2 \\
 &\Leftrightarrow \|\vec{a}\|^2 - \|\vec{b}\|^2 = 0 \\
 &\Leftrightarrow \|\vec{a}\| = \|\vec{b}\|.
 \end{aligned}$$

**Ejercicio 18. Demostrar que:**

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2$$

**Demostración.-** Similar al ejercicio 16 se tiene,

$$\begin{aligned}
 \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \circ \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 + \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \circ \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \\
 &= 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2.
 \end{aligned}$$

**Ejercicio 19. Demostrar que**

$$\vec{u} \circ \vec{v} = \frac{1}{4}\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \frac{1}{4}\|\vec{u} - \vec{v}\|^2.$$

**Demostración.-** Partamos de la parte derecha de la igualdad,

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4}\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \frac{1}{4}\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \frac{1}{4}[(\vec{u} + \vec{v}) \circ (\vec{u} + \vec{v})] - \frac{1}{4}[(\vec{u} - \vec{v}) \circ (\vec{u} - \vec{v})] \\
 &= \frac{1}{4}(\vec{u} \circ \vec{u} + \vec{u} \circ \vec{v} + \vec{v} \circ \vec{u} + \vec{v} \circ \vec{v}) \\
 &\quad - \frac{1}{4}(\vec{u} \circ \vec{u} - \vec{u} \circ \vec{v} - \vec{v} \circ \vec{u} + \vec{v} \circ \vec{v}) \\
 &= \frac{1}{4}[4(\vec{u} \circ \vec{v})] \\
 &= \vec{u} \circ \vec{v}.
 \end{aligned}$$

**Ejercicio 20.** Supóngase que  $\vec{a} \circ \vec{b} = \vec{a} \circ \vec{c}$  y que  $\vec{a} \neq \vec{0}$ . Es posible inferir que  $\vec{b} = \vec{c}$ ? Explicar la respuesta.

**Respuesta.-** Sean  $A = (1, 1, 1)$ ,  $B = (1, -1, 0)$  y  $C = (0, -1, 1)$ . Entonces,

$$A \circ B = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = 0,$$

$$A \circ C = 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 0.$$

Es decir,

$$A \circ B = A \circ C$$

Pero

$$B \neq C.$$

Por lo tanto, el supuesto no es suficiente para concluir que  $B = C$  se cumpla todas las veces.

**Ejercicio 21.** Explicar por qué las expresiones siguientes no tienen sentido

a)  $\vec{a} \circ (\vec{b} \circ \vec{c}) = (\vec{a} \circ \vec{b}) \circ \vec{c}.$

**Respuesta.-** Sean  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_n$ . Luego, ya que  $\circ : V \times V \rightarrow F$ . Entonces,

$$\vec{a} \circ (b_1 c_1 + b_2 c_2 + \dots + b_n c_n) = (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) \circ \vec{c}$$

Pero como,  $F \times V_n$  con  $F \in \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$  se concluye que no se puede definir el producto escalar de un vector y un escalar.

b)  $\|\vec{a} \circ \vec{b}\|.$

**Respuesta.-** Sean  $\vec{a}, \vec{b} \in V_n$ . Por definición de norma ( $\circ : V \times V \rightarrow F$ ) o módulo tenemos,

$$\|\vec{a} \circ \vec{b}\| = \sqrt{(a \circ b) \circ (a \circ b)}.$$

Dado que lo anterior es  $F \times F \rightarrow F$ , entonces no se tiene sentido definir la norma de dos escalar.

c)  $(\vec{a} \circ \vec{b}) + \vec{c}.$

**Respuesta.-** Ya que  $(\vec{a} \circ \vec{b})$  solo está definida para la suma de vectores de un mismo espacio. Entonces concluimos que  $(\vec{a} \circ \vec{b}) + \vec{c}$  no tiene sentido.

d)  $k \circ (\vec{a} + \vec{b}).$

**Respuesta.-** Supongamos que  $k \in F$ . Por el hecho de que  $\circ : V \times V \rightarrow F$  no podemos definir  $k \circ (\vec{a} + \vec{b}).$

**Ejercicio 22.** Dado el punto fijo  $A(1, 3, 5)$ , el punto  $P(x, y, z)$  y el vector  $\vec{n} = i - j + 2k$ , utilice el producto escalar como ayuda para escribir una ecuación en  $x, y$  y  $z$  que diga lo siguiente:  $\vec{n}$  y  $\vec{AP}$  son perpendiculares. Simplifique entonces esta ecuación y dé

una descripción geométrica del conjunto de tales puntos  $P(x, y, z)$ .

**Respuesta.-** Sean  $\vec{n} = (1, -1, 2)$  y el vector  $\vec{AP} = (x - 1, y - 3, z - 5)$ . Entonces, la perpendicularidad de estos dos vectores estará dada por:

$$\vec{n} \circ \vec{AP} = 0$$

$$(1, -1, 2) \circ (x - 1, y - 3, z - 5) = 0$$

$$1 \cdot (x - 1) + (-1) \cdot (y - 3) + 2 \cdot (z - 5) = 0$$

$$x - 1 - y + 3 + 2z - 10 = 0$$

$$x - y + 2z - 8 = 0$$

**Ejercicio 23.** Para  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d} \in \mathbb{R}^3$  demuestre que:

a)  $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$ .

**Demostración.-** Por definición de producto vectorial tenemos,

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{a} &= (a_2b_3 - a_3b_2) + (a_3b_1 - a_1b_3) + (a_1b_2 - a_2b_1) \\ &= (a_2a_2 - a_3a_3) + (a_3a_1 - a_1a_3) + (a_1a_2 - a_2a_1) \\ &= (a_2^2 - a_3^2) + (a_3^2 - a_1^2) + (a_1^2 - a_2^2) \\ &= (a_1^2 - a_1^2) + (a_2^2 - a_2^2) + (a_3^2 - a_3^2) \\ &= 0 \end{aligned}$$

b)  $\vec{a} \circ (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$ .

**Demostración.-** Por definición de producto escalar y producto vectorial tenemos,

$$\begin{aligned} \vec{a} \circ (\vec{a} \times \vec{b}) &= a \circ (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1) \\ &= a_1(a_2b_3 - a_3b_2) + a_2(a_3b_1 - a_1b_3) + a_3(a_1b_2 - a_2b_1) \\ &= (a_1a_2b_3 - a_1a_3b_2) + (a_2a_3b_1 - a_2a_1b_3) + (a_3a_1b_2 - a_3a_2b_1) \\ &= (a_1a_2b_3 - a_1a_2b_3) + (a_2a_3b_1 - a_2a_3b_1) + (a_3a_1b_2 - a_3a_1b_2) \\ &= 0 \end{aligned}$$

c)  $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \circ \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \circ \vec{b})\vec{c}$ .

**Demostración.-** Calculemos  $\vec{b} \times \vec{c}$ .

$$\vec{b} \times \vec{c} = (b_2c_3 - b_3c_2, b_3c_1 - b_1c_3, b_1c_2 - b_2c_1)$$

Luego, calculemos  $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ .

$$\begin{aligned} \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) &= \begin{bmatrix} \vec{a}_2 (\vec{b}_1 \vec{c}_2 - \vec{b}_2 \vec{c}_1) - \vec{a}_3 (\vec{b}_3 \vec{c}_1 - \vec{b}_1 \vec{c}_3) \\ \vec{a}_1 (\vec{b}_3 \vec{c}_1 - \vec{b}_1 \vec{c}_3) - \vec{a}_2 (\vec{b}_2 \vec{c}_3 - \vec{b}_3 \vec{c}_2) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \vec{a}_2 \vec{b}_1 \vec{c}_2 - \vec{a}_2 \vec{b}_2 \vec{c}_1 - \vec{a}_3 \vec{b}_3 \vec{c}_1 + \vec{a}_3 \vec{b}_1 \vec{c}_3 \\ \vec{a}_1 \vec{b}_3 \vec{c}_1 - \vec{a}_1 \vec{b}_1 \vec{c}_3 - \vec{a}_2 \vec{b}_2 \vec{c}_3 + \vec{a}_2 \vec{b}_3 \vec{c}_2 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (1)$$

Por otro lado calculamos  $(\vec{a} \circ \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \circ \vec{b}) \vec{c}$ .

$$\begin{aligned} &(\vec{a} \circ \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \circ \vec{b}) \vec{c} \\ &= (\vec{a}_1 \vec{c}_1 + \vec{a}_2 \vec{c}_2 + \vec{a}_3 \vec{c}_3)(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3) - (\vec{a}_1 \vec{b}_1 + \vec{a}_2 \vec{b}_2 + \vec{a}_3 \vec{b}_3)(\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3) \\ &= (\vec{a}_1 \vec{b}_1 \vec{c}_1 + \vec{a}_2 \vec{b}_1 \vec{c}_2 + \vec{a}_3 \vec{b}_1 \vec{c}_3, \vec{a}_1 \vec{b}_2 \vec{c}_1 + \vec{a}_2 \vec{b}_2 \vec{c}_2 + \vec{a}_3 \vec{b}_2 \vec{c}_3, \vec{a}_1 \vec{b}_3 \vec{c}_1 + \vec{a}_2 \vec{b}_3 \vec{c}_2 + \vec{a}_3 \vec{b}_3 \vec{c}_3) \\ &- (\vec{a}_1 \vec{b}_1 \vec{c}_1 + \vec{a}_2 \vec{b}_2 \vec{c}_1 + \vec{a}_3 \vec{b}_3 \vec{c}_1, \vec{a}_1 \vec{b}_1 \vec{c}_2 + \vec{a}_2 \vec{b}_2 \vec{c}_2 + \vec{a}_3 \vec{b}_3 \vec{c}_2, \vec{a}_1 \vec{b}_1 \vec{c}_3 + \vec{a}_2 \vec{b}_2 \vec{c}_3 + \vec{a}_3 \vec{b}_3 \vec{c}_3) \\ &= (\vec{a}_2 \vec{b}_1 \vec{c}_2 + \vec{a}_3 \vec{b}_1 \vec{c}_3 - \vec{a}_2 \vec{b}_2 \vec{c}_1 - \vec{a}_3 \vec{b}_3 \vec{c}_1, \vec{a}_1 \vec{b}_2 \vec{c}_2 + \vec{a}_3 \vec{b}_2 \vec{c}_3 - \vec{a}_1 \vec{b}_1 \vec{c}_2 - \vec{a}_3 \vec{b}_3 \vec{c}_2, \\ &= \vec{a}_1 \vec{b}_3 \vec{c}_1 + \vec{a}_2 \vec{b}_3 \vec{c}_2 - \vec{a}_1 \vec{b}_1 \vec{c}_3 - \vec{a}_2 \vec{b}_2 \vec{c}_3). \end{aligned} \quad (2)$$

Iguando (1) y (2) concluimos que,

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \circ \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \circ \vec{b}) \vec{c}.$$

**Ejercicio 24.** Suponga que los tres vectores  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  son perpendiculares entre si. Demuestre que  $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{0}$ .

**Demostración.-** Dado que,

$$\vec{a} \circ \vec{c} = 0 \quad \text{y} \quad \vec{a} \circ \vec{b} = 0.$$

Por el ejercicio anterior sabemos que,

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \circ \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \circ \vec{b}) \vec{c}.$$

Por lo tanto,

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \circ \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \circ \vec{b}) \vec{c} = 0 \cdot \vec{b} - 0 \cdot \vec{c} = \vec{0}.$$

**Ejercicio 25.** Encuentre vectores distintos de cero  $\vec{a}, \vec{b}$  y  $\vec{c}$  tales que  $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$ , pero  $\vec{b} \neq \vec{c}$ .

**Respuesta.-** Ya que cada lado de la igualdad es un vector de  $V_3$ . Se tiene,

$$\vec{a} \times \vec{b} - \vec{a} \times \vec{c} = \vec{0}.$$

Después, por la propiedad distributiva,

$$\vec{a} \times (\vec{b} - \vec{c}) = \vec{0}.$$

Sabemos que  $\vec{a} \parallel (\vec{b} - \vec{c}) \Leftrightarrow \vec{a} \times (\vec{b} - \vec{c}) = 0$ . De donde,

$$\vec{a} = r(\vec{b} - \vec{c}) \quad \text{para algún } r \in \mathbb{R}.$$

Así, los vectores  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  tal que  $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$  serán de la forma:

$$\vec{a} = r(\vec{b} - \vec{c}), \quad \vec{b} = \frac{\vec{a} - r\vec{c}}{r}, \quad \vec{c} = \frac{r\vec{b} - \vec{a}}{r}, \quad \vec{b} \neq \vec{c}.$$

De hecho, sólo hará falta encontrar un vector que cumpla la condición  $\vec{a} = r(\vec{b} - \vec{c})$ .

**Ejercicio 26.** Supóngase que  $\vec{u} \circ (\vec{v} \times \vec{w}) = 3$ . Encontrar

a)  $\vec{u} \circ (\vec{w} \times \vec{v})$ .

**Respuesta.-** Por la propiedad anticonmutativa para el producto vectorial, tenemos que

$$\vec{u} \circ (-\vec{w} \times \vec{v}) = 3$$

Luego, Por las propiedades de multiplicación por un escalar nos queda,

$$-\vec{u} \circ (\vec{w} \times \vec{v}) = 3 \quad \Rightarrow \quad \vec{u} \circ (\vec{w} \times \vec{v}) = -3.$$

b)  $(\vec{v} \times \vec{w}) \circ \vec{u}$ .

**Respuesta.-** Por la propiedad conmutativa para el producto escalar, tenemos que

$$(\vec{v} \times \vec{w}) \circ \vec{u} = \vec{u} \circ (\vec{v} \times \vec{w}) = 3.$$


c)  $\vec{w} \circ (\vec{u} \times \vec{v})$ .

**Respuesta.-** Por definición de producto vectorial y escalar, tenemos que

$$\begin{aligned} \vec{w} \circ (\vec{u} \times \vec{v}) &= \vec{w} \circ (\vec{u}_2\vec{v}_3 - \vec{u}_3\vec{v}_2, \vec{u}_3\vec{v}_1 - \vec{u}_1\vec{v}_3, \vec{u}_1\vec{v}_2 - \vec{u}_2\vec{v}_1) \\ &= \vec{w}_1\vec{u}_2\vec{v}_3 - \vec{w}_1\vec{u}_3\vec{v}_2 + \vec{w}_2\vec{u}_3\vec{v}_1 - \vec{w}_2\vec{u}_1\vec{v}_3 + \vec{w}_3\vec{u}_1\vec{v}_2 - \vec{w}_3\vec{u}_2\vec{v}_1 \end{aligned}$$

**Ejercicio 27.** Encontrar el área del triángulo que tiene vértices  $P(1, 5, -2), Q(0, 0, 0), R(3, 5, 1)$ .

**Respuesta.-** Grafiquemos.



Podemos calcular el área de dicho triángulo mediante la fórmula siguiente,

$$A(\triangle) = \frac{1}{2} \|\vec{a} \times \vec{b}\| \quad (1)$$

Calculemos los vectores asociados al triángulo.

$$\vec{a} = P - Q = (1, 5, -2) - (0, 0, 0) = (1, 5, -2).$$

$$\vec{b} = R - Q = (3, 5, 1) - (0, 0, 0) = (3, 5, 1).$$

Aplicando (1), tenemos

$$\begin{aligned} A(\triangle) &= \frac{1}{2} \|\vec{a} \times \vec{b}\| \\ &= \frac{1}{2} \|(5 \cdot 1 - 5 \cdot (-2), -2 \cdot 3 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 5 - 5 \cdot 3)\| \\ &= \frac{1}{2} \|15, -7, -10\| \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{15^2 + (-7)^2 + (-10)^2} \\ &= \frac{\sqrt{374}}{2}. \end{aligned}$$

**Ejercicio 28.** Encontrar el volumen del paralelepípedo de lados  $\vec{a} = (2, -6, 2)$ ,  $\vec{b} = (0, 4, -2)$ ,  $\vec{c} = (2, 2, -4)$ .

**Respuesta.-** Podemos ver que un paralelepípedo viene dado por:

$$V = |\vec{c} \circ (\vec{a} \times \vec{b})|$$

Primero calculemos  $\vec{a} \times \vec{b}$ .

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= (-6 \cdot (-2) - 2 \cdot 4, 2 \cdot 0 - 2 \cdot (-2), 2 \cdot 4 - (-6) \cdot 0) \\ &= (4, 4, 8). \end{aligned}$$

Luego, calculemos  $\vec{c} \circ (\vec{a} \times \vec{b})$

$$|\vec{c} \circ (\vec{a} \times \vec{b})| = (2, 2, -4) \circ (4, 4, 8) = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 4 + (-4) \cdot 8 = |-16| = 16.$$

**Ejercicio 29.** Determinar si  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$  están en el mismo plano.

(a)  $\vec{u} = (1, -2, 1)$ ,  $\vec{v} = (3, 0, -2)$ ,  $\vec{w} = (5, -4, 0)$ .

**Respuesta.-** Esperamos que los tres vectores estén en un plano. Por lo tanto no podrían formar un volumen. Esto significa que el producto triple tendría que ser igual a cero. Es decir,

$$\begin{aligned}\vec{a} \circ \|\vec{b} \times \vec{c}\| &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 5 & -4 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1[0 \cdot 0 - (-2) \cdot (-4)] - 2(-2 \cdot 5 - 3 \cdot 0) + 1[3 \cdot (-4) - 0 \cdot 5] \\ &= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto los tres vectores están en el mismo plano.

(b)  $\vec{u} = 5\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}, \vec{v} = 4\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}, \vec{w} = \vec{i} - \vec{j}.$

**Respuesta.-** La misma lógica del inciso (a).

$$\begin{aligned}\vec{a} \circ \|\vec{b} \times \vec{c}\| &= \begin{vmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 4 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 5[-1 \cdot 0 - 1 \cdot (-1)] - 2(1 \cdot 1 - 4 \cdot 0) + 1[4 \cdot (-1) - (-1) \cdot 1] \\ &= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto los tres vectores están en el mismo plano.

**Ejercicio 30.** Es un teorema de geometría tridimensional que el volumen de un tetraedro es  $1/3$  (área de la base)  $\cdot$  (altura). Usar este resultado para demostrar que el volumen de un tetraedro cuyos lados son los vectores  $\vec{a}, \vec{b}$  y  $\vec{c}$  es  $\frac{1}{6} |\vec{a} \circ (\vec{b} \times \vec{c})|$ .

**Respuesta.-** Vemos que la base de un tetraedro es un triángulo, de donde podemos hallar el área de la siguiente manera,

$$A = \frac{1}{2} \|\vec{a} \times \vec{b}\|.$$

Sabemos que el volumen de un sólido es: el área de la base por la altura como se dijo en el enunciado. Y dado que el volumen de un tetraedro equivale a la tercera parte del volumen del prisma. Entonces,

$$\frac{1}{3} \left( \frac{1}{2} \vec{c} \circ \|\vec{a} \times \vec{b}\| \right) = \frac{1}{6} \vec{c} \circ \|\vec{a} \times \vec{b}\|.$$

**Ejercicio 31.** Demostrar que  $Comp_{\vec{b}}(\vec{a}_1 + \vec{a}_2) = Comp_{\vec{b}}\vec{a}_1 + Comp_{\vec{b}}\vec{a}_2$

**Demostración.-** Por definición de la componente, al ser la norma del vector  $b$  un escalar y por propiedades del producto escalar se tiene,

$$Comp_{\vec{b}}(\vec{a}_1 + \vec{a}_2) = \frac{(\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \circ \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{\vec{a}_1 \circ \vec{b} + \vec{a}_2 \circ \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{\vec{a}_1 \circ \vec{b}}{|\vec{b}|} + \frac{\vec{a}_2 \circ \vec{b}}{|\vec{b}|} = Comp_{\vec{b}}\vec{a}_1 + Comp_{\vec{b}}\vec{a}_2$$

**Ejercicio 32.** Mostrar que si  $\vec{b}_1$  y  $\vec{b}_2$  son vectores paralelos no nulos, entonces  $\text{Proy}_{\vec{b}_1} \vec{a} = \text{Proy}_{\vec{b}_2} \vec{a}$ .

**Demostración.-** Sea  $\vec{b}_1 \parallel \vec{b}_2 \Rightarrow \vec{b}_1 = r\vec{b}_2$   $r \in V$ . Luego por definición de proyección y las propiedades escalares de producto escalar y norma (modulo) tenemos,

$$\text{Proy}_{\vec{b}_1} \vec{a} = \frac{\vec{a} \circ \vec{b}_1}{\|\vec{b}_1\| \|\vec{b}_1\|} \vec{b}_1 = \frac{\vec{a} \circ r\vec{b}_2}{\|r\vec{b}_2\| \|r\vec{b}_2\|} r\vec{b}_2 = \frac{r^2 (\vec{a} \circ \vec{b}_2)}{r^2 (\|\vec{b}_2\| \|\vec{b}_2\|)} \vec{b}_2 = \frac{\vec{a} \circ \vec{b}_2}{\|\vec{b}_2\| \|\vec{b}_2\|} \vec{b}_2 = \text{Proy}_{\vec{b}_2} \vec{a}.$$

**Ejercicio 33.** Mostrar que si  $\vec{b}_1$  y  $\vec{b}_2$  están en direcciones opuestas, entonces  $\text{Comp}_{\vec{b}_1} \vec{a} = -\text{Comp}_{\vec{b}_2} \vec{a}$ .

**Demostración.-** Por hipótesis se tiene que  $\vec{b}_1 = -\vec{b}_2$ , de donde se tiene,

$$\text{Comp}_{\vec{b}_1} \vec{a} = \frac{\vec{a} \circ \vec{b}_1}{\|\vec{b}_1\| \|\vec{b}_1\|} = \frac{\vec{a} \circ (-\vec{b}_2)}{\|-\vec{b}_2\| \|-\vec{b}_2\|} = \frac{-(\vec{a} \circ \vec{b}_2)}{(-\|\vec{b}_2\|)(-\|\vec{b}_2\|)} = -\frac{\vec{a} \circ \vec{b}_2}{\|\vec{b}_2\| \|\vec{b}_2\|} = -\text{Comp}_{\vec{b}_2} \vec{a}.$$


**Ejercicio 34.** ¿ Que condiciones sobre  $\vec{a}, \vec{b}$  y  $\vec{c}$  nos aseguran que  $\vec{a}, \vec{b}$  y  $\vec{c}$  son los lados de un triángulo?.

**Respuesta.-** Para que  $\vec{a}, \vec{b}$  y  $\vec{c}$  sean los lados de un triángulo, se debe cumplir que

$$\vec{a} < \vec{b} + \vec{c} \quad \text{y} \quad \vec{a} > \vec{b} - \vec{c}.$$

**Ejercicio 35.** Demostrar que las diagonales de un rombo son ortogonales entre si.

**Demostración.-** Sean  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}, \vec{e}, \vec{f} \in V_n$ . De donde gráficamente se tiene:



Así,

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{e} \circ \vec{f}}{\|\vec{e}\| \|\vec{f}\|} \Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left[ \frac{(\vec{a} + \vec{b}) \circ (\vec{d} + \vec{a})}{\|\vec{e}\| \|\vec{f}\|} \right].$$

Luego, ya que  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  forman un rombo. Es decir, un paralelogramo de lados iguales, entonces  $\vec{d} = -\vec{b}$ , por lo que:

$$\theta = \cos^{-1} \left[ \frac{(\vec{a} + \vec{b}) \circ (-\vec{b} + \vec{a})}{\|\vec{e}\| \|\vec{f}\|} \right].$$

Por las propiedades de producto interno y  $\|\vec{a}\| = \|\vec{b}\|$ ,



$$\begin{aligned}
\theta &= \cos^{-1} \left[ \frac{\vec{a} \circ (-\vec{b}) + \vec{b} \circ (-\vec{a}) + \vec{a} \circ \vec{a} + \vec{b} \circ \vec{b}}{\|\vec{e}\| \|\vec{f}\|} \right] \\
&= \cos^{-1} \left[ \frac{-(\vec{a} \circ \vec{b}) - (\vec{b} \circ \vec{a}) + \vec{a} \circ \vec{a} + \vec{b} \circ \vec{b}}{\|\vec{e}\| \|\vec{f}\|} \right] \\
&= \cos^{-1} \left( \frac{\vec{a} \circ \vec{a} - \vec{b} \circ \vec{b}}{\|\vec{e}\| \|\vec{f}\|} \right) \\
&= \cos^{-1} \left( \frac{\|\vec{a}\|^2 - \|\vec{b}\|^2}{\|\vec{e}\| \|\vec{f}\|} \right) \\
&= \cos^{-1} \left( \frac{0}{\|\vec{e}\| \|\vec{f}\|} \right) = \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\vec{e} \perp \vec{f}.$$

**Ejercicio 36.** Demostrar que la suma de los cuadrados de las longitudes de las diagonales de un paralelogramo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los cuatro lados del paralelogramo.

**Demostración.-** Sean  $\vec{a}, \vec{b} \in V_n$ . Mostraremos que,

$$\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 + \|\vec{a} - \vec{b}\|^2 = 2\|\vec{a}\|^2 + 2\|\vec{b}\|^2.$$

Dado que  $\|\vec{v}\|^2 = \vec{v} \circ \vec{v}$ , y por propiedades de producto interno o escalar. Tenemos,

$$\begin{aligned}
\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 + \|\vec{a} - \vec{b}\|^2 &= (\vec{a} + \vec{b}) \circ (\vec{a} + \vec{b}) + (\vec{a} - \vec{b}) \circ (\vec{a} - \vec{b}) \\
&= \vec{a} \circ \vec{a} + \vec{a} \circ \vec{b} + \vec{b} \circ \vec{a} + \vec{b} \circ \vec{b} + \vec{a} \circ \vec{a} - \vec{a} \circ \vec{b} - \vec{b} \circ \vec{a} + \vec{b} \circ \vec{b} \\
&= 2\vec{a} \circ \vec{a} + 2\vec{b} \circ \vec{b} \\
&= 2\|\vec{a}\|^2 + 2\|\vec{b}\|^2.
\end{aligned}$$

**Ejercicio 37.** Si las diagonales de un paralelogramo son ortogonales, entonces demostrar que el paralelogramo es un rombo.

**Demostración.-** Sean  $\vec{a}, \vec{b} \in V_n$ . Debemos que encontrar que la longitud de los cuatro lados de un paralelogramo es igual. Es decir, demostraremos que


$$(\vec{a} + \vec{b}) \circ (\vec{a} - \vec{b}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \|\vec{a}\| = \|\vec{b}\|.$$

Por las propiedades de producto interno o escalar y por el hecho de que  $\|\vec{v}\|^2 = \vec{v} \circ \vec{v}$ , tenemos

$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{b}) \circ (\vec{a} - \vec{b}) &= 0 \\ \vec{a} \circ (\vec{a} - \vec{b}) + \vec{b} \circ (\vec{a} - \vec{b}) &= 0 \\ \vec{a} \circ \vec{a} - \vec{a} \circ \vec{b} + \vec{b} \circ \vec{a} - \vec{b} \circ \vec{b} &= 0 \\ \|\vec{a}\|^2 - \vec{a} \circ \vec{b} + \vec{a} \circ \vec{b} - \|\vec{b}\|^2 &= 0 \\ \|\vec{a}\|^2 - \|\vec{b}\|^2 &= 0 \\ \|\vec{a}\|^2 &= \|\vec{b}\|^2 \end{aligned}$$

**Ejercicio 38.** Demostrar que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo, es paralelo al tercer lado y tiene la mitad de su longitud.

**Demostración.-** Consideremos el siguiente gráfico. Sean  $a, b, c, d \in \mathbb{R}^n$



de donde podemos deducir las siguientes ecuaciones:


$$\begin{cases} \frac{b}{2} - \frac{c}{2} - d = 0 \\ a + \frac{c}{2} - d - \frac{b}{2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{c}{2} = \frac{b}{2} - a \\ \frac{c}{2} = d + \frac{b}{2} - a \end{cases}$$

Entonces  $a = 2d$  si y sólo si  $a \parallel d$ . Así tomando la norma nos queda:

$$\|a\| = \|2d\| \Rightarrow \|d\| = \frac{1}{2}\|a\|.$$

**Ejercicio 39.** Demostrar que las diagonales de un paralelogramo se bisecan.

**Demostración.-** Necesitamos mostrar que las dos diagonales se cortan en sus puntos medios mutuos. Dicho de otra manera, necesitamos mostrar que los puntos medios de AC y BD son, de hecho, el mismo punto.



Sea  $M_1$  el punto medio entre  $AC$  y  $M_2$  el punto medio entre  $BD$ . Demostraremos que  $\vec{AM}_1 = \vec{AM}_2$ .

Sabemos que,

$$\vec{AM}_1 = \frac{1}{2}\vec{AC}.$$

Luego, necesitamos usar el hecho que  $ABDC$  es un paralelogramo. De donde,


$$\vec{AB} = \vec{DC} \Rightarrow \vec{AB} = \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AB} = \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{DC}.$$

Usamos eso para escribir  $\vec{AM}_2$  en términos de  $A, B, C, D$ .

$$\vec{AM}_2 = \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{BD} = \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{DC} + \frac{1}{2}\vec{BD} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{BD} + \vec{DC}) = \frac{1}{2}\vec{AC} = \vec{AM}_1.$$

**Ejercicio 40.** Mostrar que el triángulo cuyos vértices están en los extremos de un diámetro de una circunferencia y sobre la circunferencia es triángulo rectángulo.

**Demostración.-** Representamos la idea con la siguiente gráfica.



Donde  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}, \vec{e} \in \mathbb{R}^n$  y  $O$  el centro de la circunferencia, por lo tanto los vectores  $\vec{b}, \vec{d}, \vec{c}$  son iguales e inscritos en una semicircunferencia. Debemos demostrar que  $\vec{a} \circ \vec{e} = 0$ .

Sean

$$\vec{a} = \vec{c} + \vec{b}, \quad \vec{e} = \vec{c} + \vec{d} \quad \text{y} \quad \|\vec{b}\| = \|\vec{c}\| = \|\vec{d}\|$$

Entonces por las propiedades de producto interno tenemos,


$$\vec{a} \circ \vec{e} = \vec{c} + \vec{b} \circ \vec{c} + \vec{d} = \vec{c} + \vec{b} \circ \vec{c} + \vec{c} + \vec{b} \circ \vec{d} = \vec{c} \circ \vec{c} + \vec{c} \circ \vec{b} + \vec{c} \circ \vec{d} + \vec{b} \circ \vec{d}.$$

Ya que  $x \circ x = \|x\|^2$  y  $b = -d$ , nos queda:

$$\vec{a} \circ \vec{e} = \|c\|^2 - c \circ d + c \circ d - \|d\|^2 = 0.$$

**Ejercicio 41.** Demostrar vectorialmente la ley de cosenos.

**Demostración.-** Supongamos que  $\vec{a}, \vec{b} \in V_n$  y,



Entonces por el teorema de Pitágoras se tiene

$$h^2 = |\vec{b}|^2 - \left(|\vec{b}| \cos \theta\right)^2 \quad y \quad |\vec{b} - \vec{a}|^2 = \left(|\vec{b}| \cos \theta - |\vec{a}|\right)^2 + h^2$$

de donde

$$\begin{aligned} \|\vec{b} - \vec{a}\|^2 &= \left(\|\vec{b}\| \cos \theta - \|\vec{a}\|\right)^2 + \|\vec{b}\|^2 - \left(\|\vec{b}\| \cos \theta\right)^2 \\ &= \left(\|\vec{b}\| \cos \theta\right)^2 - 2\|\vec{a}\|\|\vec{b}\| \cos \theta + \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 - \left(\|\vec{b}\| \cos \theta\right)^2 \end{aligned}$$

por lo tanto,

$$\|\vec{b} - \vec{a}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 - 2\|\vec{a}\|\|\vec{b}\| \cos \theta$$

**Ejercicio 42.** Hay cinco estudiantes en un grupo. Sus calificaciones a mitad del curso (sobre 100 pts) están dados por el vector  $(73, 80, 91, 65, 84)$  y el final por  $(82, 79, 88, 70, 92)$ . Si la calificación final vale el doble que la del medio curso, encuentre un vector que indique las calificaciones totales de los estudiantes (como porcentaje).

**Respuesta.-** Sean  $\vec{a} = (73, 80, 91, 65, 84)$  y  $\vec{b} = (82, 79, 88, 70, 92)$ . Ya que la nota final es dos veces la primera, entonces

$$NOTA = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b} \Rightarrow NOTA = (79, 79.33, 89, 68.33, 89.33).$$