

# Fundamentos de Inferência Bayesiana

Victor Fossaluza e Luís Gustavo Esteves

2020-08-21



# Sumário

<b>Prefácio</b>	<b>5</b>
<b>1 Probabilidade Subjetiva</b>	<b>7</b>
1.1 Definição Axiomática . . . . .	7
1.2 Interpretações de Probabilidade . . . . .	7
1.3 Relação de Crença $\preceq$ . . . . .	8
1.4 Medida de Probabilidade que “representa” $\preceq$ . . . . .	12
1.5 Medida de Probabilidade Condicional . . . . .	13
<b>2 Introdução à Inferência Bayesiana</b>	<b>15</b>
2.1 Conceitos Básicos . . . . .	15
2.2 Suficiência . . . . .	19
2.3 Distribuição a Priori . . . . .	21
<b>3 Introdução à Teoria da Decisão</b>	<b>31</b>
3.1 Conceitos Básicos . . . . .	31
3.2 Aleatorização e Decisões Mistas . . . . .	33
3.3 Problemas com Dados . . . . .	34
<b>4 Estimação</b>	<b>37</b>
4.1 Estimação Pontual . . . . .	37
4.2 Estimação por Regiões . . . . .	40
4.3 Custo das Observações . . . . .	46
<b>5 Testes de Hipóteses</b>	<b>49</b>
5.1 Conceitos Básicos . . . . .	49
5.2 Revisão: Abordagem Frequentista . . . . .	49
5.3 Abordagem Bayesiana (via Teoria da Decisão) . . . . .	51
5.4 Probabilidade Posterior de $H_0$ . . . . .	53
5.5 Fator de Bayes . . . . .	54
5.6 Teste de Jeffreys . . . . .	56
5.7 Hipóteses Precisas . . . . .	59
5.8 FBST - <i>Full Bayesian Significance Test</i> . . . . .	60
5.9 P-value - Nível de Significância Adaptativo . . . . .	63

<b>A Breve Resumo de Medida e Probabilidade</b>	<b>67</b>
A.1 Conceitos Básicos . . . . .	67
A.2 Valor Esperado de $X$ (OU uma ideia da tal Integral de Lebesgue) . . . . .	69
A.3 Funções de Variáveis Aleatórias . . . . .	74
A.4 Função de Distribuição . . . . .	76
A.5 Probabilidade Condicional . . . . .	79

# Prefácio

Esse documento foi criado com base nos cursos de *Inferência Bayesiana* ministrados por nós no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP). Essas notas devem ser usadas como um roteiro de estudos e não irão necessariamente apresentar todo o conteúdo dessas disciplinas. Além disso, esta é uma versão preliminar que está bem longe da versão final, de modo que podem haver muitos erros e, assim, correções ou sugestões serão sempre muito bem vindas!



# Capítulo 1

## Probabilidade Subjetiva

A construção de probabilidade subjetiva apresentada aqui pode ser encontrada no livro *Optimal Statistical Decisions* (DeGroot, 1970).

- $\Omega$ : *espaço amostral*, conjunto não vazio.
- $\mathcal{A}$ :  $\sigma$ -álgebra de subconjuntos de  $\Omega$ , isto é,
  1.  $\Theta \in \mathcal{A}$ ;
  2.  $A \in \mathcal{A} \implies A^c \in \mathcal{A}$ ;
  3.  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{i \geq 1} A_i \in \mathcal{A}$ .
- Os elementos de  $\mathcal{A}$  são chamados de *eventos* e serão denotados por  $A, B, C, \dots, A_1, A_2, \dots$


### 1.1 Definição Axiomática

- $P : \mathcal{A} \longrightarrow [0, 1]$  é uma *medida de probabilidade* se
  1.  $P(\Omega) = 1$ ;
  2.  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$  com  $A_i \cap A_j = \emptyset$ ,  $P\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) = \sum_{i \geq 1} P(A_i)$ .

### 1.2 Interpretações de Probabilidade

- **Interpretação Clássica** (De Moivre, Laplace)
  - baseia-se na equiprobabilidade dos resultados;
  - $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ .
  - **Exemplo:** um lançamento de moeda,  $A = \text{“cara”}$ ,  $P(A) = \frac{1}{2}$ .
- **Interpretação Frequentista** (Venn, von Mises, Reichenbach, etc.)
  - quase unânime na primeira metade do século XX e ainda é a mais aceita;
  - baseia-se na regularidade das frequências relativas (lei dos grandes números);
  - $P(A) = \lim \frac{A_n}{n}$ , onde  $A_n$  é o número de ocorrências de  $A$  em  $n$  realizações *idênticas e independentes* do experimento;
  - Supõe que é possível repetir indefinidamente o experimento nas mesmas circunstâncias.

- **Exemplo:** um lançamento de moeda,  $A$  = “cara”.



- **Interpretação Lógica** (Keynes, Jeffreys, Carnap, etc.)
  - medida de “vínculo parcial” entre uma evidência e uma hipótese;
  - baseia-se em relações objetivas entre proposições.
  - **Exemplo:** considere duas proposições: “até agora todos os lançamentos resultaram em cara” e “será realizado um novo lançamento”. Pode-se afirmar que “provavelmente o resultado do novo lançamento será cara”.
- **Interpretação Subjetivista** (Ramsey, de Finetti, Savage, etc)
  - probabilidade como medida subjetiva de crença;
  - baseada na experiência de cada indivíduo, portanto única.
  - **Exemplo:** suponha que Bruno lançou uma moeda 3 vezes e todos os resultados foram cara. Esse indivíduo, em posse dessa informação, pode acreditar que o resultado cara é mais provável que coroa. Contudo, quando pergunta sobre a probabilidade de cara ao seu colega Olavo, ignorante com relação a moeda, ele responde que é  $1/2$ .

### 1.3 Relação de Crença $\precsim$

$\precsim$  : relação de “crença” em  $\mathcal{A} \times \mathcal{A}$

- $A \prec B$  : acredito mais em  $B$  que em  $A$  ( $B \succ A$ )
- $A \sim B$  : acredito igualmente em  $B$  e  $A$
- $A \precsim B$  : acredito em  $B$  pelo menos tanto quanto em  $A$



**Objetivo:** sob certas condições em  $\preceq$ , obter uma medida de probabilidade  $P$  que representa (concorda) com  $\preceq$ .

$$A \preceq B \iff P(A) \leq P(B)$$

**Suposições sobre  $\preceq$**

**SP1:** Para  $A, B \in \mathcal{A}$ , exatamente uma das afirmações a seguir deve valer:

$$A \prec B, B \prec A \text{ ou } A \sim B.$$

**SP2:**  $A_1, A_2, B_1, B_2 \in \mathcal{A}$  tais que  $A_1 \cap A_2 = B_1 \cap B_2 = \emptyset$  e  $A_i \preceq B_i, i = 1, 2$ . Então

$$A_1 \cup A_2 \preceq B_1 \cup B_2.$$

Além disso, se  $A_i \prec B_i$  para algum  $i$ , então  $A_1 \cup A_2 \prec B_1 \cup B_2$ .

**SP3:** Se  $A$  é um evento, então  $\emptyset \preceq A$ . Além disso,  $\emptyset \prec \Omega$ .

**SP4:** Se  $A_1, A_2, \dots$  uma sequência decrescente de eventos, isto é,  $A_n \supseteq A_{n+1}, \forall n$ , e  $B$  tal que  $B \preceq A_n, \forall n$  então

$$B \preceq \bigcap_{n \geq 1} A_n.$$

**SP5:** Existe uma variável aleatória  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{A}$ -mensurável, tal que  $X(\omega) \in [0, 1], \forall \omega \in \Omega$  e, se  $I_1$  e  $I_2$  são intervalos contidos em  $[0, 1]$ ,  $\{X \in I_1\} \preceq \{X \in I_2\} \iff \lambda(I_1) \leq \lambda(I_2)$ .

- Se  $I = [a, b] \subseteq [0, 1]$ ,  $\lambda(I) = b - a$  é o comprimento do intervalo  $I$  (medida de Lebesgue).
- “Experimento auxiliar” ;  $X \sim \text{Uniforme}[0, 1]$ .
- $\{X \in [a, b]\} \sim \{X \in (a, b]\} \sim \{X \in [a, b)\} \sim \{X \in (a, b)\}$ .

**Lema 1:**  $A, B, D \in \mathcal{A}$  tais que  $A \cap D = B \cap D = \emptyset$ . Então

$$A \preceq B \iff A \cup D \preceq B \cup D$$


**Demo:**

$$(\Rightarrow) A \preceq B \Rightarrow A \cup D \preceq B \cup D \text{ (SP2)}$$

$$(\Leftarrow) B \prec A \Rightarrow B \cup D \prec A \cup D \text{ (SP2)}$$

**Teorema 1:** Se  $A \preceq B$  e  $B \preceq D$  então  $A \preceq D$ .

**Demo:**



$$(i) (1) \cup (2) \cup (4) \cup (5) \precsim (1) \cup (2) \cup (3) \cup (6) \Rightarrow (4) \cup (5) \precsim (3) \cup (6).$$

$$(ii) \text{ Analogamente, } (2) \cup (6) \precsim (4) \cup (7)$$

$$\begin{aligned} \text{De (i) e (ii) e pelo Lema 1, } & (4) \cup (5) \cup (2) \cup (6) \precsim (3) \cup (6) \cup (4) \cup (7) \\ \Rightarrow (2) \cup (5) \precsim (3) \cup (7) & \Rightarrow (2) \cup (5) \cup (1) \cup (4) \precsim (3) \cup (7) \cup (1) \cup (4). \end{aligned}$$

**Teorema 2 (generalização do SP2):** Se  $A_1, \dots, A_n$  são eventos disjuntos e  $B_1, \dots, B_n$  são também eventos disjuntos tais que  $A_i \precsim B_i$ , para  $i = 1, \dots, n$ , então

$$\bigcup_{i=1}^n A_i \precsim \bigcup_{i=1}^n B_i.$$

Se  $A_i \prec B_i$  para algum  $i$ , então  $\bigcup_{i=1}^n A_i \prec \bigcup_{i=1}^n B_i$ .

**Demo:** Exercício.

**Teorema 3:** Se  $A \precsim B$  então  $A^c \succsim B^c$ .

$$\begin{aligned} \text{Demo: Do Lema 1, } & A \cup (A^c \cap B^c) \precsim B \cup (A^c \cap B^c) \Rightarrow B^c \cup (A \cap B) \precsim A^c \cup (A \cap B) \\ \Rightarrow B^c \precsim A^c. & \end{aligned}$$

**Resultado:** Para todo evento  $A$ ,  $A \precsim \Omega$ .

$$\text{Demo: Por SP3, } \emptyset \precsim A^c. \text{ Tomando } D = A \text{ no Lema 1, } \emptyset \cup A \precsim A^c \cup A \Rightarrow A \precsim \Omega.$$

**Teorema 4:** Se  $A \subseteq B$  então  $A \precsim B$ .

$$\text{Demo: Suponha, } B \prec A. \text{ Tomando } D = B^c \text{ no Lema 1, } B \cup B^c \prec A \cup B^c \Rightarrow \Omega \prec A \cup B^c. \\ \text{Absurdo!}$$

**Exemplo 1:**  $\omega_0 \in \Omega$ .  $A \precsim B \Leftrightarrow \{\omega_0 \in B \text{ ou } \omega_0 \notin (A \cup B)\}$ . Mostre que  $\precsim$  obedece a SP1 a SP4.

(SP1)

$$A \preceq B \Leftrightarrow \omega_0 \in B \cup (A \cup B)^c \Rightarrow B \prec A \Leftrightarrow \omega_0 \in B^c \cap (A \cup B) \Leftrightarrow \omega_0 \in A \cap B^c.$$

Analogamente,  $A \prec B \Leftrightarrow \omega_0 \in B \cap A^c$ .

$$A \sim B \Leftrightarrow A \preceq B \text{ e } B \preceq A \Leftrightarrow \omega_0 \in [B \cup (A \cup B)^c] \cap [A \cup (A \cup B)^c] \Leftrightarrow \omega_0 \in (A \cap B) \cup (A \cup B)^c.$$

(SP2)

$$A_i \preceq B_i, i = 1, 2 \Leftrightarrow \omega_0 \in [B_1 \cup (A_1 \cup B_1)^c] \cap [B_2 \cup (A_2 \cup B_2)^c] \Leftrightarrow \omega_0 \in [(B_1 \cup B_2) \cap D^c] \cup (A_1 \cup B_1 \cup A_2 \cup B_2)^c,$$

com  $D = (A_1 \cap B_2) \cup (A_2 \cap B_1)$ .

$$A_1 \cup A_2 \preceq B_1 \cup B_2 \Leftrightarrow \omega_0 \in (B_1 \cup B_2) \cup (A_1 \cup A_2 \cup B_1 \cup B_2)^c$$

Como  $(B_1 \cup B_2) \cap D^c \subseteq (B_1 \cup B_2)$ , vale o SP2.

(SP3)

$$\emptyset \preceq A \Leftrightarrow \omega_0 \in A \cup (\emptyset \cup A)^c \Leftrightarrow \omega_0 \in A \cup A^c = \Omega.$$

Como  $\Omega$  é não-vazio,  $\exists \omega_0 \in \Omega$  e, portanto,  $\emptyset \prec \Omega$ .

(SP4) Exercício!

**Exemplo 2:**  $\Omega = \mathbb{N}$ ,  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ .  $A \preceq B \Leftrightarrow \{B \text{ é infinito ou } A \text{ e } B \text{ são finitos com } |A| \leq |B|\}$ . Verifique se  $\preceq$  satisfaz SP1 a SP4.

**Teorema 5:** Se  $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$  é uma sequência crescente de eventos e  $B$  é tal que  $A_n \preceq B, \forall n$  então

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n \preceq B.$$

**Demo:**  $A_n^c \supseteq A_{n+1}^c$  e, pelo Teo 3,  $A_n^c \succ B^c, \forall n$ .

Por SP4,  $\bigcap_{n \geq 1} A_n^c \succ B^c \Rightarrow \bigcup_{n \geq 1} A_n \preceq B$ .

**Teorema 6:**  $(A_n)_{n \geq 1}$  e  $(B_n)_{n \geq 1}$  sequências tais que  $A_i \cap A_j = B_k \cap B_l = \emptyset, \forall i \neq j, \forall k \neq l$ .

$$A_i \preceq B_i, \forall i \Rightarrow \bigcup_{n \geq 1} A_n \preceq \bigcup_{n \geq 1} B_n.$$

Se existe ao menos um  $j$  tal que  $A_j \prec B_j$  então  $\bigcup_{n \geq 1} A_n \prec \bigcup_{n \geq 1} B_n$ .

**Demo:** Da extensão de SP2, temos que  $\bigcup_{i=1}^n A_i \preceq \bigcup_{i=1}^n B_i, \forall n \geq 1 \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \preceq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i, \forall n \geq 1$

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \preceq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \text{ (Teo 5)}$$

$\exists n_0$  tal que  $A_{n_0} \prec B_{n_0}$ . De SP2, temos que, para  $n \geq n_0$ ,

$$\bigcup_{i=1}^{n_0} A_i = \bigcup_{i=1}^{n_0-1} A_i \cup A_{n_0} \prec \bigcup_{i=1}^{n_0-1} B_i \cup B_{n_0} = \bigcup_{i=1}^{n_0} B_i \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{n_0} A_i \prec \bigcup_{i=1}^{n_0} B_i.$$

Da primeira parte, temos que  $\bigcup_{i=n_0+1}^{\infty} A_i \preceq \bigcup_{i=n_0+1}^{\infty} B_i$  e, por SP2,

$$\bigcup_{i=1}^{n_0} A_i \cup \bigcup_{i=n_0+1}^{\infty} A_i \prec \bigcup_{i=1}^{n_0} B_i \cup \bigcup_{i=n_0+1}^{\infty} B_i$$

provando o resultado.

## 1.4 Medida de Probabilidade que “representa” $\preceq$

**Teorema 7:** Seja  $A \in \mathcal{A}$ . Então  $\exists! a^* \in [0, 1]$  tal que  $A \sim \{X \in [0, a^*]\}$ .

**Demo:** Seja  $U(A) = \{a \in [0, 1] : A \preceq \{X \in [0, a]\}\}$ .  
 $1 \in U(A)$  pois  $\Omega = \{X \in [0, 1]\} \succeq A \Rightarrow U(A) \neq \emptyset$ .  
Tome  $a^* = \inf U(A)$ .

(i) Considere  $(a_n)_{n \geq 1}$ ,  $a_n \in [0, 1]$ ,  $\forall n \geq 1$ , tal que  $a_n \geq a_{n+1} \geq a^*$  e  $a_n \downarrow a^*$ . Então,  $\forall n \geq 1$ ,  $\{X \in [0, a_n]\} \succeq A$ .

Por SP4,  $\bigcap_{n=1}^{\infty} \{X \in [0, a_n]\} \succeq A \Rightarrow \{X \in [0, a^*]\} \succeq A$

(ii) Se  $a^* = 0$ ,  $\{X \in [0, 0]\} \sim \emptyset \preceq A$  (por SP3).

Se  $a^* > 0$ , considere  $(a_n)_{n \geq 1}$  com  $a_n \leq a_{n+1} < a^*$  e  $a_n \uparrow a^*$ .

$\{X \in [0, a_n]\} \preceq A$ ,  $\forall n \geq 1$  e, pelo Teo 5,  $\bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \in [0, a_n]\} \preceq A \Rightarrow \{X \in [0, a^*]\} \sim \{X \in [0, a^*]\} \preceq A$ .

De (i) e (ii), temos que  $A \sim \{X \in [0, a^*]\}$ .

$a^*$  é único pois se  $a_1 < a^* < a_2$  são outros valores quaisquer, segue que  $\{X \in [0, a_1]\} \prec \{X \in [0, a^*]\} \prec \{X \in [0, a_2]\}$  e só um desses eventos pode ser equivalente à  $A$ .

**Teorema 8:** A probabilidade do evento  $A$ ,  $P(A)$ , é definida como  $a^* \in [0, 1]$  tal que  $A \sim \{X \in [0, a^*]\}$ . Assim,  $A \sim \{X \in [0, P(A)]\}$ . A função de probabilidade assim definida satisfaz:

$$A \preceq B \Leftrightarrow P(A) \leq P(B).$$

**Demo:** Do Teo 7,  $A \sim \{X \in [0, P(A)]\}$  e  $B \sim \{X \in [0, P(B)]\}$ .

$$\begin{aligned} A \preceq B &\Leftrightarrow \{X \in [0, P(A)]\} \preceq \{X \in [0, P(B)]\} \Leftrightarrow \lambda([0, P(A)]) \preceq \lambda([0, P(B)]) \\ &\Leftrightarrow P(A) \leq P(B). \end{aligned}$$

**Teorema 9:** A função  $P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$  que, para cada  $A \in \mathcal{A}$ , associa  $P(A)$  tal que  $A \sim \{X \in [0, P(A)]\}$  é uma medida de probabilidade (no sentido  $\sigma$ -aditiva).

**Demo:** (i)  $P(A) \geq 0$ .

$$\Omega \sim \{X \in [0, 1]\} \Rightarrow P(\Omega) = 1.$$

$$\emptyset \sim \{X \in [0, 0]\} \Rightarrow P(\emptyset) = 0$$

$$\emptyset \preceq A \Rightarrow 0 \leq P(A).$$

(ii) Seja  $A$  e  $B$  tal que  $A \cap B = \emptyset$ . Vamos mostrar que  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ .

Pelo Teo 8,  $A \sim \{X \in [0, P(A)]\}$ ,  $B \sim \{X \in [0, P(B)]\}$ ,  $A \cup B \sim \{X \in [0, P(A \cup B)]\}$ .

Como  $A \subseteq A \cup B$  e, por SP3,  $A \preceq A \cup B$ , vale que  $P(A) \leq P(A \cup B)$ . Vamos verificar que  $B \sim \{X \in (P(A), P(A \cup B)]\}$ .

Suponha, por absurdo,  $B \prec \{X \in (P(A), P(A \cup B)]\}$ .

$$\begin{aligned} A \preceq \{X \in [0, P(A)]\} &\xrightarrow{SP2} A \cup B \prec \{X \in [0, P(A)]\} \cup \{X \in (P(A), P(A \cup B)]\} \\ \Rightarrow A \cup B \prec \{X \in [0, P(A)] \cup (P(A), P(A \cup B)]\} &\Rightarrow A \cup B \prec \{X \in [0, P(A \cup B)]\} \sim \\ (\text{Absurdo!}) \end{aligned}$$

Analogamente,  $B \succ \{X \in (P(A), P(A \cup B)]\}$  é absurdo! Logo,  $B \sim \{X \in (P(A), P(A \cup B)]\} \sim \{X \in [0, P(A \cup B) - P(A)]\}$ .

Como  $B \sim \{X \in [0, P(B)]\}$ , temos que  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ .

**Corolário 1:** Se  $A_1, \dots, A_n$  são eventos disjuntos, então  $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$ .

**Demo:** Indução.

**Teorema 10:** Seja  $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$  uma seq. decrescente de eventos tais que  $\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset$ . Então  $\lim_{n \uparrow \infty} P(A_n) = 0$ .

**Demo:**  $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \Rightarrow P(A_1) \geq P(A_2) \geq \dots$

Além disso,  $\lim_{n \uparrow \infty} P(A_n) = b$ . Como  $P(A_n) \geq b, \forall n$ , segue que  $A_n \succsim \{X \in [0, b]\}, \forall n$ .

Por SP4,  $\emptyset = \bigcap_{i=n}^{\infty} A_i \succsim \{X \in [0, b]\}$ .

Se  $b > 0$ , então  $\{X \in [0, b]\} \succ \{X \in [0, b/2]\} \succ \emptyset$ . Como essa relação contradiz a anterior, temos que  $b$  deve ser igual a 0.

**Exercício 1:** Use o Corolário 1 e o Teorema 10 para concluir a demonstração do Teorema 9, mostrando que  $P$  é  $\sigma$ -aditiva, isto é,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i), \quad A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j.$$

**Solução:** Seja  $(A_n)_{n \geq 1}$  sequência de eventos disjuntos. Segue do Corolário 1 que

$$(i) \quad P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + P\left(\bigcup_{j=n+1}^{\infty} A_j\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

Considere  $B_n = \bigcup_{j=n+1}^{\infty} A_j, n \geq 1$ , uma sequência decrescente de eventos tais que  $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \emptyset$ .

Pelo Teorema 10, segue que  $\lim_{n \uparrow \infty} P(B_n) = 0$ . Assim, tomando o limite do lado direito de (i), segue que

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \uparrow \infty} \sum_{i=1}^n P(A_i) + \lim_{n \uparrow \infty} P(B_n) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

**Teorema 11:** Se a relação de crença  $\precsim$  obedece SP1 a SP5 então  $\exists! P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ , medida de probabilidade, tal que  $P$  representa  $\precsim$ .

**Demo:** Exercício!

## 1.5 Medida de Probabilidade Condicional

**Nova Relação:**  $(A|D) \precsim (B|D)$  (Sabendo que  $D$  ocorreu,  $B$  é preferível a  $A$ ).

- Para  $D = \Omega$ , temos o caso anterior:  $A \precsim B \Leftrightarrow (A|\Omega) \precsim (B|\Omega)$ .
- Suponha que vale as suposições SP1 a SP5 e, adicionalmente,

**SP6:**  $(A|D) \precsim (B|D) \Leftrightarrow (A \cap D) \precsim (B \cap D) \quad \left( (A \cap D|\Omega) \precsim (B \cap D|\Omega) \right)$

**Teorema 12:**  $\forall A, B, D \in \mathcal{A}$ , considere  $\precsim$  satisfazendo SP1 a SP6. Então  $P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$  de modo que para cada  $A \in \mathcal{A}$  é associada  $P(A) \in [0, 1]$  tal que  $A \sim \{X \in [0, P(A)]\}$  é uma medida de probabilidade que representa  $\precsim$ , isto é,

$$(A|\Omega) \precsim (B|\Omega) \Leftrightarrow P(A) \leq P(B).$$

Além disso, se  $D \in \mathcal{A}$  é tal que  $P(D) > 0$ , então

$$(A|D) \precsim (B|D) \Leftrightarrow P(A|D) \leq P(B|D),$$

onde  $P(\cdot|D) : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$  é uma medida de probabilidade tal que

$$P(A|D) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)}.$$

## Capítulo 2

# Introdução à Inferência Bayesiana

### 2.1 Conceitos Básicos

- **Inferência Estatística:** fazer afirmações sobre quantidades não observáveis em um determinado contexto.
- $\theta$  : **parâmetro** - quantidade desconhecida de interesse (não-observável em determinado contexto).
- $\Theta$  : **espaço paramétrico** - conjunto onde  $\theta$  toma valores (supostamente conhecido).
- $E = (X, \theta, \{f(x|\theta)\})$ : **experimento** - “*tornar visível algo que antes era invisível*” ou, mais especificamente no nosso contexto, observar uma realização  $x \in \mathfrak{X}$  de um vetor aleatório  $X$  com alguma distribuição  $f(x|\theta)$ . Essa distribuição pertence, na maioria dos casos, à uma família de distribuições fixada mas que depende do parâmetro desconhecido de interesse  $\theta$ . Note que na grande maioria dos problemas do dia a dia de um estatístico ele se utiliza de resultados experimentais para fazer afirmações sobre  $\theta$  e este, por sua vez, é não-observável em geral.
- $\mathfrak{X}$  : **espaço amostral** - conjunto onde  $X$  toma valores (supostamente conhecido).
- $\mathcal{F}$  :  $\sigma$ -álgebra de (sub)conjuntos de  $\mathfrak{X}$ .
- Neste espaço amostral, defini-se uma família  $\mathcal{P} = \{P(\cdot|\theta) : \theta \in \Theta\}$ , isto é, um conjunto de distribuições (condicionais) para  $X$  indexadas por  $\theta$ .
- $(\mathfrak{X}, \mathcal{F}, \mathcal{P})$  : modelo estatístico (clássico).
- $V_X(\theta) = f(x|\theta)$  : função de verossimilhança.

#### 2.1.1 Inferência Frequentista (ou Clássica)

- $\theta$  é considerado fixo (apesar de desconhecido) e, portanto, não recebe uma distribuição de probabilidade.
- Baseia-se no “princípio” da amostragem repetida (interpretação frequentista de probabilidade), isto é, supõe que é possível realizar infinitas vezes o experimento. Assim, o  $x$  é apenas um dos possíveis resultados (hipótéticos) do experimento.
- Probabilidade somente é definida em (uma  $\sigma$ -álgebra de)  $\mathfrak{X}$ .

### 2.1.2 Inferência Bayesiana

- Baseia-se na interpretação subjetivista de probabilidade, de modo que a *SUA* incerteza sobre algo desconhecido deve ser quantificada (traduzida) em termos de probabilidade.
- Assim, *SUA* incerteza sobre o parâmetro (desconhecido) é representada por uma distribuição de probabilidade,  $\theta$  é tratado como uma variável aleatória (v.a.) e *SUA* distribuição para  $\theta$  antes da realização do experimento,  $f(\theta)$ , é chamada de **distribuição a priori**. Note que a atribuição de uma distribuição a priori para  $\theta$  independe da natureza do parâmetro, ele pode ser a proporção de indivíduos que avalia positivamente o governo atual (quantidade essa que muda a todo instante) ou ainda a milésima casa do  $\pi$  (algum número de 0 a 9, fixo porém desconhecido no momento dessa leitura).
- A atualização de *SUA* incerteza sobre  $\theta$ , incorporando uma nova informação trazida pelos dados  $x$  (representada por  $f(x|\theta)$ ) é feita pelo *Teorema de Bayes*:
- **Teorema de Bayes:**

$$\underbrace{f(\theta|x)}_{\text{dist. posteriori}} = \frac{f(\theta)f(x|\theta)}{\int_{\Theta} f(x|\theta)dP_{\theta}} \propto \underbrace{f(\theta)}_{\text{priori}} \underbrace{f(x|\theta)}_{\text{verossimilhana}}.$$

- Toda a inferência sobre  $\theta$  será baseada exclusivamente em  $f(\theta|x)$ , não sendo necessário considerar pontos amostrais que poderiam mas não foram observados (como é feito na inferência frequentista).
- **Observação:** será utilizada a notação geral para integral (de Lebesgue):

$$\int_{\Theta} f(x|\theta)dP_{\theta} = \begin{cases} \int_{\Theta} f(x|\theta)f(\theta)d\theta & (\text{caso contínuo}) \\ \sum_{\Theta} f(x|\theta)f(\theta) & (\text{caso discreto}) \end{cases}$$

**Exemplo 1.a:** Suponha que existem duas moedas, uma delas tem  $\theta = 1/2$  (honestas) e a outra  $\theta = 3/4$  (viesada). Uma moeda é escolhida e é feito um lançamento da moeda selecionada. Nesse experimento, tem-se  $X|\theta \sim \text{Ber}(\theta)$ , com  $\Theta = \{1/2, 3/4\}$  e  $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ . Como “chutar” o valor de  $\theta$ ?


Considere que não existe razão para você acreditar que há algum tipo de preferência na escolha de uma ou outra moeda, isto é, considere que a priori  $f(\theta = 1/2) = f(\theta = 3/4) = 1/2$ . Suponha que o lançamento resultou em cara ( $x = 1$ ). Então

$$f(\theta = 3/4|X = 1) = \frac{f(X = 1|\theta = 3/4)f(\theta = 3/4)}{\sum_{\theta} f(X = 1|\theta)f(\theta)} = \frac{\frac{3}{4} \frac{1}{2}}{\frac{3}{4} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2}} = \frac{3/4}{5/4} = \frac{3}{5} = 1 - \underbrace{f(\theta = 1/2|X = 1)}_{2/5}.$$

Se, no entanto, o resultado do lançamento da moeda fosse coroa ( $x = 0$ ), teríamos

$$P(\theta = 3/4|X = 0) = \frac{\frac{1}{4} \frac{1}{2}}{\frac{1}{4} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2}} = \frac{1/2}{1/2 + 2/2} = \frac{1}{3}.$$






Assim, se sua decisão for escolher o valor mais provável de  $\theta$  após observar  $x$ , a conclusão seria que a moeda é viesada ( $\theta = 3/4$ ) se for observado cara ( $x = 1$ ) e que a moeda é honesta ( $\theta = 1/2$ ) se o resultado for coroa ( $x = 0$ ).

**Exemplo 1.b:** Considere agora que serão realizados  $n$  lançamentos da moeda, de modo que agora tem-se  $X|\theta \sim \text{Bin}(n, \theta)$ ,  $\theta \in \{1/2, 3/4\}$ ,  $x \in \{0, 1, \dots, n\}$ . Suponha que observa-se  $X = x$ .

$$f(\theta = 3/4 | X = x) = \frac{f(x|\theta = 3/4)f(\theta = 3/4)}{\sum_{\theta \in \{1/2, 3/4\}} f(x|\theta)f(\theta)} = \frac{\binom{n}{x} \left(\frac{3}{4}\right)^x \left(\frac{1}{4}\right)^{n-x} \frac{1}{2}}{\binom{n}{x} \left(\frac{3}{4}\right)^x \left(\frac{1}{4}\right)^{n-x} \frac{1}{2} + \binom{n}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{n-x} \frac{1}{2}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{2^n}{3^x}\right)} = \frac{3^x}{3^x + 2^n}.$$

```
theta = c(0.5,0.75)
prior=0.5 # priori P(theta[1]) = 1-P(theta[2])
n=5;
post = function(x){
  (prior*dbinom(x,n,theta)) / sum(prior * dbinom(x,n,theta)) }
tibble(x=as.factor(rep(seq(0,n),each=length(theta))),
  x1=rep(theta,(n+1)),x2=rep(theta,(n+1)),y1=0,
  y2=as.vector(apply(matrix(seq(0,n)),1,post))) %>%
ggplot() + geom_hline(yintercept=0.5, col="darkgrey",lty=3) +
geom_segment(aes(x=x1,xend=x2,y=y1,yend=y2,colour=x),lwd=2) +
xlab(expression(theta)) + ylab(expression(paste("P(",theta,"|x)"))) +
theme_bw()+
facet_wrap(~x)
```



Note que o Exemplo 1.a é um caso particular desse exemplo com  $n = 1$ . Se novamente sua decisão é baseada no valor mais provável de  $\theta$ , temos

$$f(\theta = 3/4 | X = x) > \frac{1}{2} \iff \frac{3^x}{3^x + 2^n} > \frac{1}{2} \iff 3^x > 2^n \iff \frac{x}{n} = \bar{x} > \log_3 2 \approx 0,63.$$

**Exemplo 1.c:** Considere que uma moeda será lançada  $n$  vezes mas que  $\theta$  é desconhecido, de modo que  $\Theta = [0, 1]$ . Para simplificar, vamos assumir  $f(\theta) = \mathbb{I}_{[0,1]}(\theta)$ , isto é,  $\theta \sim Unif(0, 1) \sim Beta(1, 1)$ . Essa priori corresponde ao caso em que você acredita que todos os valores possíveis para  $\theta$  são igualmente “prováveis”, assim como nos exemplos anteriores. Novamente,  $X|\theta \sim Bin(n, \theta)$

$$\begin{aligned} f(\theta|x) &= \frac{f(x|\theta)f(\theta)}{\int_0^1 f(x|\theta)f(\theta)d\theta} = \frac{\binom{n}{x}\theta^x(1-\theta)^{n-x} \mathbb{I}_{[0,1]}(\theta)}{\int_0^1 \binom{n}{x}\theta^x(1-\theta)^{n-x}d\theta} = \frac{\frac{\Gamma(1+x)\Gamma(1+n-x)}{\Gamma(1+x)\Gamma(1+n-x)} \theta^x(1-\theta)^{n-x} \mathbb{I}_{[0,1]}(\theta)}{\underbrace{\int_0^1 \frac{\Gamma(1+x)\Gamma(1+n-x)}{\Gamma(1+x)\Gamma(1+n-x)} \theta^x(1-\theta)^{n-x}d\theta}_1} \\ &= \frac{\Gamma(1+x)\Gamma(1+n-x)}{\Gamma(1+x)\Gamma(1+n-x)} \theta^x(1-\theta)^{n-x} \mathbb{I}_{[0,1]}(\theta). \end{aligned}$$

Logo  $\theta|x \sim Beta(1+x, 1+n-x)$ . Nesse exemplo, o valor “mais provável” (com maior densidade a posteriori) para  $\theta$  é a moda da distribuição,  $Moda(\theta|x) = \frac{(1+x)-1}{(1+x)+(1+n-x)-2} = \frac{x}{n} = \bar{x}$ .


**Exemplo 1.d** Por fim, suponha que no exemplo anterior, sua opinião a priori é representada por uma distribuição beta qualquer com parâmetros  $a$  e  $b$ ,  $a, b > 0$ . Desta forma,  $X|\theta \sim Bin(n, \theta)$  e  $\theta \sim Beta(a, b)$ . Calculando a distribuição a posteriori de forma similar ao exemplo anterior, temos que  $\theta|X = x \sim Beta(a+x, b+n-x)$ .

```
theta = seq(0,1,0.01)
a=1; b=1;
n=5
post1 = as.vector(apply(matrix(seq(0,n)),1,
```

```

function(x){dbeta(theta,a+x,b+n-x))}
tibble(x=as.factor(rep(seq(0,n),each=length(theta))),
  theta=rep(theta,(n+1)),post=post1) %>%
  ggplot() +
  geom_line(aes(x=theta,y=post, colour=x),lwd=1.5) +
  geom_line(aes(x=theta,y=dbeta(theta,a,b),colour="Prior"),lwd=1,lty=2) +
  xlab(expression(theta)) + ylab(expression(paste("f(",theta,"|x)"))) +
  theme_bw() +
  facet_wrap(~x)

```



Suponha que  $a = b = 1$  (como no exemplo anterior),  $n = 5$  e  $x = 2$ , de modo que  $\theta|x = 2 \sim \text{Beta}(3, 4)$ . Algumas medidas resumo da distribuição posterior para esse exemplo são

- $\text{Moda}(\theta|x) = \frac{a+x-1}{a+b+n-2} = \frac{2}{5} = 0,4;$
- $E[\theta|x] = \frac{a+x}{a+b+n} = \frac{3}{7} = 0,43;$
- $\text{Med}(\theta|x) \approx \frac{a+x-1/3}{a+b+n-2/3} = \frac{8/3}{19/3} \approx 0,42;$
- $\text{Var}(\theta|x) = \frac{(a+x)(b+n-x)}{(a+b+n)^2(a+b+n+1)} = \frac{12}{392} \approx 0,031.$

## 2.2 Suficiência

Muitas vezes, a quantidade de dados é muito grande e desejamos “resumir” a informação trazida pelos dados. Uma forma de fazê-lo sem perder informação sobre o parâmetro de interesse é usar uma *estatística suficiente*.

**Definição:** Dizemos que uma função da amostra  $T : \mathfrak{X} \rightarrow \mathbb{R}^p$  é uma *estatística suficiente* (do ponto de vista *frequentista*) se  $f(x|T(x), \theta) = f(x|T(x))$ .

Em palavras, conhecendo o valor da estatística suficiente, a distribuição da amostra (do v.a.  $X$ ) não depende mais do parâmetro  $\theta$ . Isso quer dizer que a informação disponível na amostra  $X$  sobre  $\theta$  está contida em  $T(X)$ . Obter uma estatística suficiente nem sempre é uma tarefa fácil mas o resultado a seguir, conhecido como *critério da fatoração* permite identificar estatísticas suficientes.

**Teorema:** A estatística  $T : \mathfrak{X} \rightarrow \mathbb{R}^p$  é suficiente para a família de distribuições  $\{f(\cdot|\theta) : \theta \in \Theta\}$  se, e somente se, para todo  $x \in \mathfrak{X}$  e para todo  $\theta \in \Theta$ , podemos escrever  $f(x|\theta) = u(x)v(T(x), \theta)$ , onde  $u$  é uma função positiva que não depende de  $\theta$  e  $v$  é uma função não-negativa e depende de  $x$  somente através de  $T(x)$ .

**Exemplo:** Seja  $X_1, \dots, X_n$  v.a. tais que, condicional ao conhecimento de  $\theta$ , são c.i.i.d. com  $X_1|\theta \sim \text{Exp}(\theta)$ . Então,

$$f(x|\theta) = \prod f(x_i|\theta) = \prod \theta e^{-\theta x_i} \mathbb{I}_{\mathbb{R}_+}(x_i) = \theta^n e^{-\theta \sum x_i} \prod \mathbb{I}_{\mathbb{R}_+}(x_i) = v(\sum x_i, \theta) u(x).$$

Portanto,  $T(x) = \sum x_i$  é estatística suficiente para  $\theta$ . De fato, como  $T(X) = \sum X_i|\theta \sim \text{Gama}(n, \theta)$  e  $\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} \subseteq \{T(X) = \sum X_i = \sum x_i = t\}$ ,

$$f(x|T(x), \theta) = \frac{f(x, T(x)|\theta)}{f(T(x)|\theta)} = \frac{f(x|\theta)}{f(\sum X_i|\theta)} = \frac{\theta^n e^{-\theta \sum x_i} \prod \mathbb{I}_{\mathbb{R}_+}(x_i)}{\frac{\theta^n}{\Gamma(n)} t^{n-1} e^{-\theta t} \prod \mathbb{I}_{\mathbb{R}_+}(x_i)} = \frac{\Gamma(n)}{t^{n-1}} \mathbb{I}_{\mathbb{R}_+}(t),$$

que não depende de  $\theta$ .

Sob o enfoque bayesiano, a definição de suficiência é um pouco mais intuitiva que a frequentista.

**Definição:** Dizemos que uma função da amostra  $T : \mathfrak{X} \rightarrow \mathbb{R}^p$  é uma *estatística suficiente* (no sentido *bayesiano*) se  $f(\theta|T(x)) = f(\theta|x)$ , para todo  $x \in \mathfrak{X}$ .

Voltando ao exemplo, suponha agora que, a priori,  $\theta \sim \text{Gama}(a, b)$ . Então,

$$f(\theta|x) \propto f(x|\theta)f(\theta) \propto \theta^n e^{-\theta \sum x_i} \theta^{a-1} e^{-b\theta} \propto \theta^{a+n-1} e^{-(b+\sum x_i)\theta}$$

Seja  $T = T(X) = \sum X_i$ , temos que  $T|\theta \sim \text{Gamma}(n, \theta)$ , de modo que

$$f(\theta|T(x) = t) \propto f(t|\theta)f(\theta) \propto \theta^n t^{n-1} e^{-\theta t} \theta^{a-1} e^{-b\theta} \propto \theta^{a+n-1} e^{-(b+t)\theta}, \text{ com } t = \sum x_i.$$

Assim,  $\theta|x \sim \theta|T(x) \sim \text{Gamma}(a+n, b+\sum x_i)$  e, portanto,  $T(X) = \sum X_i$  é estatística suficiente para  $\theta$ .

Para os casos mais comuns, as definições são equivalentes (Schervish, 2012). Pelo teorema da fatoração, temos que  $f(x|\theta) = u(x)v(T(x), \theta)$  e, portanto

$$f(\theta|x) \propto f(\theta)f(x|\theta) \propto f(\theta)v(T(x), \theta)$$

que só depende de  $x$  por meio de  $T(x)$ .

Um dos princípios de inferência estatística é o *princípio da suficiência*. Segundo este, se  $T$  é uma estatística suficiente para  $\theta$  e se dois pontos amostrais  $x, y \in \mathfrak{X}$  são tais que  $T(x) = T(y)$  então as inferências baseadas nesses pontos devem ser as mesmas. Adiante, retomaremos esse princípio de forma mais formal.

## 2.3 Distribuição a Priori

- A priori é sempre subjetiva (assim como a escolha do modelo estatístico)!
  - Por exemplo, dizer que os dados seguem uma distribuição normal, é uma escolha subjetiva, muitas vezes baseadas nas facilidades matemáticas que essa distribuição proporciona.
  - Do mesmo modo, suponha que dois indivíduos que consideram que a distribuição do parâmetro é simétrica, com mesmas suposições sobre média e variância. O primeiro pode optar por representar sua distribuição usando uma distribuição Normal, enquanto o segundo pode utilizar uma distribuição T ou Cauchy.
- Não existe “opinião errada”, existem opiniões diferentes, dado o nível de conhecimento e as experiências prévias do indivíduo.
- A priori deve ser sua opinião apenas sobre o parâmetro  $\theta$  e não deve depender de fatores como o desenho do experimento ou o objetivo do estudo.


### 2.3.1 Método do Histograma

- Muitas vezes, para “extrair” o conhecimento de um especialista, podemos dividir o espaço paramétrico em regiões e pedir para o especialista “ordenar” esses conjuntos, utilizando “pesos” que refletem a crença que o parâmetro esteja em cada uma daquelas regiões.

- **Exemplo 1.** (Albert (2009), pág 27)


- Seja  $\theta$  uma proporção desconhecida ( $\Theta = [0, 1]$ );
- Considere a partição  $T = \{[0, 0.1), [0.1, 0.2), \dots, [0.9, 1]\}$ ;
- Suponha que um especialistas atribui pesos  $p = (1, 5.2, 8, 7.2, 4.6, 2.1, 0.7, 0.1, 0, 0)$  a esse intervalos;
- A priori, nesse caso, é o histograma apresentado a seguir.

```
p=c(1, 5.2, 8, 7.2, 4.6, 2.1, 0.7, 0.1, 0, 0)
prior = c(0,p/(sum(p)))
tibble(theta=seq(0,1,0.1), prior) %>%
  ggplot(data=.) +
  geom_step(aes(x=theta,y=prior),direction="vh",color="red",lwd=1.5)
```



- Voltando ao exemplo da moeda, suponha novamente que foram observados  $x = 2$  sucessos em  $n = 5$  lançamentos. A posteriori nesse caso pode ser obtida multiplicando a distribuição a priori pela verossimilhança e “padronizando” a função obtida. Assim:

```
n=5
x=2
p = c(1, 5.2, 8, 7.2, 4.6, 2.1, 0.7, 0.1, 0, 0)
p = p/(sum(p))
theta = seq(0,1,0.01)
prior = c(rep(p,each=10),0)/sum(c(rep(p,each=10),0))
vero = dbinom(x,n,theta)/sum(dbinom(x,n,theta))
post = (prior * vero)/sum(prior * vero)
pH = tibble(theta=rep(theta,3),dens=c(prior,vero,post),Dist=rep(c('1.priori','2.verossimilhança','3.posterior'),each=10))
ggplot(data=pH) +
  geom_line(aes(x=theta,y=dens,colour=Dist),lwd=1.5)
```



### 2.3.2 Elicitação de Hiperparâmetros

- Nessa abordagem, a priori é obtida da seguinte maneira:
  1. Escolha uma família de distribuições conveniente. O conceito de “conveniência” aqui pode levar em conta, por exemplo, o suporte da distribuição, se é flexível o suficiente para acomodar diversos tipos de opinião, se permite a obtenção analítica da posteriori e assim por diante;
  2. Obtenha um conjunto de medidas resumo (como média, variância, quantis, etc.);
  3. Utilize as medidas resumo para calcular hiperparâmetros da distribuição escolhida.
- **Exemplo:** Na seção anterior, a priori dada pelo histograma tem média  $m = 0.31$  e variância aproximadamente  $v = 0.02$ . Podemos utilizar como priori, por exemplo, uma distribuição beta com essa média e variância, já que a beta tem um suporte conveniente e facilita as contas, como também já vimos. Assim, vamos considerar uma distribuição  $Beta(a, b)$  e escolher  $a$  e  $b$  satisfazendo:

$$(i) \ E[\theta] = \frac{a}{a+b} = m \Leftrightarrow b = \left(\frac{1-m}{m}\right) a$$

$$(ii) \ Var(\theta) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)} = 0.02 \Leftrightarrow a = \frac{m(m-m^2-v)}{v}$$


Resolvendo o sistema temos, de forma geral, que  $a = \frac{m(m-m^2-v)}{v}$  e  $b = \frac{(1-m)(m-m^2-v)}{v}$ .

Assim, no nosso exemplo, teríamos uma  $Beta(3, 6.7)$ . Além disso, já vimos que, nesse caso, a distribuição a posteriori é  $Beta(3+x, 6.7+n-x)$ . Considerando novamente  $n = 5$  e  $x = 2$ , temos:

```

n=5; x=2
m=0.31; v=0.02
a=m*(m-m^2-v)/v; b=(1-m)*(m-m^2-v)/v
p = c(1, 5.2, 8, 7.2, 4.6, 2.1, 0.7, 0.1, 0, 0)
p = p/(sum(p))
theta = seq(0,1,0.01)
prior = dbeta(theta,a,b)/sum(dbeta(theta,a,b))
vero = dbinom(x,n,theta)/sum(dbinom(x,n,theta))
post = dbeta(theta,a+x,b+n-x)/sum(dbeta(theta,a+x,b+n-x))
priorH = c(rep(p,each=10),0)/sum(c(rep(p,each=10),0))
tibble(theta=rep(theta,4),dens=c(prior,vero,post,priorH),
  Dist=rep(c('1.Priori Beta','2.Verossimilhança','3.Posteriori','0.Priori Histograma'),each=101)) %>%
  ggplot(data=.) +
  geom_line(aes(x=theta,y=dens,colour=Dist),lwd=1.5)

```



### 2.3.3 Prioris Conjugadas

Como visto no exemplo da moeda, em que a distribuição a priori era  $Beta(a, b)$ , a posteriori era facilmente obtida e também estava na classe das distribuições  $Beta$ . Em particular, quando observasse  $x$  sucessos em  $n$  realizações de ensaios de Bernoulli, a distribuição a posteriori é  $Beta(a+x, b+n-x)$ . Isso ocorre pois essa distribuição pertence à uma classe bastante específica de distribuições a priori, chamadas distribuições conjugadas.

**Definição** Seja  $\mathcal{P} = \{f(x|\theta) : \theta \in \Theta\}$  uma família de distribuições (condicionais) para  $X$  e considere  $\mathcal{C} = \{h(\theta|a) : a \in A\}$  uma família de distribuições para  $\theta$ . Dizemos que (a família)  $\mathcal{C}$  é **conjugada** para  $\mathcal{P}$  se,  $\forall h(\theta) \in \mathcal{C}$ ,  $h(\theta|x) \propto f(x|\theta)h(\theta) \in \mathcal{C}$ ,  $\forall x \in \mathfrak{X}$ .

**Resultado 1.** Seja  $X$  v.a. tal que, condicional ao conhecimento de  $\theta$ ,  $X|\theta \sim Bin(n, \theta)$ . Considere que, a priori,  $\theta \sim Beta(a, b)$ . Então,  $\theta|X = x \sim Beta(a+x, b+n-x)$ . Portanto, a família  $\mathcal{C} = \{Beta(a_1, a_2) : (a_1, a_2) \in \mathbb{R}_+^2\}$  é conjugada para  $\mathcal{P} = \{Bin(n, \theta) : \theta \in [0, 1]\}$ .



- Esse resultado também vale se

1.  $X_1, \dots, X_n$  são v.a.s *condicionalmente independentes e identicamente distribuídas* (c.i.i.d.) com  $X_i|\theta \sim \text{Ber}(\theta)$
2.  $X_i|\theta \sim \text{Geo}(\theta)$ ,  $i = 1, \dots, n$  c.i.i.d.
3.  $X_i|\theta \sim \text{BinNeg}(k, \theta)$   
 $\theta \sim \text{Beta}(a, b) \Rightarrow \theta|X = x \sim \text{Beta}(a + s, b + f)$  em que  $s$  é o número de sucessos e  $f$  é o número de fracassos.

**Resultado 2.** (*generalização do resultado anterior para o caso em que o número de categorias é maior que 2*)

Seja  $X|\theta \sim \text{Multinomial}(n, \theta)$ , isto é, sua função de probabilidade é dada por

$$f(x|\theta) = \binom{n}{x_1, x_2, \dots, x_k} \prod_{i=1}^{k-1} \theta_i^{x_i} \underbrace{\left(1 - \sum_{i=1}^{k-1} \theta_i\right)^{n - \sum_{i=1}^{k-1} x_i}}_{\theta_k^{x_k}}$$

em que  $\theta_i \in [0, 1]$  com  $\sum_{i=1}^K \theta_i = 1$ ,  $x_i \in \{0, 1, \dots, n\}$  com  $\sum_{i=1}^n x_i = n$  e  $\binom{n}{x_1, x_2, \dots, x_k} = \frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!}$ .

Considere que, a priori,  $\theta \sim \text{Dirichlet}(a_1, \dots, a_k)$ ,  $a_i > 0, i = 1, \dots, k$ , isto é, a f.d.p. a priori para  $\theta$  é dada por

$$f(\theta) = \frac{\Gamma(\sum_{i=1}^K a_i)}{\Gamma(a_1)\Gamma(a_2)\dots\Gamma(a_k)} \prod_{i=1}^{k-1} \theta_i^{a_i-1} \underbrace{\left(1 - \sum_{i=1}^{k-1} \theta_i\right)^{a_k-1}}_{\theta_k^{a_k-1}}.$$

Então, a distribuição a posteriori para  $\theta$  é  $\theta|X = x \sim \text{Dirichlet}(a_1 + x_1, \dots, a_k + x_k)$ .

**Demo:** Para verificar o resultado, basta ver que

$$f(\theta|x) = \frac{f(x|\theta)f(\theta)}{\int_{\Theta} f(x|\theta)f(\theta)d\theta} \propto f(x|\theta)f(\theta) \propto \prod_{i=1}^{k-1} \theta_i^{(a_i+x_i)-1} \left(1 - \sum_{i=1}^{k-1} \theta_i\right)^{(a_k+x_k)-1}$$

**Resultado 3.** Seja  $X_1, \dots, X_n$  v.a. c.i.i.d tais que  $X_i|\theta \sim \text{Unif}(0, \theta)$  e considere que, a priori,  $\theta \sim \text{Pareto}(a, b)$ . Então  $\theta|X = x \sim \text{Pareto}(a + n, \max\{b, x_{(n)}\})$ .

**Demo:**

$$f(x|\theta) \stackrel{ci}{=} \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta) \stackrel{id}{=} \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} \mathbb{I}_{[0, \theta]}(x_i) = \frac{1}{\theta^n} \mathbb{I}_{[0, \theta]}(x_{(n)}) = \frac{1}{\theta^n} \mathbb{I}_{[x_{(n)}, +\infty)}(\theta)$$

em que  $x_{(n)} = \max\{x_1, \dots, x_n\}$ .

$$f(\theta) = \frac{ab^a}{\theta^{a+1}} \mathbb{I}_{[b, +\infty)}(\theta).$$

Então

$$f(\theta|x) \propto f(x|\theta)f(\theta) = \frac{1}{\theta^{a+n+1}} \mathbb{I}_{[x_{(n)}, +\infty)}(\theta) \mathbb{I}_{[b, +\infty)}(\theta) = \frac{1}{\theta^{a+n+1}} \mathbb{I}_{[\max\{b, x_{(n)}\}, +\infty)}(\theta)$$

$\Rightarrow \theta|X = x \sim \text{Pareto}(a + n, \max\{b, x_{(n)}\})$ .

**Resultado 4.** Seja  $X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m$  v.a. condicionalmente independentes tais que  $X_i|\theta \sim \text{Exp}(\theta), i = 1, \dots, n$  e  $Y_j|\theta \sim \text{Poisson}(\theta), j = 1, \dots, m$ . Considere que, a priori,  $\theta \sim \text{Gama}(a, b)$ . Então  $\theta|x, y \sim \text{Gama}(a + n + \sum_j y_j, b + m + \sum_i x_i)$ .

**Demo:**

$$\begin{aligned} f(x, y|\theta) &\stackrel{ci}{=} f(x|\theta)f(y|\theta) \stackrel{ci}{=} \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta) \prod_{j=1}^m f(y_j|\theta) = \prod_{i=1}^n \theta e^{-\theta x_i} \prod_{j=1}^m \frac{\theta^{y_j} e^{-\theta}}{y_j!} = \\ &\frac{1}{\prod_{j=1}^m y_j!} \theta^{n+\sum_j y_j} e^{-(m+\sum_i x_i)\theta} \\ f(\theta) &= \frac{b^a}{\Gamma(a)} \theta^{a-1} e^{-b\theta} \\ f(\theta|x, y) &\propto f(x, y|\theta)f(\theta) \propto \theta^{[a+n+\sum_j y_j]-1} e^{-[b+m+\sum_i x_i]\theta} \\ &\Rightarrow \theta|x, y \sim \text{Gama}(a + n + \sum_j y_j, b + m + \sum_i x_i) \end{aligned}$$

**Resultado 5.** Seja  $\mathcal{P} = \{f(x|\theta) : \theta \in \Theta\}$  e  $\mathcal{C} = \{h(\theta|a) : a \in A\}$  uma família conjugada para  $\mathcal{P}$ . Considere  $\mathcal{M} = \{h(\theta) = \sum_{i=1}^m w_i h_i(\theta) : h_i \in \mathcal{C} \text{ e } w_i > 0, \sum_{i=1}^m w_i = 1\}$ . Então  $\mathcal{M}$  é família conjugada para  $\mathcal{P}$ .

**Demo:** Como  $\mathcal{C}$  é conjugada para  $\mathcal{P}$ , para toda função  $h_i \in \mathcal{C}$ , temos que  $f_i(\theta|x) \propto h_i(\theta)f(x|\theta) \in \mathcal{C}$ . Então

$$h \in \mathcal{M} \Rightarrow f(\theta|x) \propto h(\theta)f(x|\theta) \propto \sum_{i=1}^m w_i \underbrace{h_i(\theta)f(x|\theta)}_{\in \mathcal{C}} \propto \sum_{i=1}^m w_i^* f_i(\theta|x) \in \mathcal{M}.$$

**Exemplo.** Seja  $X|\theta \sim \text{Bin}(n, \theta)$  e  $f(\theta) = wf_1(\theta) + (1-w)f_2(\theta)$ , com  $f_1 \sim \text{Beta}(a_1, b_1)$  e  $f_2 \sim \text{Beta}(a_2, b_2)$ .

$$\begin{aligned} f(\theta|x) &= \frac{f(x|\theta)f(\theta)}{\int_0^1 f(x|\theta)f(\theta)} = \frac{f(x|\theta)[wf_1(\theta) + (1-w)f_2(\theta)]}{w \int_0^1 f_1(\theta)f(x|\theta)d\theta + (1-w) \int_0^1 f_2(\theta)f(x|\theta)d\theta} \\ &\propto \frac{w \binom{n}{x} \frac{\Gamma(a_1+b_1)}{\Gamma(a_1)\Gamma(b_1)} \theta^{a_1+x-1} (1-\theta)^{b_1+n-x-1} + (1-w) \binom{n}{x} \frac{\Gamma(a_2+b_2)}{\Gamma(a_2)\Gamma(b_2)} \theta^{a_2+x-1} (1-\theta)^{b_2+n-x-1}}{\underbrace{w \binom{n}{x} \frac{\Gamma(a_1+b_1)}{\Gamma(a_1)\Gamma(b_1)} \frac{\Gamma(a_1+x)\Gamma(b_1+n-x)}{\Gamma(a_1+b_1+n)}}_A + \underbrace{(1-w) \binom{n}{x} \frac{\Gamma(a_2+b_2)}{\Gamma(a_2)\Gamma(b_2)} \frac{\Gamma(a_2+x)\Gamma(b_2+n-x)}{\Gamma(a_2+b_2+n)}}_B} \\ &\propto \underbrace{\frac{A}{A+B}}_{w^*} \text{Beta}(a_1+x, b_1+n-x) + \underbrace{\frac{B}{A+B}}_{1-w^*} \text{Beta}(a_2+x, b_2+n-x). \end{aligned}$$

Primeiramente, suponha que  $n = 5$ , e temos uma mistura das distribuições  $\text{Beta}(5, 12)$  e  $\text{Beta}(10, 3)$ , com  $w = 0.5$ . O gráfico a seguir apresenta as distribuições a priori, a verossimilhança e a posteriori para cada possível valor de  $x$  em  $\{0, 1, \dots, 5\}$ .

```
a1=5; b1=12
a2=10; b2=3
n=5
w=0.5
```

```
theta = seq(0,1,0.01)
```

```
A = as.vector(apply(matrix(seq(0,n)),1,
```

```

function(x){w*choose(n,x)*gamma(a1+b1)/(gamma(a1)*gamma(b1))*
  (gamma(a1+x)*gamma(b1+n-x))/gamma(a1+b1+n)}})

B = as.vector(apply(matrix(seq(0,n)),1,
  function(x){(1-w)*choose(n,x)*gamma(a2+b2)/(gamma(a2)*gamma(b2))*
    (gamma(a2+x)*gamma(b2+n-x))/gamma(a2+b2+n)}}))

w2 = A/(A+B)

prior2 = as.vector(apply(matrix(seq(0,n)),1,
  function(x){w*dbeta(theta,a1,b1)+
    (1-w)*dbeta(theta,a2,b2)})))


post2 = as.vector(as.matrix(mapply(function(x,w2){
  w2*dbeta(theta,a1+x,b1+n-x)+
  (1-w2)*dbeta(theta,a2+x,b2+n-x)},seq(0,n),w2)))

#vero = as.vector(apply(matrix(seq(0,n)),1,
# function(x){dbinom(x,prob=theta,size=n)})))

# Verossimilhança proporcional visualmente melhor
vero = as.vector(apply(matrix(seq(0,n)),1,
  function(x){dbeta(theta,x+1,n-x+1)})))

tibble(x=as.factor(rep(seq(0,n),each=length(theta))),
  w2=rep(w2,each=length(theta)),
  theta=rep(theta,(n+1)),vero=vero,prior=prior2,post=post2) %>%
  ggplot() +
  geom_line(aes(x=theta,y=post, colour=x),lwd=1.5) +
  geom_line(aes(x=theta,y=prior,colour="Prior"),lwd=1,lty=2) +
  geom_line(aes(x=theta,y=vero,colour="Verossimilhança"),lwd=1,lty=2)+
  xlab(expression(theta)) +
  ylab(expression(paste("f(",theta," | x)")))+
  theme_bw()

```



Agora, suponha que  $n = 5$  e foi observado  $x = 2$ . Novamente, considere a mistura das distribuições  $Beta(5, 12)$  e  $Beta(10, 3)$  mas agora com pesos  $w$  variando no conjunto  $\{0, 0.1, \dots, 0.9, 1\}$ .

```
x = 2
w = seq(0,1,0.1)

A = as.vector(apply(matrix(w),1,
  function(w){w*choose(n,x)*gamma(a1+b1)/(gamma(a1)*
    gamma(b1))*(gamma(a1+x)*gamma(b1+n-x))/gamma(a1+b1+n)}))

B = as.vector(apply(matrix(w),1,
  function(w){(1-w)*choose(n,x)*gamma(a2+b2)/(gamma(a2)*
    gamma(b2))*(gamma(a2+x)*gamma(b2+n-x))/gamma(a2+b2+n)}))

w2 = A/(A+B)


prior2 = as.vector(apply(matrix(w),1,function(w){
  w*dbeta(theta,a1,b1)+(1-w)*dbeta(theta,a2,b2)}))

post2 = as.vector(as.matrix(mapply(function(w,w2){
  w2*dbeta(theta,a1+x,b1+n-x)+
  (1-w2)*dbeta(theta,a2+x,b2+n-x)},w,w2)))

vero = as.vector(apply(matrix(rep(x,2*n+1)),1,
  function(x){dbeta(theta,x+1,n-x+1)}))

z<-length(w)

tibble(w=as.factor(rep(w,each=length(theta))),
  w2=rep(w2,each=length(theta)),
  theta=rep(theta,z), prior = prior2,
  post = post2, vero = vero) %>%
  ggplot(colour = w) +
  geom_line(aes(x=theta,y=post, colour=w),lwd=1.5) +
  geom_line(aes(x=theta,y=prior,colour="Priori")) +
  geom_line(aes(x=theta,y=vero,colour="Verossimilhança"),lwd=1,lty=2)+
  xlab(expression(theta)) + ylab(expression(paste("f(",theta,"|x)")))+
  theme_bw()
```





## Capítulo 3

# Introdução à Teoria da Decisão

A teoria da decisão é uma das possíveis formas de embasar a inferência bayesiana. Sob essa abordagem, considera-se uma *função de perda* (ou *função de utilidade*) que quantifica numericamente as consequências de sua decisão para um dado valor do parâmetro. Essa quantificação de “preferência” é novamente subjetiva e é possível fazer uma construção de função de perda similar ao que fizemos com probabilidade. Ou seja, dado um conjunto de suposições, existe uma função de perda que representa numericamente suas preferências para cada decisão e cada possível valor do parâmetro. Essa construção não será feita aqui mas pode ser encontrada no livro *Optimal Statistical Decisions* (DeGroot, M.H.).

### 3.1 Conceitos Básicos

- $d \in \mathcal{D}$  : **decisão** - uma particular afirmação, por exemplo, sobre  $\theta$ . No contexto inferencial, uma decisão pode ser uma estimativa (pontual ou intervalar) para  $\theta$  ou a escolha de uma hipótese específica em um teste de hipóteses.
- $\mathcal{D}$  : **espaço de decisões** - conjunto de todas as possíveis decisões (afirmações).
- $\theta$  : **estado da natureza** - quantidade desconhecida ou parâmetro, no contexto de inferência estatística.
- $\Theta$  : **espaço dos estados da natureza** - espaço paramétrico.

**Exemplo 1.** Suponha que você está saindo de casa pela manhã e precisa tomar uma importante decisão: levar ou não seu guarda-chuva.

- $\mathcal{D} = \{G, G^c\}$  , onde  $G$  : levar guarda-chuva.
- $\Theta = \{C, C^c\}$  , onde  $C$  : chuva.

Suponha que carregar o guarda-chuva é algo que não lhe agrada mas, por outro lado, você odeia ficar molhado e acredita que a pior situação seria não levá-lo e tomar chuva. Você ficará incomodado se levar o guarda-chuva e chover pois, além de tê-lo carregado, voltou para casa com os sapatos molhados. Note que, nessas circunstâncias, o cenário preferido por você seria não levar o guarda-chuva e não chover.

Para quantificar suas preferências, considere uma função de perda  $L : \mathcal{D} \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ , de modo que, quanto mais algum cenário lhe gera incômodo, maior sua perda. Um exemplo é apresentado a seguir.

	Estados da Natureza	
<b>Decisão</b>	$C$	$C^c$
$G$	2 (ruim)	1 (bom)
$G^c$	3 (pior)	0 (melhor)
$P(\theta)$	$p$	$1-p$

Uma possível maneira de tomar uma decisão é escolher a decisão “menos prejudicial”. Se levar o Guarda chuva, no pior caso, sua perda é  $\max_{\theta} L(G, \theta) = 2$  e, se não levá-lo, a maior perda possível é  $\max_{\theta} L(G^c, \theta) = 3$ . Assim, a decisão que tem a menor dentre as maiores perdas é levar o guarda-chuva. Esse procedimento para tomada de decisões é chamado *min-max* e consiste em escolher a decisão  $d'$  tal que  $d' = \arg\min_d \max_{\theta} L(d, \theta)$ .

Sendo um pouco mais otimista, você pode escolher a decisão que tenha a maior dentre as menores perdas. Esse procedimento é chamado *max-min* e consiste em escolher a decisão  $d' = \arg\max_d \min_{\theta} L(d, \theta)$ . No nosso exemplo, esse procedimento também sugere que você sempre carregue o guarda-chuvas.

Note que a decisão escolhida pelos dois procedimentos descritos anteriormente sugere que você sempre deve carregar o guarda-chuvas. Contudo, isso pode não ser razoável. Imagine que você estava lendo notícias antes de sair de casa e viu que a probabilidade de chuva era 0.01. Nesse caso, não parece fazer sentido você levar o guarda-chuva, já que isso vai te trazer um desconforto e a chance de chover é muito baixa. Assim, a probabilidade de chover deveria ser levada em consideração em sua tomada de decisão.

Uma maneira de fazer isso é utilizar a **perda esperada**. Note que  $\theta$  é uma quantidade desconhecida e, pelo que já foi discutido anteriormente, você deve descrever sua incerteza em relação a essa quantidade em termos de probabilidade. Suponha que no exemplo  $P(C) = p$ ,  $0 \leq p \leq 1$ .

Para cada decisão  $d \in \mathcal{D}$ , é possível calcular o valor esperado da função de perda (**perda esperada** ou **risco** da decisão  $d$  contra a priori  $P$ )


$$\rho(d, P) = E[L(d, \theta) \mid P] = \int_{\Theta} L(\theta) dP(\theta).$$

No exemplo, temos

- $E[L(G, \theta)] = L(G, C)P(C) + L(G, C^c)P(C^c) = 2p + 1(1 - p) = p + 1$ ;
- $E[L(G^c, \theta)] = L(G^c, C)P(C) + L(G^c, C^c)P(C^c) = 3p + 0(1 - p) = 3p$ .

Deste modo, as perdas esperadas associadas a cada decisão dependem da probabilidade de chuva  $p$ . Assim, para cada possível valor de  $p$ , deve-se tomar a decisão que tem menor perda esperada. Por exemplo, se a probabilidade de chuva é  $p = 0.1$ , temos que as perdas esperadas para as decisões de levar ou não o guarda-chuva são, respectivamente,  $E[L(G, \theta)] = 1.1$  e  $E[L(G^c, \theta)] = 0.3$ . Assim, sob essa abordagem, sua decisão seria de não levar o guarda-chuva nesse caso. Por outro lado, se a probabilidade de chuva for  $p = 0.9$ , suas perdas esperadas seriam respectivamente  $E[L(G, \theta)] = 1.9$  e  $E[L(G^c, \theta)] = 2.7$ , de modo que a decisão ótima seria levar o guarda-chuva. O gráfico a seguir apresenta as perdas para cada decisão  $d$  e para cada valor de  $p$ . É possível notar que a decisão ótima é levar o guarda-chuva quando  $p > 0.5$  e não levá-lo caso contrário.





Vamos denotar por  $\rho^*$  o **risco de bayes**, isto é, a perda esperada da **decisão de Bayes** (ou *decisão ótima*)  $d^* \in \mathcal{D}$  tal que  $\rho^*(P) = \rho(d^*, P) = \min_{d \in \mathcal{D}} \rho(d, P)$ .

Para uma argumentação mais formal sobre a escolha pela decisão que minimiza a perda esperada, ver *Optimal Statistical Decisions* (DeGroot, M.H.).

- Vamos denotar um problema de decisão por  $(\Theta, \mathcal{D}, L, P)$ , onde  $\Theta$  é o espaço paramétrico,  $\mathcal{D}$  é o espaço de decisões,  $L : \mathcal{D} \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função de perda e  $P$  é a distribuição de probabilidade que representa sua crença sobre a quantidade desconhecida  $\theta$ . Equivalentemente, a função de perda  $L$  pode ser substituída por uma *função de utilidade*  $U$  (por exemplo, tome  $U = -L$ ).

- A solução para um problema de decisão  $(\Theta, \mathcal{D}, L, P)$  é a *decisão de Bayes*,  $d^* \in \mathcal{D}$ , tal que  $\rho^*(P) = \rho(d^*, P) = \inf_{d \in \mathcal{D}} \rho(d, P)$ , com  $\rho(d, P) = \int_{\Theta} L(d, \theta) dP(\theta)$ .

## 3.2 Aleatorização e Decisões Mistas

Seja  $\mathcal{D} = \{d_1, d_2, \dots\}$  um espaço de decisões e considere  $\mathcal{M}$  o conjunto de todas as *decisões mistas* (ou *aleatorizadas*), isto é, para toda distribuição de probabilidades  $Q = \{q_1, q_2, \dots\}$ , uma decisão  $d \in \mathcal{M}$  se  $d$  consiste em escolher a decisão  $d_i$  com probabilidade  $q_i$ .

Assim, a perda associada à uma decisão  $d \in \mathcal{M}$  é  $L(d, \theta) = \sum q_i L(d_i, \theta)$  e o risco dessa decisão é

$$\rho(d, P) = \int_{\Theta} L(d, \theta) dP(\theta) = \int_{\Theta} \sum q_i L(d_i, \theta) dP(\theta) = \sum q_i \int_{\Theta} L(d_i, \theta) dP(\theta) = \sum q_i \rho(d_i, P).$$

Considere a decisão  $d^* \in \mathcal{D}$  tal que  $\rho(d^*, P) = \inf_{d \in \mathcal{D}} \rho(d, \theta)$ .

Então,  $\forall d \in \mathcal{M}$ ,

$$\rho(d, P) = \sum q_i \rho(d_i, \theta) \geq \sum q_i \rho(d^*, \theta).$$

- Em palavras, para toda decisão aleatorizada  $d \in \mathcal{M}$ , existe uma decisão não aleatorizada  $d^* \in \mathcal{D} \subset \mathcal{M}$ , tal que  $\rho(d^*, P) \leq \rho(d, P)$ .

### 3.3 Problemas com Dados

Suponha que antes de escolher uma decisão  $d \in \mathcal{D}$ , é possível observar um v.a.  $X$  que (supostamente) está relacionado com  $\theta$  (isto é,  $X$  traz alguma informação sobre  $\theta$ ).

Desde modo, considere a família  $\mathcal{P} = \{f(\cdot|\theta) : \theta \in \Theta\}$  de funções de distribuição condicionais para  $X$ , isto é, para cada  $\theta \in \Theta$  é possível determinar a distribuição condicional de  $X|\theta$ . Essa distribuição, juntamente com a distribuição a priori  $f(\theta)$ , determina totalmente uma distribuição conjunta  $f(x, \theta) = f(x|\theta)f(\theta)$ .

Pode-se definir uma **função de decisão**  $\delta : \mathfrak{X} \rightarrow \mathcal{D}$  que associa a cada resultado experimental  $x \in \mathfrak{X}$  uma decisão  $d \in \mathcal{D}$ . Denote o conjunto de todas as possíveis funções de decisão por  $\Delta$ .

O risco  $r(\delta, P)$  da função de decisão  $\delta \in \Delta$  é dado por  $r(\delta, P) = E[L(\delta, \theta)] = \int_{\Theta} \int_{\mathfrak{X}} L(\delta(x), \theta) dP(x, \theta)$ .

A *função de decisão de Bayes*,  $\delta^* \in \Delta$ , é tal que  $\rho^*(P) = \rho(\delta^*, P) = \inf_{\delta \in \Delta} \rho(\delta, P)$ .

**Exemplo 1.** Seja  $\Theta = \{\theta_1, \theta_2\}$ ,  $\mathcal{D} = \{d_1, d_2\}$ ,  $X|\theta_1 \sim \text{Ber}(3/4)$ ,  $X|\theta_2 \sim \text{Ber}(1/3)$ ,  $\mathfrak{X} = \{0, 1\}$  e, a priori,  $P(\theta = 3/4) = P(\theta = 1/3) = 1/2$ . Considere a função de perda a seguir.

L	$\theta_1$	$\theta_2$
$d_1$	0	5
$d_2$	10	0

Temos que  $|\Delta| = 2^2 = 4$ , de modo que as possíveis funções de decisão são

$$\delta_1(x) = \begin{cases} d_1, & x = 1 \\ d_2, & x = 0 \end{cases}$$

$$\delta_2(x) = \begin{cases} d_1, & x = 0 \\ d_2, & x = 1 \end{cases}$$

$$\delta_3(x) = d_1 \text{ e } \delta_4(x) = d_2.$$

Para a função  $\delta_1$ , temos

x	$\theta$	$L(\delta_1(x), \theta)$	$P(x \theta)$	$P(\theta)$	$P(x, \theta)$
0	$\theta_1$	10	1/4	1/2	1/8
0	$\theta_2$	0	2/3	1/2	2/6
1	$\theta_1$	0	3/4	1/2	3/8
1	$\theta_2$	5	1/3	1/2	1/6

$$\rho(\delta_1) = \sum_{x=0}^1 \sum_{i=1}^2 L(\delta_1(x), \theta_i) \underbrace{P(X=x|\theta_i)P(\theta_i)}_{P(x,\theta)} = 10 \frac{1}{8} + 5 \frac{1}{6} = \frac{50}{24}$$

De forma análoga,  $\rho(\delta_2, P) = 130/24$ ,  $\rho(\delta_3, P) = 60/24$ ,  $\rho(\delta_4, P) = 120/24$ , e, assim.

$$\delta^*(x) = \delta_1^*(x) = \begin{cases} d_1, & x = 1 \\ d_2, & x = 0 \end{cases}$$

**Risco de Bayes:**  $\rho^*(P) = \rho(\delta^*, P) = 50/24$ .

Em problemas mais complicados, pode ser muito trabalhoso (ou impossível) obter a função de decisão dessa forma, chamada *forma normal*. Sob essa abordagem, é necessário encontrar a função de decisão de Bayes  $\delta^*$  dentre todas as possíveis funções de decisão. Nesses casos, pode ser mais fácil resolver o problema usando a *forma extensiva* em que, para cada  $x \in \mathfrak{X}$ , obtem-se a decisão de Bayes  $d_x^*$  que minimiza o *risco posterior*, definido por  $r_x(d) = \int_{\Theta} L(d, \theta) dP(\theta|x)$ .

Assim, é possível obter uma decisão de Bayes  $d_x^*$  para um específico ponto  $x$  observado ou, ainda, construir uma função de decisão de Bayes, fazendo  $\delta^*(x) = d_x^*$  para cada  $x \in \mathfrak{X}$ . A seguir, é mostrado que essa duas formas produzem resultados que minimizam o risco. Note que

$$r(\delta, P) = E[L(\delta, \theta)] = \int_{\Theta} \int_{\mathfrak{X}} L(\delta(x), \theta) dP(x, \theta) = \int_{\Theta} \int_{\mathfrak{X}} L(\delta(x), \theta) dP(x|\theta) dP(\theta) = \int_{\mathfrak{X}} \left[ \underbrace{\int_{\Theta} L(\delta(x), \theta) dP(\theta|x)}_{r_x(\delta(x))} \right] dP(x)$$

Note que a integral interna (em  $\theta$ ) pode ser resolvida para cada  $x$  fixado. Para cada  $x$ , considere a decisão  $d_x^*$  tal que  $r_x(d_x^*) = \inf_{d \in \mathcal{D}} r_x(d)$ . Assim

$$\begin{aligned} r(\delta, P) &= \int_{\mathfrak{X}} \left[ \underbrace{\int_{\Theta} L(\delta(x), \theta) dP(\theta|x)}_{r_x(\delta(x))} \right] dP(x) = \int_{\mathfrak{X}} [r_x(\delta(x))] dP(x) \geq \int_{\mathfrak{X}} [r_x(d_x^*)] dP(x) = \\ &= \int_{\mathfrak{X}} [r_x(d_x^*)] dP(x). \end{aligned}$$

Assim, a função  $\delta^*(x) = d_x^*$  é uma *função de decisão de Bayes*.

**No Exemplo 1**  $X|\theta_1 \sim \text{Ber}(3/4)$ ,  $X|\theta_2 \sim \text{Ber}(1/3)$  e  $P(\theta_1) = P(\theta_2) = 1/2$ .

$$P(\theta_1|x=0) = \frac{P(X=0|\theta_1)P(\theta_1)}{P(X=0|\theta_1)P(\theta_1) + P(X=0|\theta_2)P(\theta_2)} = \frac{\frac{1}{4} \frac{1}{2}}{\frac{1}{4} \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \frac{1}{2}} = \frac{3}{11}$$

$$P(\theta_2|X=0) = \frac{8}{11}$$

$$r_x(d_1, P) = \sum_{i=1}^2 L(d_1, \theta_i) P(\theta_i|X=0) = 0 P(\theta_1|X=0) + 10 P(\theta_2|X=0) = \frac{80}{11}$$

$$r_x(d_2, P) = 5 P(\theta_1|X=0) + 0 P(\theta_2|X=0) = \frac{15}{11}$$

Logo, para  $x=0$ ,  $d_0^* = d_2$ . De forma análoga, para  $x=1$ ,  $d_1^* = d_2$  e, assim,

$$\delta^*(x) = \begin{cases} d_2, & x = 0 \\ d_1, & x = 1 \end{cases}.$$



## Capítulo 4

# Estimação

### 4.1 Estimação Pontual

Todos os problemas de inferência estatística podem ser vistos como um caso particular de Teoria da Decisão. Um problema de estimação pontual consiste em encontrar um “chute” para o valor do parâmetro  $\theta$ , de modo que o espaço de decisões é  $\mathcal{D} = \Theta$ . Além disso, nesse tipo de problema é usual considerar funções de perda da forma  $L(d, \theta) = s(\theta)\Delta(d, \theta)$ , onde  $\Delta$  é alguma distância (ou uma medida de discrepância) relacionada ao erro por tomar a decisão  $d$  quando o valor do parâmetro é  $\theta$  e  $s$  é uma função não-negativa relacionada à gravidade do erro para cada  $\theta$  (pode ser constante).

**Exemplo** Considere um problema de estimação pontual, isto é,  $\mathcal{D} = \Theta$ , onde a função de perda é dada por  $L(d, \theta) = (d - \theta)^2$ , conhecida como *perda quadrática*.

$$r_x(d) = \int_{\Theta} (d - \theta)^2 dP(\theta|x) = \int_{\Theta} (d^2 - 2d\theta + \theta^2) dP(\theta|x) = d^2 \int_{\Theta} dP(\theta|x) - 2d \int_{\Theta} \theta dP(\theta|x) + \int_{\Theta} \theta^2 dP(\theta|x) = d^2 - 2d E[\theta|x] + E[\theta^2|x] = g(d).$$

$$\frac{\partial g(d)}{\partial d} = 2d - 2E[\theta|x] = 0 \Rightarrow d_x^* = E[\theta|x].$$

Logo, um estimador para  $\theta$  contra a perda quadrática é  $\delta^*(X) = E[\theta|X]$ .

- Estimador de Bayes para  $\theta$  contra diferentes funções de perda:

1. Perda Quadrática:  $L_2(d, \theta) = (d - \theta)^2 \Rightarrow \delta_2^*(X) = E[\theta|X]$ ;

2. Perda Absoluta:  $L_1(d, \theta) = |d - \theta| \Rightarrow \delta_1^*(X) = Med(\theta|X)$ ;

3. Perda 0-1:  $L_0(d, \theta) = c \mathbb{I}(d \neq \theta) \Rightarrow \delta_0^*(X) = Moda(\theta|X)$ .

**Exemplo 1.** Voltando à *Perda Quadrática*:  $L(d, \theta) = a(d - \theta)^2$ ,  $a > 0$ .

Já vimos que  $\delta^*(X) = E[\theta|X]$ . É importante notar que esse estimador só faz sentido se  $E[\theta|X] \in \mathcal{D}$ . Nos casos em que isso não ocorre, tomamos um valor  $d_x^* \in \mathcal{D}$  próximo a  $E[\theta|X]$  tal que  $r_x(d_x^*)$  é mínimo.

O risco a posteriori para esse estimador é

$$r_x(\delta^*(x)) = r_x(E[\theta|x]) = \int_{\Theta} L(\delta^*(x), \theta) dP(\theta|x) = \int_{\Theta} (\theta - E[\theta|x])^2 dP(\theta|x) = \text{Var}(\theta|x),$$

de modo que o risco de Bayes é dado por

$$\rho^*(P) = \rho(\delta^*(X), P) = \int_{\mathcal{X}} \underbrace{\int_{\Theta} (\theta - E[\theta|x])^2 dP(\theta|x)}_{\text{Var}[\theta|x]} dP(x) = E[\text{Var}(\theta|X)].$$

A variância da posteriori  $\text{Var}(\theta|x)$  pode ser vista como uma medida de informação, no sentido que quanto menor essa variância, mais concentrada é a distribuição e há “*menos incerteza*” sobre  $\theta$ . Nesse sentido, espera-se que ao observar  $X = x$ , a variância  $\text{Var}(\theta|x)$  diminua em relação a variância da priori  $\text{Var}(\theta)$ .

$$\underbrace{\text{Var}(\theta)}_{\text{constante}} = \underbrace{E[\text{Var}(\theta|X)]}_{\downarrow} + \underbrace{\text{Var}[E(\theta|X)]}_{\uparrow}$$

Aparentemente, quando espera-se que a variância da posteriori diminua, a variância do estimador deveria aumentar. Muitas vezes isso é colocado como se o objetivo fosse encontrar o estimador de maior variância, em contradição com a abordagem frequentista. Contudo, há outra interpretação desse resultado: deseja-se obter um estimador que varie bastante de acordo com o valor observado de  $X$ , isto é, a informação trazida pela amostra muda sua opinião sobre  $\theta$ .

**Exemplo 2.** Considere  $X_1, \dots, X_n$  c.i.i.d. tais que  $X_i|\theta \sim \text{Poisson}(\theta)$  e, a priori,  $\theta \sim \text{Gama}(a, b)$ .

A função de verossimilhança é  $f(x|\theta) \propto \prod \theta^{x_i} e^{-\theta}$  e a priori é  $f(\theta) \propto \theta^{a-1} e^{-b\theta}$ .

Assim,  $f(\theta|x) \propto \theta^{\sum x_i} e^{-n\theta}$  .  $\theta^{a-1} e^{-b\theta} \propto \theta^{a+\sum x_i-1} e^{-(b+n)\theta}$ , de modo que  $\theta|X = x \sim \text{Gama}(a + \sum x_i, b + n)$ .

Como visto anteriormente, o estimador de Bayes contra a perda quadrática é

$$\delta^*(X) = E[\theta|X] = \frac{a + \sum_i X_i}{b + n}.$$

Para calcular o risco de Bayes, note que  $E[X_i|\theta] = \theta$ , de modo que  $E[X_i] = E[E(X_i|\theta)] = E[\theta] = a/b$ .

Além disso,  $\text{Var}(\theta) = \frac{a}{b^2}$  e  $\text{Var}(\theta|X) = \frac{a + \sum_i X_i}{(b + n)^2}$ . Então,

$$\rho^*(P) = E[\text{Var}(\theta|X)] = E\left[\frac{a + \sum_i X_i}{(b + n)^2}\right] = \frac{(a + \sum E[X_i])}{(b + n)^2} = \frac{\frac{a}{b}(b + n)}{(b + n)^2} = \frac{a}{b(b + n)}.$$

Por fim, note que a decisão de Bayes pode ser escrita como uma combinação linear convexa da média da distribuição a priori e do estimador de máxima verossimilhança

$$E[\theta|X] = \frac{a + \sum_i X_i}{b + n} = \frac{b}{b + n} \left(\frac{a}{b}\right) + \frac{n}{b + n} \bar{X}.$$

**Resultado:** Seja  $L(d, \theta) = \mathbb{I}(|\theta - d| > \varepsilon) = 1 - \mathbb{I}(d - \varepsilon \leq \theta \leq d + \varepsilon)$ ,  $\varepsilon > 0$ . Então,  $\delta^*(X)$  é centro do intervalo modal, isto é, o intervalo de tamanho  $2\varepsilon$  de maior densidade a posteriori. Em particular, quando  $\varepsilon \downarrow 0$ , temos que  $\delta^*(X) = \text{Moda}(\theta|X)$ .

**Demo:** O risco posterior de uma decisão  $d$  é

$$r_x(d) = E[L(d, \theta)|x] = E[\mathbb{I}(|\theta - d| > \varepsilon)] = E[1 - \mathbb{I}(d - \varepsilon \leq \theta \leq d + \varepsilon)|x] = 1 - P(d - \varepsilon \leq \theta \leq d + \varepsilon|x).$$


O risco  $r_x(d)$  é mínimo quando a probabilidade  $P(d - \varepsilon \leq \theta \leq d + \varepsilon|x)$  é máxima. Assim, basta tomar o intervalo  $[d_x^* - \varepsilon; d_x^* + \varepsilon]$  com maior probabilidade a posteriori e o estimador de Bayes nesse caso será o valor central desse intervalo,  $d_x^*$ .

**Exemplo 3.** Considere o exemplo anterior onde  $\theta|x \sim \text{Gama}(a + \sum x_i, b + n)$  e a função de perda do resultado anterior,  $L(d, \theta) = \mathbb{I}(|\theta - d| > \varepsilon)$ . Temos que

$$f(\theta|x) \propto \theta^{\overbrace{a+\sum x_i-1}^{A_x}} e^{-\overbrace{(b+n)\theta}^{B_x}} = \theta^{A_x} e^{-B_x \theta}$$

```
theta = seq(0,1.2,0.01)
#Parâmetros da dist a posteriori gama
a1 = 3
b1 = 10
posterior = dgamma(theta, a1, b1 )
# Escolhendo valores de epsilon e calculando a perda mínima associada
e=c(0.5,0.4,0.3,0.25,0.2,0.15,0.1,0.05,0)
loss <- NULL
for(i in 1:length(e)){
  loss[i] <- theta[which.min(as.vector(apply(matrix(theta), 1,
                                              function(d) sum(posterior*(abs(theta-d)>e[i])))))

# Criando o gráfico
n <- length(e)
tibble(x=rep(loss,each=length(theta)),
       e=rep(round(e,2),each=length(theta)),
       theta=rep(theta,n), post = rep(posterior,n)) %>%
  ggplot() +
  geom_segment(aes(x=x, xend=x, y=0,yend=dgamma(x, a1, b1 ),colour=as.factor(e))) +
  geom_point(aes(x=x, y=0,colour=as.factor(e))) +
  geom_segment(aes(x=x-e, xend=x+e, y=0,yend=0,colour=as.factor(e))) +
  geom_line(aes(x=theta,y=post,colour="Dist. a posteriori")) +
  geom_segment(aes(x=(a1-1)/b1,xend=(a1-1)/b1,y=0,yend=dgamma((a1-1)/b1,a1,b1),colour="Moda a p
  xlab(expression(theta)) + ylab(expression(paste("f(",theta,"|x)"))) +
  theme_bw() + labs(colour = "epsilon") + theme(legend.position="none")+
  facet_wrap(~factor(e,levels=as.character(sort(unique(e),decreasing=TRUE))))
```



Como comentado no resultado anterior, quando  $\varepsilon \downarrow 0$ , temos que  $\delta^*(x) = \text{Moda}(\theta|x) = \sup_{\theta} f(\theta|x)$ .

$$\frac{\partial f(\theta|x)}{\partial \theta} = (A_x - B_x \theta) \theta^{A_x-1} e^{-B_x \theta} = 0 \Leftrightarrow \theta = \frac{A_x}{B_x}$$

$$\delta^*(X) = \text{Moda}(\theta|X) = \frac{a + \sum X_i - 1}{b + n} = \frac{b}{b + n} \left( \frac{a - 1}{b} \right) + \frac{n}{b + n} \bar{X}.$$

**Resultado.** Seja  $L(d, \theta) = c_1(d - \theta) \mathbb{I}(d \geq \theta) + c_2(\theta - d) \mathbb{I}(d < \theta)$  com  $c_1 > 0$ ,  $c_2 > 0$ . Então,  $\delta^*(x)$  é tal que  $P(\theta \leq \delta^*(x)|x) = \frac{c_1}{c_1 + c_2}$ . Em particular, se  $c_1 = c_2 = c$ , temos a *perda absoluta*  $L(d, \theta) = c |d - \theta|$  e  $\delta^*(X) = \text{Med}(\theta|X)$ .

**Demo:** exercício.

## 4.2 Estimação por Regiões

Em um problema de estimação por regiões (ou estimação intervalar, no caso univariado), o objetivo é obter um conjunto de valores razoáveis para  $\theta$ . Mais formalmente, temos um problema aonde a decisão consiste em escolher um subconjunto do espaço paramétrico, de modo que  $\mathcal{D} = \mathcal{A}$ , onde  $\mathcal{A}$  é  $\sigma$ -álgebra de subconjuntos de  $\Theta$ . Uma estimativa por região é comumente chamada na literatura Bayesiana de **região de credibilidade** (**intervalo de credibilidade**, no caso univariado) ou **região de probabilidade**  $\gamma = 1 - \alpha$ .

**Exemplo 1.** Suponha que a distribuição a posteriori é  $f(\theta|x) = 4\theta \mathbb{I}_{[0,1/2]}(\theta) + 4(1 - \theta) \mathbb{I}_{[1/2,1]}(\theta)$ . Uma possível estimativa intervalar é um intervalo central ou um intervalo simétrico em torno da média (ou da moda) com uma probabilidade  $\gamma = 1 - \alpha$ . Nesse caso, vamos considerar um intervalo central no sentido que deixa de fora conjuntos caudais de probabilidade  $\alpha/2$ . Note que é possível obter o intervalo de forma analítica nesse exemplo. A seguir, são apresentadas as funções de distribuição  $F$  e quantílica  $Q$  a posteriori e o intervalo de credibilidade  $\alpha$ .

$$F(\theta|x) = \int_0^\theta f(t|x)dt = \int_0^\theta [4t \mathbb{I}_{[0,1/2]}(t) + (4 - 4t) \mathbb{I}_{[1/2,1]}(t)] dt = \begin{cases} 2\theta^2 & , \theta \leq 1/2 \\ -2\theta^2 + 4\theta - 1 & , \theta > 1/2 \end{cases}$$


$$Q(p) = \begin{cases} \sqrt{\frac{p}{2}} & , p \leq 1/2 \\ 1 - \sqrt{\frac{1-p}{2}} & , p > 1/2 \end{cases}$$

$$I.C.(1 - \alpha) = \left[ \sqrt{\frac{\alpha/2}{2}}; 1 - \sqrt{\frac{\alpha/2}{2}} \right].$$

```
alpha=0.1
theta = seq(0,1,0.01)
# Densidade a posteriori
dpost = Vectorize(function(t){ 4*t*I(t>=0)*I(t<=0.5)+
  4*(1-t)*I(t>0.5)*I(t<=1) })
# F. Distribuição a posteriori
ppost = Vectorize(function(t){ 2*(t^2)*I(t>=0)*I(t<=0.5)+
  4*(1-t)*I(t>0.5)*I(t<=1)+I(t>1) })
# F. Quantílica a posteriori
qpost = Vectorize(function(t){ ifelse(t<=0.5, sqrt(t/2)*I(t>0),
  (1-sqrt((1-t)/2))*I(t<1)+I(t>=1)) })
post = dpost(theta)
l = c(qpost((alpha/2)),qpost((1-alpha/2)))
X = tibble(theta=theta,Posterior=post)
ggplot(data=X,mapping = aes(x=theta,y=Posterior)) +
  geom_line(lwd=1.5) +
```



```
geom_area(data=subset(X, theta >= l[1] & theta <= l[2]), fill = "blue", alpha=0.5)+
theme_bw()
```




**Exemplo 2.** Por fim, suponha que a distribuição a posteriori é  $f(\theta|x) = (2 - 4\theta) \mathbb{I}_{[0,1/2)}(\theta) + (4\theta - 2) \mathbb{I}_{[1/2,1]}(\theta)$ . Vamos construir um intervalo como no Exemplo anterior.

$$F(\theta|x) = \begin{cases} 2\theta(1-\theta) & , \quad \theta \leq 1/2 \\ 2\theta(\theta-1) + 1 & , \quad \theta > 1/2 \end{cases}$$

$$Q(p) = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{1-2p}}{2} & , \quad p \leq 1/2 \\ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2p-1}}{2} & , \quad p > 1/2 \end{cases}$$

$$I.C.(1-\alpha) = \left[ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{1-\alpha}}{2}; \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{1-\alpha}}{2} \right].$$

```
alpha=0.1
theta = seq(0,1,0.01)
# Densidade a posteriori
dpost = Vectorize(function(t){ (2-4*t)*I(t>=0)*I(t<=0.5)+
  (4*t-2)*I(t>0.5)*I(t<=1) })
# F. Distribuição a posteriori
ppost = Vectorize(function(t){ 2*t*(1-t)*I(t>=0)*I(t<=0.5)+
  (2*(t^2)-2*t+1)*I(t>0.5)*I(t<=1)+I(t>1) })
# F. Quantílica a posteriori
qpost = Vectorize(function(t){ ifelse(t<=0.5, (0.5-sqrt(1-2*t))/2)*I(t>0),
  (0.5+sqrt(2*t-1)/2)*I(t<1)+I(t>=1) })
post = dpost(theta)
l = c(qpost((alpha/2)),qpost((1-alpha/2)))
X = tibble(theta=theta,Posterior=post)
ggplot(data=X,mapping = aes(x=theta,y=Posterior)) +
  geom_line(lwd=1.5) +
  geom_area(data=subset(X, theta >= l[1] & theta <= l[2]), fill = "blue", alpha=0.5)+
  theme_bw()
```



Note que, nesse exemplo, as regiões que tem mais densidade a posteriori foram excluídas do intervalo. Isso não faz muito sentido pois essas regiões têm maior chance de conter o  $\theta$  que qualquer outra região de mesmo tamanho.

Uma *função de perda* razoável para um problema de estimação por região deve levar em consideração dois fatores:

- O tamanho da região  $d \in \mathcal{A}$  (deseja-se uma região que seja menor que o espaço paramétrico);
- Pertinência de  $\theta$  na região  $d$ .

Assim, considere uma função de perda da forma

$$L(d, \theta) = \lambda(d) - k \mathbb{I}_d(\theta),$$

onde  $\lambda(d)$  é o “tamanho” da região  $d$ . Por exemplo, a medida de Lebesgue, no caso contínuo, ou a medida de contagem, no caso discreto (no caso geral, considere uma medida que domina a distribuição a posteriori,  $P(\theta|x) \ll \lambda$ ). No caso absolutamente contínuo, o risco a posteriori de uma decisão  $d \in \mathcal{A}$  é

$$r_x(d) = \int_{\Theta} [\lambda(d) - k \mathbb{I}_d(\theta)] dP(\theta|x) = \int_{\Theta} \mathbb{I}_d(\theta) d\theta - \int_{\Theta} k \mathbb{I}_d(\theta) f(\theta|x) d\theta = \int_d (1 - kf(\theta|x)) d\theta.$$

Esse risco é mínimo quando  $d = \{\theta \in \Theta : 1 - kf(\theta|x) \leq 0\} \Leftrightarrow d = \{\theta \in \Theta : f(\theta|x) \geq 1/k\}$ .

Assim, a decisão de Bayes contra essa função de perda consiste em escolher uma região  $d \in \mathcal{A}$  que contém os pontos do espaço paramétrico com maior densidade a posteriori.


**Definição:** A região  $R \subseteq \Theta$  é dita ser uma região HPD (Highest Posterior Density) de probabilidade  $\gamma$  se

- $P(\theta \in R|x) = \gamma$ ;
- $\forall \theta \in R$  e  $\forall \theta' \notin R$ ,  $f(\theta|x) \geq f(\theta'|x)$ .

**Voltando ao Exemplo 2.** As regiões centrais nesse exemplo tem menor densidade a posteriori. Assim, uma região HPD de probabilidade  $\gamma = 1 - \alpha$  é dada por

$$I.C.(1 - \alpha) = \left[0; \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{\alpha}}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{\alpha}}{2}; 1\right]$$

```
alpha=0.1
theta = seq(0,1,0.01)
# Densidade a posteriori
dpost = Vectorize(function(t){ (2-4*t)*I(t>=0)*I(t<=0.5)+
  (4*t-2)*I(t>0.5)*I(t<=1) })
# F. Distribuição a posteriori
ppost = Vectorize(function(t){ 2*t*(1-t)*I(t>=0)*I(t<=0.5)+
  (2*(t^2)-2*t+1)*I(t>0.5)*I(t<=1)+I(t>1) })
# F. Quantílica a posteriori
qpost = Vectorize(function(t){ ifelse(t<=0.5, (0.5-sqrt(1-2*t))/2)*I(t>0),
  (0.5+sqrt(2*t-1)/2)*I(t<1)+I(t>=1)) })
post = dpost(theta)
l = c(qpost((1-alpha)/2),qpost((alpha+1)/2))
X = tibble(theta=theta,Posterior=post)
ggplot(data=X,mapping = aes(x=theta,y=Posterior)) +
  geom_line(lwd=1.5) +
  geom_hline(yintercept=dpost(l[1]), lty=2, col="darkgray") +
  geom_area(data=subset(X, theta <= l[1]),fill = "blue", alpha=0.5) +
  geom_area(data=subset(X, theta >= l[2]),fill = "blue", alpha=0.5)+
  theme_bw()
```



Note que na solução anterior, o comprimento do intervalo era  $\sqrt{1 - \alpha}$ , enquanto que o comprimento do HPD é  $1 - \sqrt{\alpha}$ . Tomando, por exemplo,  $\alpha = 0.1$  temos que  $\sqrt{1 - \alpha} \approx 0.95$  enquanto  $1 - \sqrt{\alpha} \approx 0.68$ . Por conter apenas os pontos com maior densidade, o HPD sempre terá comprimento menor ou igual a qualquer intervalo com mesma probabilidade.

**Exemplo 3.** Considere  $X_1, \dots, X_n$  c.i.i.d. tais que  $X_i | \theta \sim N(\theta, 1/\tau)$ ,  $\tau = 1/\sigma^2$ , com  $\tau$  conhecido

(fixado). Vimos que se, a priori,  $\theta \sim N(m, 1/v)$  então  $\theta|x \sim N\left(\frac{vm + n\tau\bar{x}}{v + n\tau}, \frac{1}{v + n\tau}\right)$  e, assim,

$$Z = \frac{\theta - M_x}{\sqrt{V_x}} \Bigg| x \sim N(0, 1).$$

O intervalo HPD de probabilidade  $\gamma = 1 - \alpha = 0.95$  é

$$I.C.(1 - \alpha) = \left[ M - z_{\alpha/2}\sqrt{V}; M + z_{\alpha/2}\sqrt{V} \right] = \left[ \frac{vm + n\tau\bar{x}}{v + n\tau} \pm 1.96\sqrt{\frac{1}{v + n\tau}} \right].$$


Uma possível forma de representar falta de informação a priori é tomar o limite  $v \downarrow 0$  ( $1/v \uparrow \infty$ ). Dessa forma, tem-se

$$\theta|x \sim N(\bar{x}, 1/(n\tau)) \sim N(\bar{x}, \sigma^2/n),$$

e o intervalo HPD coincide com o I.C. frequentista

$$I.C.(1 - \alpha) = \left[ \bar{x} \pm 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$

```
mx=2; vx=sqrt(3)
alpha=0.05
theta = seq(qnorm(0.001,mx,vx),qnorm(0.999,mx,vx),length.out=100)
post = dnorm(theta,mx,vx)
l = c(qnorm(alpha/2,mx,vx),qnorm(1-alpha/2,mx,vx))
X = tibble(theta=theta,Posterior=post)
ggplot(data=X,mapping = aes(x=theta,y=Posterior)) +
  geom_line(lwd=1.5) +
  geom_hline(yintercept=dnorm(l[1],mx,vx), lty=2, col="darkgray") +
  geom_area(data=subset(X, theta >= l[1] & theta <= l[2]),fill = "blue", alpha=0.5)+
  theme_bw()
```



**Exemplo 4:** Considere  $X_1, \dots, X_n$  c.i.i.d. tais que  $X_i|\theta \sim Unif(0, \theta)$ . Vimos que se  $\theta \sim Pareto(a, b)$ , então  $\theta|x \sim Pareto(a + n, \max\{x_{(n)}, b\})$

$$f(\theta|x) = \frac{(a+n)[\max\{x_{(n)}, b\}]^{a+n}}{\theta^{a+n+1}} \mathbb{I}_{[\max\{x_{(n)}, b\}, \infty)}$$

Note que a função de densidade a posteriori é estritamente decrescente de modo que o extremo inferior da região HPD é  $\max\{x_{(n)}, b\}$ . A função de distribuição a posteriori é


$$F(\theta|x) = 1 - \left( \frac{\max\{x_{(n)}, b\}}{\theta} \right)^{a+n},$$

de modo que o extremo superior do intervalo pode ser obtido fazendo

$$1 - \left( \frac{\max\{x_{(n)}, b\}}{\theta} \right)^{a+n} = \gamma \Leftrightarrow \frac{\max\{x_{(n)}, b\}}{\theta^*} = (1 - \gamma)^{1/(a+n)} \Leftrightarrow \theta^* = \frac{\max\{x_{(n)}, b\}}{(1 - \gamma)^{1/(a+n)}}.$$

$$I.C.(1 - \alpha) = \left[ \max\{x_{(n)}, b\}, \frac{\max\{x_{(n)}, b\}}{\alpha^{1/(a+n)}} \right]$$

```
ax=2; bx=1
maxt=bx/((alpha/3)^(1/ax))
alpha=0.1
limsup=bx/(alpha^(1/ax))
theta = seq(bx,maxt,0.1)
dpareto=Vectorize(function(t){
  ax*(bx^ax)*I(t>=bx) / (t^(ax+1)) })
post = dpareto(theta)
X = tibble(theta=theta,Posterior=post)
ggplot(data=X,mapping = aes(x=theta,y=Posterior)) +
  geom_line(lwd=1.5) +
  xlim(c(0,maxt))+
  geom_hline(yintercept=dpareto(limsup), lty=2, col="darkgray") +
  geom_area(data=subset(X, theta <= limsup),fill = "blue", alpha=0.5)+
  theme_bw()
```



### 4.3 Custo das Observações

Suponha agora que o custo para observar uma amostra de tamanho  $n$  é dado por uma função custo  $c(n)$  e, antes de observar  $X_1, \dots, X_n$ , você precisa decidir qual o tamanho amostral ótimo,  $n^*$ . Desta forma, considere a função de perda  $L(d, \theta, n) = L(d, \theta) + c(n)$  com risco

$$\rho_n(\delta, P) = E[L(d, \theta, n)] = E[L(d, \theta) + c(n)] = \rho_n(\delta, P) + c(n).$$

Note que (supostamente, por simplicidade) o custo  $c(n)$  não depende de  $\theta$ . Se  $\delta^*$  é função de decisão de Bayes contra  $L(d, \theta)$  e a priori  $P$ , o tamanho amostral ótimo  $n^*$  é o valor que minimiza

$$\rho_n(P) = \rho(\delta, P) + c(n) = \rho^*(P) + c(n).$$

**Exemplo.** Considere o exemplo visto anteriormente em que  $\mathcal{D} = \{d_1, d_2\}$ ,  $\Theta = \{\theta_1, \theta_2\} = \{3/4, 1/3\}$ ,  $P(\theta_1) = 1/2$  e a função de perda é  $L(d, \theta) = 10 \mathbb{I}(d_1, \theta_2) + 5 \mathbb{I}(d_2, \theta_1)$ . Se  $X|\theta \sim \text{Ber}(\theta)$ , a função de decisão de Bayes é  $\delta^*(x) = d_1 \mathbb{I}(x = 1) + d_2 \mathbb{I}(x = 0)$ .

Suponha agora que é possível observar  $X_1, \dots, X_n$  v.a. c.i.i.d. tais que  $X_i|\theta \sim \text{Ber}(\theta)$ . Note que  $T(X) = \sum X_i$  é suficiente para  $\theta$  com  $T(X)|\theta \sim \text{Bin}(n, \theta)$  e

$$\begin{aligned} f(\theta_1|T(X) = t) &= \frac{f(t|\theta_1)P(\theta_1)}{\sum_{i \in \{1,2\}} f(t|\theta_i)P(\theta_i)} = \frac{f(t|\theta_1)}{\sum_{i \in \{1,2\}} f(t|\theta_i)} = \frac{\binom{n}{t} \left(\frac{3}{4}\right)^t \left(\frac{1}{4}\right)^{n-t}}{\binom{n}{t} \left(\frac{3}{4}\right)^t \left(\frac{1}{4}\right)^{n-t} + \binom{n}{t} \left(\frac{1}{3}\right)^t \left(\frac{2}{3}\right)^{n-t}} \\ &= \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{6}\right)^t \left(\frac{8}{3}\right)^n} = p_x. \end{aligned}$$

O risco posterior das decisões  $d_1$  e  $d_2$  são, respectivamente,  $r_x(d_1) = 10(1 - p_x)$  e  $r_x(d_2) = 5p_x$ , de modo que decide-se por  $d_1$  se

$$\begin{aligned} r_x(d_1) \leq r_x(d_2) &\iff 10(1 - p_x) \leq 5p_x \iff p_x \geq \frac{10}{15} = \frac{2}{3} \iff \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{6}\right)^t \left(\frac{8}{3}\right)^n} \geq \frac{2}{3} \iff \left(\frac{1}{6}\right)^t \left(\frac{8}{3}\right)^n \leq \frac{1}{2} \\ &\iff \left(\frac{1}{6}\right)^t \left(\frac{8}{3}\right)^n \leq \frac{1}{2} \iff -t \log(6) \leq n \log\left(\frac{3}{8}\right) - \log(2) \iff t \geq -n \log_6\left(\frac{3}{8}\right) + \log_6(2) = k_n, \end{aligned}$$

e a função de decisão de Bayes é

$$\delta^*(X) = \begin{cases} d_1 & , \sum X_i \geq k_n \approx 0.55n + 0.39 \\ d_2 & , \text{ caso contrário} \end{cases}$$

O risco de Bayes neste caso é


$$\begin{aligned} \rho^*(P) &= E[L(\delta^*(x), \theta)] = 10 P(\delta^*(x) = d_1, \theta = \theta_2) + 5 P(\delta^*(x) = d_2, \theta = \theta_1) = 10 \frac{1}{2} P\left(\sum X_i \geq k_n \mid \theta = \frac{1}{3}\right) + \\ &5 \frac{1}{2} P\left(\sum X_i < k_n \mid \theta = \frac{3}{4}\right) = 5 P\left(\text{Bin}\left(n, \frac{1}{3}\right) \geq k_n\right) + 2.5 P\left(\text{Bin}\left(n, \frac{3}{4}\right) < k_n\right). \end{aligned}$$

Suponha agora que há um custo  $c(n)$  por essas  $n$  observações e que a função de perda é dada por  $L(d, \theta, n) = L(d, \theta) + c(n)$ . Essa função custo  $c : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  pode depender de questões além das financeiras, como, por exemplo, o tempo de coleta da amostra ou algum risco aos envolvidos no experimento. Considere, por simplicidade, uma função de custo linear  $c(n) = 0.02n$ , de modo que o risco é

$$\rho_n(P) = \rho^*(P) + c(n) = 5 P\left(\text{Bin}\left(n, \frac{1}{3}\right) \geq k_n\right) + 2.5 P\left(\text{Bin}\left(n, \frac{3}{4}\right) < k_n\right) + 0.02n.$$

A seguir é apresentado um gráfico desse risco para alguns valores de  $n$  e é possível notar que o tamanho amostral ótimo é  $n^* = 20$ .

```
tibble(n=seq(0,80),
      kn=-n*log(3/8,6)+log(2,6),
      risco=5*(1-pbinom(kn,n,1/3))+2.5*pbinom(kn,n,3/4)+0.02*n) %>%
  ggplot() +
  geom_point(aes(x=n,y=risco)) +
  geom_point(aes(x=n[which.min(risco)],y=min(risco)),col="red",cex=2.5)
```



No exemplo anterior, foi apresentado uma maneira de considerar custos das observações e obter um tamanho amostral ótimo para determinado problema de decisão. Quando o custo está relacionado somente a quantidades monetárias, funções de custo lineares não são as mais adequadas. Para uma discussão bastante didática sobre esse problema, veja o artigo *O Paradoxo de São Petersburgo* (Peixoto, C. M. e Wechsler, S.) no Boletim da ISBrA, 6(2).





## Capítulo 5

# Testes de Hipóteses

### 5.1 Conceitos Básicos

Uma **hipótese estatística** é uma afirmação sobre o parâmetro  $\theta$  (ou a família  $\mathcal{P}$ ). No caso usual, tem-se duas hipóteses:  $H_0 : \theta \in \Theta_0$ , chamada de **hipótese nula**, e  $H_1 : \theta \in \Theta_1 = \Theta_0^c$ , chamada **hipótese alternativa**.

Um **teste de hipótese** é uma regra de decisão  $\varphi : \mathfrak{X} \rightarrow \{0, 1\}$ , onde  $\varphi(x) = 1$  significa rejeitar  $H_0$  (aceitar  $H_1$ ) e  $\varphi(x) = 0$ , não rejeitar (aceitar)  $H_0$ .

Se rejeita-se  $H_0$  (aceita-se  $H_1$ ) quando  $H_0$  é verdadeira, comete-se um **erro do tipo I**. Por outro lado, se não rejeita-se  $H_0$  (aceita  $H_0$ ) quando  $H_0$  é falso, ocorre um **erro do tipo II**.

O conjunto  $\varphi^{-1}(1) = \{x \in \mathfrak{X} : \varphi(x) = 1\}$  recebe o nome de **região de rejeição** (ou **região crítica**). A **função de poder** do teste  $\varphi$  é  $\pi_\varphi(\theta) = P(\varphi^{-1}(1) | \theta) = P(\text{'Rejeitar } H_0' | \theta)$ .

Dizemos que um teste  $\varphi$  tem **nível de significância**  $\alpha$  se  $\sup_{\theta \in \Theta_0} \pi_\varphi(\theta) \leq \alpha$ . Se  $\alpha = \sup_{\theta \in \Theta_0} \pi_\varphi(\theta)$  dizemos que o teste é de **tamanho**  $\alpha$ .

Uma hipótese é dita **simples** se contém apenas um ponto,  $H : \theta = \theta_0$ . Caso contrário é chamada de **hipótese composta**. No caso em que  $H : \theta \in \Theta_0$  é tal que  $\dim(\Theta_0) < \dim(\Theta)$ , diz-se que  $H$  é uma **hipótese precisa** (“*sharp*”).


### 5.2 Revisão: Abordagem Frequentista

Um teste de hipótese “ideal” seria aquele que as probabilidades de erros tipo I e tipo II são iguais a zero, isto é,  $\pi_\varphi(\theta) = 0, \forall \theta \in \Theta_0$ , e  $\pi_\varphi(\theta) = 1, \forall \theta \in \Theta_1$ . Contudo, não é possível obter tais testes em geral.

A solução usual é fixar um nível de significância  $\alpha$  e considerar apenas a classe de teste de nível  $\alpha$ , isto é, testes tais que  $\sup_{\theta \in \Theta_0} \pi_\varphi(\theta) \leq \alpha$ . Os testes ótimos sob o ponto de vista frequentista são aqueles na classe de testes de nível  $\alpha$  que tenha maior função poder  $\pi_\varphi(\theta)$  para  $\theta \in \Theta_1$ . Um teste que

satisfaz isso é chamado de **Teste Uniformemente Mais Poderoso (UMP)** mas testes com essa propriedade também só podem ser obtidos em casos específicos.

**Exemplo.** Considere que  $\Theta = [0, 1]$  e deseja-se testar  $H_0 : \theta \leq 0.5$  contra  $H_1 : \theta > 0.5$ . O gráfico a seguir ilustra as funções poder dos quatro testes disponíveis para esse problema. Supondo (apenas para fins didáticos) que  $\alpha = 0.5$ , temos que o teste UMP de nível  $\alpha$  é o teste 2. O teste 4, apesar de ser mais poderoso, não é um teste de nível  $\alpha$ .



Uma das situações onde é possível obter o teste mais poderoso é o caso que as hipóteses nula e alternativa são simples, isto é,  $H_0 : \theta = \theta_0$  contra  $H_1 : \theta = \theta_1$ . Nesses casos, pode-se considerar o **Lema de Neyman-Pearson**, que afirma que o **teste mais poderoso** é dado por

$$\varphi^*(x) = \begin{cases} 1, & \frac{f(x|\theta_0)}{f(x|\theta_1)} \leq k \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}.$$

Além disso, o teste  $\varphi^*$  minimiza a combinação linear das probabilidades de erro  $a\alpha + b\beta$  com  $k = b/a$ ,  $\alpha = \pi_{\varphi^*}(\theta_0) = P(\text{'erro tipo I'})$  e  $\beta = 1 - \pi_{\varphi^*}(\theta_1) = P(\text{'erro tipo II'})$ .

Como dito anteriormente, usualmente é fixado um nível  $\alpha$  e isso permite encontrar o valor de  $k$  de modo que o teste construído a partir do lema é o teste mais poderoso de nível  $\alpha$ . Assim,

$$\alpha = \pi_{\varphi^*}(\theta_0) = P(X \in \varphi^{-1}(\{1\})|\theta_0) = P\left(\left\{x : \frac{f(x|\theta_0)}{f(x|\theta_1)} \leq k\right\} \middle| \theta_0\right).$$

Suponha que foi observado  $X = x_o$ , é possível calcular o *nível descritivo* (ou *p-value*) da seguinte forma:

$$p(x_o) = P\left(\left\{x : \frac{f(x|\theta_0)}{f(x|\theta_1)} \leq \frac{f(x_o|\theta_0)}{f(x_o|\theta_1)}\right\} \middle| \theta_0\right)$$

É possível obter testes UMP em alguns casos particulares. Em especial, nos casos em que a família de distribuições para  $X$  condicional a  $\theta$  possui a propriedade de *razão de verossimilhanças monótona*, é possível construir testes UMP para hipóteses do tipo  $H_1 : \theta \leq \theta_0$  contra  $H_1 : \theta > \theta_0$ . Para problemas

onde as hipóteses são da forma  $H_1 : \theta = \theta_0$  contra  $H_1 : \theta \neq \theta_0$ , bastante comuns no dia a dia de um estatístico, não existe teste UMP, em geral.

Nos casos em que não existe um teste UMP, o teste mais utilizado sob a abordagem frequentista certamente é o **teste da razão de verossimilhança generalizada** (RVG). Primeiramente, considere a *razão de verossimilhanças generalizada*, dada por

$$\lambda(x) = \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} f(x|\theta)}{\sup_{\theta \in \Theta} f(x|\theta)}.$$

Note que  $0 \leq \lambda(x) \leq 1$ ,  $\forall x \in \mathfrak{X}$  e  $\forall \Theta_0 \subseteq \Theta$ . Um *teste RVG* é qualquer teste da forma

$$\varphi_{RV}(x) = \begin{cases} 1, & \lambda(x) \leq k \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}.$$

Novamente,  $k$  pode ser escolhido de modo que o teste resultante seja de nível  $\alpha$ , isto é,  $\sup_{\theta \in \Theta_0} P(\lambda(x) \leq k | \theta) \leq \alpha$ . Do mesmo modo, se foi observado  $X = x_o$ , um *p-value* é  $p(x_o) = \sup_{\theta \in \Theta_0} P(\{x : \lambda(x) \leq \lambda(x_o)\} | \theta)$ . Por fim, em casos onde é difícil fazer os cálculos de forma exata e o tamanho amostral  $n$  é razoavelmente grande, é possível usar a distribuição assintótica da RVG  $-2 \log \lambda(x) \xrightarrow{\mathcal{D}} \chi_d^2$ , onde  $d = \dim(\Theta) - \dim(\Theta_0)$ .

### 5.3 Abordagem Bayesiana (via Teoria da Decisão)

Sob a abordagem de teoria da decisão, podemos ver um teste de hipóteses como um problema de decisão onde temos duas possíveis decisões  $\mathcal{D} = \{d_0, d_1\}$ , onde  $d_0$  é decidir por  $H_0 : \theta \in \Theta_0$  e  $d_1$  é decidir por  $H_1 : \theta \in \Theta_1$ , com  $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$ . Um teste de hipóteses nesse contexto é uma função de decisão  $\varphi : \mathfrak{X} \rightarrow \{0, 1\}$ , de modo que quando  $\varphi(x) = i$ , decide-se por  $d_i$ ,  $i \in \{0, 1\}$ .

Primeiramente, considere o contexto apresentado no Lema de Neyman-Pearson, onde  $\Theta = \{\theta_0, \theta_1\}$  e deseja-se testar  $H_0 : \theta = \theta_0$  contra  $H_1 : \theta = \theta_1$ . Considere que, a priori,  $f(\theta_0) = \pi$ , a função de verossimilhança é  $f(x|\theta)$  e a função de perda apresentada na tabela a seguir.

$$L(d, \theta)$$

$$\theta_0$$

$$\theta_1$$

$$d_0$$

$$0$$

$$b$$

$$d_1$$

$$a$$

$$0$$

Então, o risco de uma função de decisão  $\varphi$  é

$$\rho(\varphi, P) = E[L(\varphi(X), \theta)] = \pi E[L(\varphi(X), \theta) | \theta_0] + (1 - \pi) E[L(\varphi(X), \theta) | \theta_1] = a \pi P(\varphi(x) = 1 | \theta_0) + b (1 - \pi) P(\varphi(x) = 0 | \theta_0) = a \pi \alpha_\varphi + b (1 - \pi) \beta_\varphi$$

Como o risco acima é uma combinação linear das probabilidades dos erro tipo I e tipo II, podemos aplicar o Lema de Neyman-Pearson e obter a função de decisão  $\varphi^*$  que minimiza o risco

$$\varphi^*(x) = \begin{cases} 1, & \frac{f(x|\theta_0)}{f(x|\theta_1)} \leq \frac{b(1-\pi)}{a\pi} \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}.$$

Esse resultado é apresentado por DeGroot (1986) e é uma espécie de *Lema de Neyman-Pearson Generalizado*.

A solução para esse mesmo problema pode também ser obtida usando a *forma extensiva*. O risco posterior para as suas decisões é  $r_x(d_0) = bf(\theta_1|x)$  e  $r_x(d_1) = af(\theta_0|x)$ , de modo que rejeitamos  $H_0$  (decidimos por  $d_1$  ou  $\varphi(x) = 1$ ) se

$$r_x(d_1) \leq r_x(d_0) \iff af(\theta_0|x) \leq bf(\theta_1|x) \iff af(\theta_0|x) \leq b[1 - f(\theta_0|x)] \iff f(\theta_0|x) \leq \frac{b}{a+b}$$

De modo que o teste de Bayes também pode ser apresentado como

$$\varphi^*(x) = \begin{cases} 1, & f(\theta_0|x) \leq \frac{b}{a+b} \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}.$$

A interpretação nesse caso é mais direta, a hipótese é rejeitada se sua probabilidade posterior é “pequena”. Como vimos, essas soluções são equivalentes. De fato,

- $f(\theta_0|x) = \frac{f(\theta_0)f(x|\theta_0)}{f(x)} = \pi \frac{f(x|\theta_0)}{f(x)};$
- $f(\theta_1|x) = \frac{f(\theta_1)f(x|\theta_1)}{f(x)} = (1-\pi) \frac{f(x|\theta_1)}{f(x)}.$

Assim,

$$r_x(d_1) \leq r_x(d_0) \iff a\pi \frac{f(x|\theta_0)}{f(x)} \leq b(1-\pi) \frac{f(x|\theta_1)}{f(x)} \iff \frac{f(x|\theta_0)}{f(x|\theta_1)} \leq \frac{b(1-\pi)}{a\pi}.$$

Considere agora um caso mais geral, onde  $\Theta = \Theta_0 \dot{\cup} \Theta_1$  e deseja-se testar  $H_0 : \theta \in \Theta_0$  contra  $H_1 : \theta \in \Theta_1$ . Considere também a função de perda mais geral apresentada a seguir, com  $a_0 \leq a_1$  e  $b_0 \leq b_1$ .

$L(d, \theta)$

$\Theta_0$

$\Theta_1$

$d_0$

$a_0$

$b_1$

$d_1$

$a_1$

$b_0$

O risco posterior de cada uma das decisões é

$$r_x(d_0, \theta) = a_0P(\theta \in \Theta_0|x) + b_1P(\Theta_1|x) = a_0P(\theta \in \Theta_0|x) + b_1[1 - P(\Theta_1|x)] = a_0P(\theta \in \Theta_0|x) + b_1 - b_1P(\Theta_0|x),$$

$$r_x(d_1, \theta) = a_1P(\theta \in \Theta_0|x) + b_0 - b_0P(\Theta_0|x),$$

De modo que rejeita-se  $H_0$ ,  $\varphi(x) = 1$ , se

$$r_x(d_1, P) \leq r_x(d_0, P) \Leftrightarrow (a_1 - b_0)P(\Theta_0|x) + b_0 \leq (a_0 - b_1)P(\Theta_0|x) + b_1 \Leftrightarrow P(\Theta_0|x) \leq \frac{(b_1 - b_0)}{(a_1 - a_0) + (b_1 - b_0)}$$

Assim, o teste de bayes nesse caso é

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & P(\Theta_0|x) \leq \frac{(b_1 - b_0)}{(a_1 - a_0) + (b_1 - b_0)} \\ 0, & c.c. \end{cases}.$$

## 5.4 Probabilidade Posterior de $H_0$

**Resultado.** Seja  $\Theta = \Theta_0 \dot{\cup} \Theta_1$  e suponha que deseja-se testar  $H_0 : \theta \in \Theta_0$  contra  $H_1 : \theta \in \Theta_1$  considerando a função de perda a seguir, com  $a_0 \leq a_1$  e  $b_0 \leq b_1$ .

$L(d, \theta)$

$\Theta_0$

$\Theta_1$

$d_0$

$a_0$

$b_1$

$d_1$

$a_1$

$b_0$

Então, o teste de bayes é

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & P(\Theta_0|x) \leq \frac{(b_1 - b_0)}{(a_1 - a_0) + (b_1 - b_0)} \\ 0, & c.c. \end{cases}.$$

**Exemplo 1.** Considere  $X_1, \dots, X_n$  c.i.i.d. tais que  $X_i|\theta \sim Ber(\theta)$  com  $\Theta = \{1/2, 3/4\}$ . Suponha que, a priori,  $f(\theta = 1/2) = f(\theta = 3/4) = 1/2$  e deseja-se testar  $H_0 : \theta = 1/2$  contra  $H_1 : \theta = 3/4$ . Tem-se que  $T(X) = \sum X_i \mid \theta \sim Bin(n, \theta)$  é uma estatística suficiente para  $\theta$ . Então,

$$P(\theta = 1/2|T(X) = t) = \frac{f(t|\theta = 1/2)f(\theta = 1/2)}{\sum_{\theta \in \{1/2, 3/4\}} f(t|\theta)f(\theta)} = \frac{\binom{n}{t} \left(\frac{1}{2}\right)^n}{\binom{n}{t} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \binom{n}{t} \left(\frac{3}{4}\right)^t \left(\frac{1}{4}\right)^{n-t}} = \frac{1}{1 + \frac{3^t}{2^n}}.$$

Considere a função de perda  $L(d, \theta) = a_0 \mathbb{I}(d_0, \Theta_0) + b_1 \mathbb{I}(d_0, \Theta_1) + a_1 \mathbb{I}(d_1, \Theta_0) + b_0 \mathbb{I}(d_1, \Theta_1)$  como no resultado anterior. Então, rejeita-se  $H_0$  se  $P(\theta \in \Theta_0|x) < K$ , com  $K = \frac{b_1 - b_0}{(a_1 - a_0) + (b_1 - b_0)}$ . Assim,

$$P(\theta = 1/2|T = t) \leq K \Leftrightarrow \frac{1}{1 + \frac{3^t}{2^n}} \leq K \Leftrightarrow 1 + \frac{3^t}{2^n} \geq \frac{1}{K} \Leftrightarrow 3^t \geq 2^n \left(\frac{1}{K} - 1\right) \Leftrightarrow t \geq n \log_3(2) + \log_3\left(\frac{1-K}{K}\right) \Leftrightarrow t \geq n \log_3(2) + \log_3\left(\frac{a_1 - a_0}{b_1 - b_0}\right).$$

Tomando  $a_1 = b_1 = 1$  e  $a_0 = b_0 = 0$ , rejeita  $H$  se

$$\sum X_i \geq n \log_3(2) + \log_3(1) \iff \sum X_i \geq n \log_3(2) \implies \bar{X} \geq \log_3(2) \approx 0,631.$$

O teste de Bayes é

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & f(\theta = 1/2|x) \leq \frac{(b_1 - b_0)}{(a_1 - a_0) + (b_1 - b_0)} = \frac{1}{2} \\ 0, & c.c. \end{cases} \implies \varphi(x) = \begin{cases} 1, & \bar{X} \geq \log_3(2) \\ 0, & c.c. \end{cases}.$$

**Exemplo 2:**  $X_1, \dots, X_n$  c.i.i.d. tais que  $X_i|\theta \sim N(\theta, \sigma_0^2)$  com  $\sigma_0^2$  conhecido. Suponha que, a priori,  $\theta \sim N(m, v^2)$  e  $\bar{X}$  é estatística suficiente para  $\theta$  com  $\bar{X}|\theta \sim (\theta, \sigma_0^2/n)$ , de modo que  $\theta|X \sim N\left(\frac{\sigma_0^2 m + nv^2 \bar{x}}{\sigma_0^2 + nv^2}, \frac{\sigma_0^2 v^2}{\sigma_0^2 + nv^2}\right)$ . Suponha ainda que o objetivo é testar  $H_0 : \theta \leq \theta_0$  contra  $H_1 : \theta > \theta_0$ .

Utilizando novamente o resultado anterior, temos

$$P(\theta \in \Theta_0|x) = P(\theta \leq \theta_0|x) = P\left(Z \leq \frac{\theta_0 - \frac{\sigma_0^2 m + nv^2 \bar{x}}{\sigma_0^2 + nv^2}}{\sqrt{\frac{\sigma_0^2 v^2}{\sigma_0^2 + nv^2}}} \middle| \bar{x}\right) = \Phi\left(\frac{\theta_0 - \frac{\sigma_0^2 m + nv^2 \bar{x}}{\sigma_0^2 + nv^2}}{\sqrt{\frac{\sigma_0^2 v^2}{\sigma_0^2 + nv^2}}}\right) = \Phi\left(\frac{(\sigma_0^2 + nv^2)\theta_0 - \sigma_0^2 m - nv^2 \bar{x}}{\sigma_0 v \sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}}\right),$$

e deve-se rejeitar  $H_0$  se

$$\begin{aligned} P(\theta \in \Theta_0|x) &\leq \frac{(b_1 - b_0)}{(a_1 - a_0) + (b_1 - b_0)} = K \iff \Phi\left(\frac{(\sigma_0^2 + nv^2)\theta_0 - \sigma_0^2 m - nv^2 \bar{x}}{\sigma_0 v \sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}}\right) \leq K \\ \iff \bar{x} &\geq \frac{(\sigma_0^2 + nv^2)\theta_0 - \sigma_0^2 m}{nv^2} - \Phi^{-1}(K) \frac{\sigma_0 \sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}}{nv} \iff \bar{x} \geq \frac{\sigma_0^2(\theta_0 - m) + nv^2\theta_0}{nv^2} - \\ &\Phi^{-1}(K) \frac{\sigma_0 \sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}}{nv}. \end{aligned}$$

Se  $a_0 = b_0 = 0$  e  $a_1 = b_1 = 1$ , então  $\Phi^{-1}(K = 1/2) = 0$  e rejeita-se  $H_0$  se

$$\bar{x} \geq \frac{\sigma_0^2(\theta_0 - m) + nv^2\theta_0}{nv^2} \xrightarrow{n \uparrow \infty} \theta_0.$$

## 5.5 Fator de Bayes

Voltando ao resultado, tem-se que rejeita-se  $H_0$  se

$$\begin{aligned} r_x(d_0) \geq r_x(d_1) &\iff a_0 P(\Theta_0|x) + b_1 P(\Theta_1|x) \geq a_1 P(\Theta_0|x) + b_0 P(\Theta_1|x) \iff \frac{P(\Theta_0|x)}{P(\Theta_1|x)} \leq \frac{b_1 - b_0}{a_1 - a_0} \\ \iff BF(x) &= \frac{\frac{P(\Theta_0|x)}{P(\Theta_0)}}{\frac{P(\Theta_1|x)}{P(\Theta_1)}} = \frac{P(\Theta_0|x)}{P(\Theta_0)} = \frac{f(x|\Theta_0)}{f(x|\Theta_1)} \leq \frac{(b_1 - b_0) P(\Theta_1)}{(a_1 - a_0) P(\Theta_0)}, \end{aligned}$$

onde  $BF$  é o **Fator de Bayes**, frequentemente utilizado na literatura bayesiana para testar hipóteses. Ele pode ser visto como uma razão de chances que representa o aumento na chance da hipótese nula ser mais plausível que a hipótese alternativa após observar os dados em relação a sua opinião a priori. O  $BF$  também pode ser reescrito como

$$BF(x) = \frac{f_0(x)}{f_1(x)} = \frac{f(x|\Theta_0)}{f(x|\Theta_1)} = \frac{\int_{\Theta} f(x|\theta)f(\theta|\Theta_0)d\theta}{\int_{\Theta} f(x|\theta)f(\theta|\Theta_1)d\theta} = \frac{\int_{\Theta_0} f(x|\theta)dP_0(\theta)}{\int_{\Theta_1} f(x|\theta)dP_1(\theta)} = \frac{E[f(x|\theta)|\theta \in \Theta_0]}{E[f(x|\theta)|\theta \in \Theta_1]}.$$

**No exemplo 1.** Lembrando que, a priori,  $P(\theta = 1/2) = P(\theta = 3/4) = 1/2$  e considerando novamente  $a_0 = b_0 = 0$  e  $a_1 = b_1 = 1$ , temos que devemos rejeitar  $H_0$  se  $BF(x) < \frac{(b_1-b_0)}{(a_1-a_0)} \frac{P(\theta=1/2)}{P(\theta=3/4)} = 1$ . Então,

$$BF(x) = \frac{P(\theta = 1/2|x)}{P(\theta = 3/4|x)} \frac{1/2}{1/2} = \frac{\frac{1}{1+3^{t/2^n}}}{\frac{3^t/2^n}{1+3^{t/2^n}}} = \frac{2^n}{3^t} \leq 1 \iff \bar{x} \geq \log_3(2),$$

de modo que a decisão baseada no fator de Bayes concorda com o resultado baseado na probabilidade a posteriori da hipótese.

**No exemplo 2.**  $\theta|X \sim N\left(\frac{\sigma_0^2 m + nv^2 \bar{x}}{\sigma_0^2 + nv^2}, \frac{\sigma_0^2 v^2}{\sigma_0^2 + nv^2}\right)$  e o objetivo é testar  $H_0 : \theta \leq \theta_0$  contra  $H_1 : \theta > \theta_0$ . A probabilidade a posteriori da hipótese  $H_0$  é


$$P(\theta \in \Theta_0|x) = \Phi\left(\frac{(\sigma_0^2 + nv^2)\theta_0 - \sigma_0^2 m - nv^2 \bar{x}}{\sigma_0 v \sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}}\right),$$

e, a priori,  $P(\theta \in \Theta_0) = P(\theta \leq \theta_0) = \Phi\left(\frac{\theta_0 - m}{v}\right)$ , de modo que o fator de Bayes nesse caso é

$$BF(x) = \frac{P(\Theta_0|x) P(\Theta_1)}{P(\Theta_1|x) P(\Theta_0)} = \frac{\Phi\left(\frac{(\sigma_0^2 + nv^2)\theta_0 - \sigma_0^2 m - nv^2 \bar{x}}{\sigma_0 v \sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}}\right)}{\left[1 - \Phi\left(\frac{(\sigma_0^2 + nv^2)\theta_0 - \sigma_0^2 m - nv^2 \bar{x}}{\sigma_0 v \sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}}\right)\right]} \frac{\left[1 - \Phi\left(\frac{\theta_0 - m}{v}\right)\right]}{\Phi\left(\frac{\theta_0 - m}{v}\right)}.$$

```
m=0; v2=1 # Média e Variância da Priori
sigma02=1 # Variância Populacional (conhecido)
n=3 # tamanho amostral
theta0=1 # H0: theta <= theta0
a0=0; b0=0; a1=1; b1=1 # Função de Perda
K1=(b1-b0)/(a1-a0+b1-b0) # corte Prob. Posterior
K2=((b1-b0)*(1-pnorm((theta0-m)/sqrt(v2)))) / ((a1-a0)*pnorm((theta0-m)/sqrt(v2))) #corte Fator
K3=((sigma02+n*v2)*theta0-sigma02*m)/(n*v2) - qnorm(K1)*sqrt(sigma02*(sigma02+n*v2))/(n*sqrt(v2))
# Probabilidade a Posteriori de H0 (como função de Xbar)
postH = function(xbar){
  pnorm(((sigma02 + n*v2)*theta0 - sigma02*m - n*v2*xbar)/ sqrt(sigma02*v2*(sigma02+n*v2))) }
# Fator de Bayes de H0 (como função de Xbar)
bf = function(xbar){
  (postH(xbar)*(1-pnorm((theta0-m)/sqrt(v2))))/ ((1-postH(xbar))*pnorm((theta0-m)/sqrt(v2))) }
xbar=seq(0.5,2.5,0.001)
PP=postH(xbar)
BF=bf(xbar)
FS=(max(PP)-min(PP))/(max(BF)-min(BF)) # var. aux. para transformação dos eixos
tibble(xbar,PP,BF) %>%
  ggplot() +
  geom_line(aes(x=xbar,y=PP,colour="Prob. Posterior")) +
  geom_line(aes(x=xbar,y=((BF-min(BF))*FS+min(PP)),colour="Fator de Bayes"))+
  scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~./FS-min(PP)/FS+min(BF), name = "BF"))+
  geom_hline(aes(yintercept=K1),lty=2, col="darkgrey") +
  geom_point(aes(x=K3,y=K1,colour="Prob. Posterior")) +
  geom_hline(aes(yintercept=((K2-min(BF))*FS+min(PP))),lty=2, col="darkgrey") +
```

```
geom_point(aes(x=K3,y=((K2-min(BF))*FS+min(PP)),colour="Fator de Bayes")) +
geom_vline(aes(xintercept=K3),lty=2, col="darkgrey") +
theme_bw() + labs(colour = "")
```



Nesse exemplo, é possível ver que tanto o Fator de Bayes quanto a probabilidade posterior da hipótese nula “ordenam” o espaço amostral, representado aqui pela estatística suficiente,  $\bar{X}$ . Deste modo, quanto menores os valores dessas estatísticas de teste, mais desfavorável é o ponto amostral para a hipótese nula. Como visto anteriormente, as regras de decisão baseadas nessas estatísticas são equivalentes e, portanto, a ordenação do espaço amostral é a mesma.

**Problema:** Suponha agora que, nesse mesmo exemplo, deseja-se testar  $H_0 : \theta = 0$  contra  $H_1 : \theta \neq 0$ . Como a posteriori é Normal, temos que  $P(\theta \in \Theta_0|x) = P(\theta = 0|x) = 0$ ,  $\forall x \in \mathfrak{X}$  e, desta forma, a hipótese nula  $H_0$  sempre é rejeitada.

De fato, para qualquer cenário em que a hipótese  $H_0$  tem medida nula a priori,  $P(\theta \in \Theta_0) = 0$ , tem-se que, a posteriori,  $P(\theta \in \Theta_0|x) = 0$ . Isso ocorre frequentemente nos casos em que  $H_0$  é uma *hipótese precisa*, isto é,  $\dim(\Theta_0) < \dim(\Theta)$ . Neste cenário, é necessário definir procedimentos alternativos para testar hipóteses.

## 5.6 Teste de Jeffreys


O teste de Jeffreys (1961?) consiste em atribuir uma probabilidade positiva para o conjunto que define a hipótese nula,  $p_0 = P(\theta \in \Theta_0) > 0$ .

*Exemplo 2.* Suponha que deseja-se testar  $H_0 : \theta = 0$  contra  $H_1 : \theta \neq 0$ . Suponha que sua opinião a priori é  $\theta \sim \text{Normal}(0, 2)$ . Contudo, já foi visto que  $P(\theta = 0|x) = 0$ ,  $\forall x \in \mathfrak{X}$ . Deste modo, você opta por atribuir uma probabilidade positiva  $p_0 = 0.2$  para o ponto  $\theta = 0$ , ou seja, você vai considerar uma



distribuição mista  $f(\theta) = p_0 \mathbb{I}(\theta = 0) + (1 - p_0)f_N(\theta)$ , onde  $f_N$  é a densidade da  $Normal(0, 1)$ . Sua função de distribuição a priori,  $F(\theta) = p_0 \mathbb{I}(\theta \geq 0) + (1 - p_0) \Phi(\theta/\sqrt{2})$ , está representada no gráfico a seguir.

```
theta=c(seq(-5,-0.001,0.001),seq(0.001,5,0.001))
p=0.2
pprior = function(t){
  p*I(t>=0)+(1-p)*pnorm(t,0,2)*I(t!=0)
}
tibble(theta,Prior=pprior(theta)) %>%
  ggplot()+geom_line(aes(x=theta,y=Prior))+
  geom_point(aes(x=0,y=(1-p)*pnorm(0,0,2)))+
  geom_point(aes(x=0,y=(1-p)*pnorm(0,0,2)+p))
```



**Exercício.** Calcule  $P(\theta = 0|X = x)$ .


**Exemplo 3.** Seja  $X_1, \dots, X_n$  c.i.i.d. tais que  $X_i|\theta \sim Ber(\theta)$  e considere que, a priori,  $\theta \sim Beta(a, b)$ . Como  $X = \sum X_i$  é estatística suficiente com  $X|\theta \sim Bin(n, \theta)$ , tem-se que  $\theta|x = \sum x_i \sim Beta(a + \sum x_i, b + n - \sum x_i)$ .

A distribuição marginal de  $X$  é chamada **distribuição preditiva a priori** e pode ser calculada por

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^1 f(x, \theta) d\theta = \int_0^1 f(x|\theta) f(\theta) d\theta = \binom{n}{x} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^1 \theta^{a+x-1} (1-\theta)^{b+n-x-1} d\theta = \\ &= \binom{n}{x} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \frac{\Gamma(a+x)\Gamma(b+n-x)}{\Gamma(a+b+n)} = \binom{n}{x} \frac{\beta(a+x, b+n-x)}{\beta(a, b)} \mathbb{I}_{\{0, \dots, n\}}(x) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow X \sim Beta - Binomial(n, a, b).$$

Suponha agora que deseja-se testar  $H_0 : \theta = \theta_0$  contra  $H_1 : \theta \neq \theta_0$ , com  $\theta_0 = 1/2$ , utilizando o teste de Jeffreys. Desta forma, considere  $p_0 = P(\theta = 1/2) = 1/2$  e sua *priori de Jeffreys* é  $f_J(\theta) = p_0 \mathbb{I}(\theta = \theta_0) + (1 - p_0)f_\beta(\theta) \mathbb{I}(\theta \neq \theta_0)$ , onde  $f_\beta$  é a densidade da  $Beta(a, b)$ .



A distribuição preditiva com relação a priori  $f_J$  é

$$f_J(x) = p_0 \overbrace{f(x|\theta_0)}^{f(x)} \mathbb{I}(\theta = \theta_0) + (1 - p_0) \int_0^1 f(x|\theta) f_\beta(\theta) \mathbb{I}(\theta \neq \theta_0) d\theta = p_0 \binom{n}{x} \theta_0^x (1 - \theta_0)^{n-x} \mathbb{I}(\theta = \theta_0) + (1 - p_0) \binom{n}{x} \frac{\beta(a+x, b+n-x)}{\beta(a, b)} \mathbb{I}(\theta \neq \theta_0),$$

de modo que a distribuição a posteriori é

$$f_J(\theta|x) = \frac{f(x|\theta) f_J(\theta)}{f_J(x)} = \frac{p_0 \binom{n}{x} (1/2)^n}{f_J(x)} \mathbb{I}(\theta = 1/2) + \frac{(1 - p_0) \binom{n}{x} \theta^{a+x-1} (1 - \theta)^{b+n-x-1}}{\beta(a, b) f_J(x)} \mathbb{I}(\theta \neq 1/2).$$

A probabilidade posterior da hipótese  $H_0 : \theta = 1/2$  é

$$p_x = P(\theta = 1/2|x) = \frac{p_0 \binom{n}{x} (1/2)^n}{p_0 \binom{n}{x} (1/2)^n + (1 - p_0) \binom{n}{x} \frac{\beta(a+x, b+n-x)}{\beta(a, b)}} = \frac{1}{1 + \frac{(1 - p_0)}{p_0} \frac{\beta(a+x, b+n-x)}{(1/2)^n \beta(a, b)}}.$$

E, assim, o Fator de Bayes é dado por

$$B_j(x) = \frac{\frac{p_x}{1 - p_x}}{\frac{p_0}{1 - p_0}} = \frac{\frac{1}{p_0} \frac{(1 - p_0) \beta(a+x, b+n-x)}{(1/2)^n \beta(a, b)}}{\frac{1}{p_0}} = \frac{(1/2)^n \beta(a, b)}{\beta(a+x, b+n-x)}.$$

Note que, nesse caso,  $BF(x)$  não depende da probabilidade a priori  $p_0$  da hipótese  $H_0$ .

```
theta0=1/2
n=6; p=1/2
a=1;b=1
x=seq(0,n)
# Fator de Bayes para cada x
BF=(theta0^x)*((1-theta0)^(n-x))*beta(a,b)/beta(a+x,b+n-x)
# Probabilidade a posteriori para cada x
PP=(1 + (((1-p)*beta(a+x,b+n-x))/(p*(theta0^x)*((1-theta0)^(n-x))*beta(a,b))))^(-1)
tab=t(tibble(BF=round(BF,4),PP=round(PP,4)))
```

```
colnames(tab)=x
kable(tab, booktabs=TRUE, escape=FALSE)
```

```
0
1
2
3
4
5
6
BF
0.1094
0.6562
1.6406
2.1875
1.6406
0.6562
0.1094
PP
0.0986
0.3962
0.6213
0.6863
0.6213
0.3962
0.0986
```

Na tabela acima, são calculados  $P(\theta = 1/2|x)$  e  $BF(x)$  para cada  $x$  com  $n = 6$ ,  $p_0 = 1/2$  e os parâmetros da Beta sendo  $a = b = 1$ . Considerando  $a_0 = b_0 = 0$  e  $a_1 = b_1 = 1$ , os valores de corte para a probabilidade a posteriori e o  $BF$  são, respectivamente,  $1/2$  e  $1$ . Desta forma, rejeita-se a hipótese nula para os valores “extremos”  $\{0, 1, 5, 6\}$ .

## 5.7 Hipóteses Precisas

- Probabilidade a posteriori da hipótese  $H_0$ ,  $P(\Theta_0|x)$ .
- Fator de Bayes  $BF(x)$ .
- No caso absolutamente contínuo, quando  $H_0$  é hipótese precisa,  $P(\Theta_0|x) = 0$ . Isso faz com que os testes anteriores sempre levem à rejeição de  $H_0$ .
- Primeira alternativa: *teste de Jeffreys*. Problema: a priori deve dar probabilidade positiva à hipótese nula, conduzindo assim a uma priori “artificial” (mista).


- Serão apresentados dois procedimentos alternativos de teste: *FBST* e *P-value*. O primeiro deles foi pensado especificamente para hipóteses precisas ( $\dim(\Theta_0) < \dim(\Theta)$ ) mas ambos podem ser aplicados para hipóteses gerais.

## 5.8 FBST - *Full Bayesian Significance Test*

Essa solução foi apresentada por Pereira e Stern em 1999. Suponha que o objetivo é testar  $H_0 : \theta \in \Theta_0$  contra  $H_1 : \theta \in \Theta_1 = \Theta_0^c$ . Seja  $T_x = \left\{ \theta \in \Theta : f(\theta|x) \geq \sup_{\theta \in \Theta_0} f(\theta|x) \right\}$  a *região tangente à hipóteses*  $H_0$ , formada pelos pontos densidade posterior maior ou igual que qualquer ponto da hipótese nula. Se esse conjunto é “grande” (muito provável), a hipótese nula está em uma região de pouca densidade posterior e deve ser rejeitada. Assim, a *medida de evidência (de Pereira-Stern)* ou ***e-value*** é definido por  $Ev(\Theta_0, x) = 1 - P(\theta \in T_x|x)$ , e deve-se rejeitar  $H_0$  se o *e-value* for “pequeno”.

**Exemplo.**  $X_1, \dots, X_n$  c.i.i.d.  $N(\theta, \sigma_0^2)$ , com  $\sigma_0^2$  conhecido. Novamente, considere  $\theta \sim N(m, v^2)$ , de modo que  $\theta|x \sim N\left(\frac{\sigma_0^2 m + nv^2 \bar{x}}{\sigma_0^2 + nv^2}, \frac{\sigma_0^2 v^2}{\sigma_0^2 + nv^2}\right)$  e denote a média e a variância da posteriori por  $M_x$  e  $V_x$ , respectivamente. Suponha que o interesse é testar  $H_0 : \theta = \theta_0$  contra  $H_1 : \theta \neq \theta_0$ .

Sem perda de generalidade, suponha que  $M_x \geq \theta_0$ . Então, como a normal é simétrica em torno de  $M_x$ , a região tangente é da forma  $T_x = [\theta_0, 2M_x - \theta_0]$ .



Note que quanto mais próximo  $M_x$  está de  $\theta_0$ , menor a região  $T_x$  e, portanto, maior o valor da evidência em favor de  $H_0$ . O valor da evidência pode ser calculado por

$$Ev(\Theta_0, x) = 1 - P(\theta_0 \leq \theta \leq 2M - \theta_0|x) = 1 - P\left(\frac{\theta_0 - M}{\sqrt{V}} \leq Z \leq \frac{2M - \theta_0 - M}{\sqrt{V}}|x\right) =$$

$$\begin{aligned}
2\Phi\left(-\frac{|\theta_0 - M|}{\sqrt{V}}\right) &= 2\Phi\left(-\frac{\left|\frac{\sigma_0^2 m + nv^2 \bar{x}}{\sigma_0^2 + nv^2} - \theta_0\right|}{\frac{\sigma_0 v}{\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}}}\right) = 2\Phi\left(-\frac{\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}}{\sigma_0 v} \left|\frac{\sigma_0^2(m - \theta_0) + nv^2(\bar{x} - \theta_0)}{\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}}\right|\right) = \\
2\Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}} \left|\frac{\sigma_0}{v}(m - \theta_0) + \frac{\sqrt{nv}}{\sigma_0}(\bar{x} - \theta_0)\right|\right) &= 2\Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}} \left|\frac{(m - \theta_0)}{v/\sigma_0} + \sqrt{nv} \frac{(\bar{x} - \theta_0)}{\sigma_0/\sqrt{n}}\right|\right)
\end{aligned}$$


Sob a abordagem frequentista, temos que o  $p$ -value é

$$p(x) = 1 - P\left(-\frac{|\bar{X} - \theta_0|}{\sigma_0/\sqrt{n}} \leq Z \leq \frac{|\bar{X} - \theta_0|}{\sigma_0/\sqrt{n}}\right) = 2\Phi\left(-\frac{|\bar{X} - \theta_0|}{\sigma_0/\sqrt{n}}\right) \Leftrightarrow -\frac{|\bar{X} - \theta_0|}{\sigma_0/\sqrt{n}} = \Phi^{-1}\left(\frac{p - valor}{2}\right),$$

de modo que, nesse exemplo, podemos escrever

$$Ev(\Theta_0, x) = 2\Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}} \left|\frac{(m - \theta_0)}{v/\sigma_0} + \sqrt{nv} \Phi\left(\frac{p(x)}{2}\right)\right|\right).$$

A seguir, são apresentados gráficos do  $e$ -value e do  $p$ -value como função de  $\bar{x}$  e do  $e$ -value como função do  $p$ -value usando da relação anterior.




```

sigma02=4
m=0; v2=1
theta0 = 0
n=3
p=seq(0,1,length.out=5000)
ep = function(p){
  2*pnorm(-abs(sqrt(sigma02/v2)*(m-theta0) + sqrt(n*v2)*qnorm(p/2))/ sqrt(sigma02+n*v2))
}
graf=tibble(pv=p,ev=ep(p)) %>%
  ggplot() +
  geom_line(aes(x=pv,y=ev),lwd=1.5) +
  geom_segment(x=0.05,xend=0.05,y=0,yend=round(ep(0.05),2),lty=2) +
  geom_segment(x=0,xend=0.05,y=round(ep(0.05),2),yend=round(ep(0.05),2),lty=2) +
  scale_y_continuous(breaks=c(0.00,round(ep(0.05),2),0.25,0.50,0.75,1.00)) +
  scale_x_continuous(breaks=c(0.00,0.05,0.25,0.50,0.75,1.00)) +
  theme_bw()

```

```
if(knitr::is_latex_output()){
  graf
} else { plotly::ggplotly(graf) }
```



Suponha que um estatístico frequentista decida rejeitar  $H_0$  se o  $p$ -value for menor que  $0.05$ . Para que a decisão baseada no  $e$ -value concorde com o resultado frequentista (para esse particular exemplo), deve-se rejeitar a hipótese se o  $e$ -value for menor que  $0.2$ , aproximadamente. Quando a variância da priori ou o tamanho amostral aumentam, os valores dessas duas medidas se aproximam.

### Resultados Assintóticos (para esse exemplo)

Suponha que  $H_0 : \theta = \theta_0$  seja falso, isto é, o “verdadeiro” valor do parâmetro é  $\theta^* \neq \theta_0$ . Quando  $n \uparrow \infty$ , pela Lei dos Grandes Números,

$$\bar{X} \xrightarrow{q.c.} \theta^* \Rightarrow \frac{\sqrt{n}|\bar{X} - \theta_0|}{\sigma_0} \rightarrow +\infty \Rightarrow p(X) = 2\Phi\left(-\frac{\sqrt{n}|\bar{X} - \theta_0|}{\sigma_0}\right) \rightarrow 0,$$

com probabilidade 1. Por outro lado, sob  $H_0 : \theta = \theta_0$ , pelo Teorema Central do Limite,

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta_0)}{\sigma_0} \xrightarrow{\mathcal{D}} Z \sim N(0, 1) \Rightarrow p(X) = 2\Phi\left(-\frac{\sqrt{n}|\bar{X} - \theta_0|}{\sigma_0}\right) \xrightarrow{\mathcal{D}} U = 2\Phi(-|Z|) \sim Unif(0, 1).$$

Esses resultados para o  $p$ -value são bastante conhecidos. No contexto desse exemplo, é possível obter resultados similares para o  $e$ -value. Novamente, considere que  $H_0$  é falso e, sem perda de generalidade,  $\theta = \theta^* > \theta_0$ . Note que

$$\frac{\sigma_0(m - \theta_0)}{v\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}} \rightarrow 0$$

e, pela LGN,

$$\begin{aligned} \bar{X} \xrightarrow{q.c.} \theta^* &\Rightarrow (\bar{X} - \theta_0) \rightarrow (\theta^* - \theta_0) > 0 \Rightarrow \frac{nv(\bar{X} - \theta_0)}{\sigma_0^2\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}} \rightarrow +\infty \Rightarrow Ev(\Theta_0, X) = \\ &2\Phi\left(-\left|\frac{\sigma_0(m - \theta_0)}{v\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}} + \frac{nv(\bar{x} - \theta_0)}{\sigma_0\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}}\right|\right) \rightarrow 2\Phi(-\infty) = 0. \end{aligned}$$

Além disso,  $\frac{v\sqrt{n}}{\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}} \rightarrow 1$  e, sob  $H_0 : \theta = \theta_0$ ,

$$\frac{v\sqrt{n}}{\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}} \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta_0)}{\sigma_0} \xrightarrow{\mathcal{D}} Z \sim N(0, 1),$$

de modo que

$$Ev(\Theta_0, X) = 2\Phi \left( - \left| \frac{\sigma_0(m - \theta_0)}{v\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}} + \frac{nv(\bar{x} - \theta_0)}{\sigma_0\sqrt{\sigma_0^2 + nv^2}} \right| \right) \rightarrow 2\Phi(-|Z|) \sim Unif(0, 1).$$

Esse resultado pode não valer em outros contextos. Por exemplo, quando  $\dim(\Theta_0) \geq 2$ , a distribuição de  $Ev(\Theta_0, X)$  sob  $H_0$  não é  $Unif(0, 1)$ , em geral.

## 5.9 P-value - Nível de Significância Adaptativo

Recentemente, o *p-value* e a utilização do famoso nível  $\alpha = 0.05$  têm sido muito questionados, não apenas na área de testes de hipóteses mas na ciência como um todo. A ideia de fixar um nível de significância é que a probabilidade de *erro tipo I* fica “controlada” e a probabilidade do *erro tipo II* diminui quanto maior o tamanho amostral. Por essa razão, é comum nas áreas de planejamento de experimentos e amostragem, o cálculo do tamanho amostral para um determinado estudo. Infelizmente, na maior parte dos problemas do dia a dia de um estatístico, não há um planejamento cuidadoso ou as amostras disponíveis são “amostras de conveniência”. Simultaneamente, com a “revolução da informação”, a quantidade de dados disponível é cada vez maior. A consequência disso no cenário de testes de hipóteses é que os testes ficam muito poderosos e há uma tendência maior de rejeitar a hipótese nula.


**Exemplo.** Seja  $X_1, \dots, X_n$  c.i.i.d. tais que  $X_i|\theta \sim Ber(\theta)$ ,  $\theta \sim Beta(a, b)$  de modo que  $\theta|x = \sum x_i \sim Beta(a+x, b+n-x)$  e suponha que deseja-se testar  $H_0 : \theta = 1/2$ . A seguir, para diferentes tamanhos amostrais  $n$  e supondo que em todos os casos  $\bar{x}_n = 0.55$ , são apresentados os testes para esse caso vistos até aqui: *p-value* do teste RVG, probabilidade posterior e *BF* do teste de Jeffreys e *e-value* do FBST.

```
a=1; b=1
p=0.5
alpha=0.05
theta0=0.5
xbar=0.55
N=c(1,5,10,20,30,40,50,100,150,300,seq(500,2000,250))
p_v=Vectorize(function(n){
  x=n*xbar
  l = c(min(x,n-x),max(x,n-x))
  pbinom(l[1],n,theta0) + 1-pbinom(l[2],n,theta0) })
Nalpha=seq(max(N[(p_v(N)-alpha)>0]),min(N[(p_v(N)-alpha)<0]))
Nalpha=Nalpha[which.min(abs(p_v(Nalpha)-alpha))]
bf=Vectorize(function(n){
  x=n*xbar
  # exp(log(BF))
  exp(x*log(theta0) + (n-x)*log(1-theta0) + lbeta(a,b) - lbeta(a+x,b+n-x)) })
prob_post=Vectorize(function(n){
  x=n*xbar
  l = log(1-p)+lbeta(a+x,b+n-x)-log(p)-x*log(theta0)-(n-x)*log(1-theta0)-lbeta(a,b)
  1/(1+exp(l)) })
```

```

e_v=Vectorize(function(n){
  x=n*xbar
  f_Tx=function(t){ dbeta(t,a+x,b+n-x)-dbeta(theta0,a+x,b+n-x) }
  moda=(a+x-1)/(a+b+n-2)
  if(theta0==moda){ return(1) }
  if(theta0<moda){
    Tx=c(theta0,uniroot(f=f_Tx,lower=moda,upper=1)$root)
  }else{
    Tx=c(uniroot(f=f_Tx,lower=0,upper=moda)$root,theta0)
  }
  pbeta(Tx[1],a+x,b+n-x)+1-pbeta(Tx[2],a+x,b+n-x)
})
Dados=tibble(n=rep(N,4), Evidencia=c(p_v(N),prob_post(N),bf(N),e_v(N)),
  Estatistica=factor(rep(c("p-value","Prob. Post.", "BF", "e-value"),
    each=length(N)),levels=c("Prob. Post.", "BF", "e-value", "p-value")),
  corte=c(p_v(Nalpha),rep(NA,4*length(N)-1)))
ggplot(Dados)+
  geom_line(aes(x=n,y=Evidencia, colour=Estatistica),lwd=1.5)+
  geom_vline(xintercept=Nalpha,lty=2,col="darkgrey")+
  facet_wrap(~Estatistica, scales="free_y")+
  geom_hline(data=subset(Dados,Estatistica="p-value"),aes(yintercept=corte), lty=2, col="darkgrey")+
  theme_bw()

```



Note que todas as medidas de suporte da hipótese tendem a zero conforme aumenta o tamanho amostral. Isso indica que se  $|\bar{x}_n - \theta_0| = \varepsilon$  e for fixado um valor de corte para essas medidas que não dependa do tamanho amostral (por exemplo, o  $\alpha = 0.05$  para o *p-value*), existe um  $n^*$  tal que  $H_0$  será rejeitado para todo  $n \geq n^*$ . No gráfico, a linha vertical tracejada indica o valor  $n^*$  para o *p-value* considerando o corte  $\alpha = 0.05$ .

Como visto anteriormente, o Lema de Neyman-Pearson Generalizado (DeGroot, 1986) garante que os testes Bayesianos (baseados na probabilidade posterior ou no BF) minimizam  $a\alpha + b\beta$ . Baseado nesse resultado, O professor Carlos A. B. Pereira recentemente propôs um novo procedimento de teste para evitar o problema descrito anteriormente.



1. Seja  $BF(x) = \frac{f_0(x)}{f_1(x)} = \frac{\int_{\Theta_0} f(x|\theta) dP_0(\theta)}{\int_{\Theta_1} f(x|\theta) dP_1(\theta)}$ , onde  $P_i$  é a medida de probabilidade a priori para  $\theta$  restrito à hipótese  $H_i$ ,  $i = 0, 1$ ;
2. Defina  $\alpha_n = P\left(\left\{x : BF(x) \leq \frac{b}{a}\right\} \mid \Theta_0\right)$  e  $\beta_n = P\left(\left\{x : BF(x) > \frac{b}{a}\right\} \mid \Theta_1\right)$ ;
3. Suponha que foi observado  $X = x_o$ . O **P-value** é dado por  $P\text{-value}(x_o) = P\left(\left\{x : BF(x) \leq BF(x_o)\right\} \mid \Theta_0\right)$ ;
4. O procedimento de teste consiste em rejeitar  $H_0$  se  $P\text{-value}(x) < \alpha_n$ .

**Voltando ao Exemplo.** As distribuições preditivas sob  $H_0 : \theta = \theta_0 = 1/2$  e  $H_1 : \theta \neq 1/2$  são

$$f_0(x) = f(x|\theta_0) = \binom{n}{x} \theta_0^x (1 - \theta_0)^{n-x} = \binom{n}{x} (1/2)^n ;$$

$$f_1(x) = \int_{\Theta} f(x|\theta) f(\theta) d\theta = \int_0^1 \binom{n}{x} \frac{\theta_0^{a+x-1} (1 - \theta_0)^{b+n-x-1}}{\beta(a, b)} d\theta = \binom{n}{x} \frac{\beta(a+x, b+n-x)}{\beta(a, b)} .$$

Deste modo,

$$BF(x) = \frac{f_0(x)}{f_1(x)} = \frac{\beta(a, b) \theta_0^x (1 - \theta_0)^{n-x}}{\beta(a+x, b+n-x)} = \frac{\beta(a, b) (1/2)^n}{\beta(a+x, b+n-x)},$$

e, assim,

$$\alpha_n = (1/2)^n \sum_{\{x: BF(x) \leq \frac{b}{a}\}} \binom{n}{x},$$

$$\beta_n = \frac{1}{\beta(a, b)} \sum_{\{x: BF(x) > \frac{b}{a}\}} \binom{n}{x} \beta(a+x, b+n-x),$$

$$P\text{-value}(x_o) = (1/2)^n \sum_{\{x: BF(x) \leq BF(x_o)\}} \binom{n}{x}$$


Supondo novamente que foi observado  $\bar{x} = 0.55$ , o gráfico abaixo apresenta esses valores para diversos tamanhos amostrais.

```
a=1; b=1
a1=1; b1=1
p=0.5
alpha=0.05
theta0=0.5
xbar=0.55
N=c(2,5,seq(10,150,10),seq(150,1000,50))
bf=Vectorize(function(x,n){
  exp(x*log(theta0) + (n-x)*log(1-theta0) + lbeta(a,b) - lbeta(a+x,b+n-x))
}, vectorize.args = c("x"))
alphaN = Vectorize(function(n){
  x=n*xbar
  s=seq(0,n)
  s=s[bf(s,n)<=b1/a1]
  (0.5)^n*sum(choose(n,s))
})
betaN = Vectorize(function(n){
  x=n*xbar
```

```

s=seq(0,n)
s=s[bf(s,n)>b1/a1]
sum(extraDistr::dbbinom(s,n,a,b))
})
P_v=Vectorize(function(n){
  x=n*xbar
  s=seq(0,n)
  s=s[bf(s,n)<=bf(x,n)]
  (0.5)^n*sum(choose(n,s))
})
Dados=tibble(n=N, alpha=alphaN(N), beta=betaN(N), Pvalue=P_v(N))
ggplot(Dados)+
  geom_line(aes(x=n,y=Pvalue, colour="P-value"),lwd=1.2)+
  geom_line(aes(x=n,y=alpha, colour="alpha"),lwd=1.2)+
  geom_line(aes(x=n,y=beta, colour="beta"),lwd=1.2)+
  geom_line(aes(x=n,y=alpha+beta, colour="alpha+beta"),lwd=1.2)+
  theme_bw() + labs(colour="")

```



## Apêndice A

# Breve Resumo de Medida e Probabilidade

Essa seção tem o objetivo de apresentar as ideias de probabilidade como uma medida e da integral de Lebesgue. Para maiores detalhes, ver Ash and Doleans-Dade (2000), Billingsley (1986), Shiryaev (1996) ou, para uma versão mais resumida, os Apêndices de Schervish (2012).

### A.1 Conceitos Básicos

- $\Omega$ : espaço amostral (um conjunto não vazio).
- $\mathcal{A}$ :  $\sigma$ -álgebra de subconjuntos de  $\Omega$ , isto é,
  1.  $\Omega \in \mathcal{A}$ ;
  2.  $A \in \mathcal{A} \implies A^c \in \mathcal{A}$ ;
  3.  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{i \geq 1} A_i \in \mathcal{A}$ .
- Os elementos de  $\mathcal{A}$  são chamados de *eventos* e serão denotados por  $A, B, C, \dots, A_1, A_2, \dots$
- Uma coleção de eventos  $A_1, A_2, \dots$  forma uma *partição* de  $\Omega$  se  $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$ , e  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$ .
- $(\Omega, \mathcal{A})$ : *espaço mensurável*.
- Usualmente, denota-se a  $\sigma$ -álgebra gerada por um conjunto  $\mathcal{C}$  como  $\sigma(\mathcal{C})$ . Por exemplo:
  - $\sigma(\Omega) = \{\emptyset, \Omega\}$  ( $\sigma$ -álgebra trivial);
  - Para  $A \subset \Omega$ ,  $\sigma(A) = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$ ;
  - $\sigma(\mathbb{N}) = \mathcal{P}(\mathbb{N})$  (partes de  $\mathbb{N}$ , todos o subconjuntos de  $\mathbb{N}$ );
  - $\sigma(\{(-\infty, x) : x \in \mathbb{R}\}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$  (borelianos de  $\mathbb{R}$ )

**Definição:** A função  $\mu : \mathcal{A} \longrightarrow \bar{\mathbb{R}}_+$  é uma *medida* se

1.  $\mu(\emptyset) = 0$ ;
2.  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$  com  $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$ ,  $\mu\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) = \sum_{i \geq 1} \mu(A_i)$ .

- $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  é chamado de *espaço de medida*.

**Exemplo 1 (medida de contagem):** Seja  $\Omega$  um conjunto não vazio e  $A \subseteq \Omega$ . Defina  $\nu(A) = |A|$  como o número de elementos (cardinalidade) de  $A$ . Assim,  $\nu(\Omega) > 0$ ,  $\nu(\emptyset) = 0$  e, se  $(A_n)_{n \geq 1}$  é uma sequência de eventos disjuntos, então  $\nu(\cup A_n) = \sum \nu(A_n)$ . Note que  $\nu(A) = \infty$  é possível se  $\Omega$  tem infinitos elementos.

**Exemplo 2 (medida de Lebesgue):** Seja  $\Omega = \mathbb{R}$  e  $A \subseteq \Omega$  um intervalo. Se  $A$  é limitado, defina  $\lambda(A)$  como o comprimento do intervalo  $A$ . Se  $A$  não é limitado,  $\lambda(A) = \infty$ . Note que  $\lambda(\mathbb{R}) = \infty$ ,  $\lambda(\emptyset) = 0$  e, se  $A_1 \cap A_2 = \emptyset$  e  $A_1 \cup A_2$  é um intervalo (ou uma união de intervalos disjuntos), então  $\lambda(A_1 \cup A_2) = \lambda(A_1) + \lambda(A_2)$ .

**Exemplo 3:** Seja  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$  uma função contínua e não nula. Para cada intervalo  $A$ , defina  $\mu(A) = \int_A f(x)dx = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{I}_A(x)f(x)dx$ . Então,  $\mu(\mathbb{R}) > 0$ ,  $\mu(\emptyset) = 0$  e, se  $A_1 \cap A_2 = \emptyset$  e  $A_1 \cup A_2$  é um intervalo (ou uma união de intervalos disjuntos), então  $\mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2)$ .

- Se  $\mu(\Omega) < \infty$  dizemos que  $\mu$  é uma *medida finita*. Se existe uma partição enumerável de  $\Omega$ ,  $A_1, A_2, \dots$ , tal que cada elemento da partição tem medida finita,  $\mu(A_i) < \infty$ ,  $\forall i$ , dizemos que  $\mu$  é uma *medida  $\sigma$ -finita*.

**Definição:**  $P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$  é uma **medida de probabilidade** se

1.  $P(\Omega) = 1$ ;
2.  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$  com  $A_i \cap A_j = \emptyset$ ,  $P\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) = \sum_{i \geq 1} P(A_i)$ .

- $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ : espaço de probabilidade

**Definição:** Seja  $(\Omega, \mathcal{A})$  e  $(\mathfrak{X}, \mathcal{F})$  dois espaços mensuráveis. Uma função  $X : \Omega \rightarrow \mathfrak{X}$  é chamado de *quantidade aleatória* se é uma *função mensurável*, isto é, se  $\forall B \in \mathcal{F}$ , o evento  $A = X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$  pertence à  $\sigma$ -álgebra original  $\mathcal{A}$ .

Se  $\mathfrak{X} = \mathbb{R}$  e  $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$  ( $\sigma$ -álgebra de Borel),  $X$  é chamada **variável aleatória** (v.a.).

- Considere  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ . A medida de probabilidade  $P_X$  induzida por  $X$  recebe o nome de *distribuição de  $X$* . Se  $B \in \mathcal{F}$  e  $A = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{A}$ , a medida induzida por  $X$  é

$$P_X(B) = P_X(X \in B) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}) = P(A) .$$


## A.2 Valor Esperado de $X$ (OU uma ideia da tal Integral de Lebesgue)

Por simplicidade, considere o espaço  $(\Omega = [0, 1], \mathcal{A} = \mathcal{B}([0, 1]), P = \lambda)$ .

Seja  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+$  uma variável aleatória discreta, assumindo valores não negativos  $\mathfrak{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$  com probabilidades  $\{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ . Nos cursos básicos de probabilidade é visto que o *valor esperado* (ou *esperança*) de  $X$  é  $E[X] = \sum x_i P(X = x_i) = \sum x_i p_i$ .

Podemos definir essa v.a. como

$$X(\omega) = \begin{cases} x_1, & \omega \in [0, p_1] = A_1 \\ x_2, & \omega \in [p_1, p_1 + p_2] = A_2 \\ \vdots & \\ x_j, & \omega \in \left[ \sum_{i=1}^{j-1} p_i, \sum_{i=1}^j p_i \right] = A_j \\ \vdots & \\ x_k, & \omega \in [1 - p_k, 1] = A_k \end{cases}$$



Note que a medida  $\lambda$  define uma distribuição uniforme no espaço  $(\Omega, \mathcal{A})$ . Assim, temos que

- $P_X(X = x_1) = P(X^{-1}(x_1)) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_1\}) = P(A_1) = \lambda([0, p_1]) = p_1,$
- $P_X(X = x_j) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_j\}) = \lambda\left(\left[\sum_{i=1}^{j-1} p_i, \sum_{i=1}^j p_i\right]\right) = p_j, \quad j \in \{2, \dots, k\}.$

**Definição:** Uma função mensurável  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+$  é dita *simples* se assumir um número finito de valores.

**Definição:** Considere um espaço de probabilidade  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ,  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+$  v.a. assumindo valores  $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$  e  $A_1, A_2, \dots, A_k$  eventos disjuntos em  $\mathcal{A}$ . Seja  $X(\omega) = \sum_{i=1}^k x_i \mathbb{I}_{A_i}(\omega)$ , uma função

simples com  $A_i = X^{-1}(x_i)$ ,  $i = 1, \dots, k$ . A *integral de Lebesgue* de  $X$  em relação à medida  $P$  é

$$E[X] = \int_{\Omega} X dP = \sum_{i=1}^k x_i P(A_i).$$

**Propriedades:** se  $X, Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}_+$  são funções simples, então

1.  $\int_{\Omega} X dP \geq 0$ ;
2.  $\int_{\Omega} cX dP = c \int_{\Omega} X dP$ ;
3.  $\int_{\Omega} (X + Y) dP = \int_{\Omega} X dP + \int_{\Omega} Y dP$ .

**Demo 1.** Segue de  $x_i \geq 0$  e  $P(A_i) \geq 0$ .

**Demo 2.**

Para  $X$  v.a. temos

$$X = \sum_{i=1}^k x_i \mathbb{I}_{A_i} \text{ e } cX = \sum_{i=1}^k c x_i \mathbb{I}_{A_i}. \text{ Logo,}$$

$$\int_{\Omega} cX dP = \sum_{i=1}^k c x_i P(A_i) = c \sum_{i=1}^k x_i P(A_i) = c \int_{\Omega} X dP.$$

**Demo 3.**

$$X = \sum_{i=1}^k x_i \mathbb{I}_{A_i} \text{ e } Y = \sum_{j=1}^l y_j \mathbb{I}_{B_j}.$$

$$X + Y = \sum_{i=1}^k x_i \mathbb{I}_{A_i} + \sum_{j=1}^l y_j \mathbb{I}_{B_j} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l x_i \mathbb{I}_{A_i \cap B_j} + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l y_j \mathbb{I}_{A_i \cap B_j} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l (x_i + y_j) \mathbb{I}_{A_i \cap B_j}.$$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (X + Y) dP &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l (x_i + y_j) P(A_i \cap B_j) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l x_i P(A_i \cap B_j) + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l y_j P(A_i \cap B_j) \\ &= \sum_{i=1}^k x_i P(A_i) + \sum_{j=1}^l y_j P(B_j) = \int_{\Omega} X dP + \int_{\Omega} Y dP. \end{aligned}$$

A generalização da integral de Lebesgue é feita usando resultados como o *Lema de Fatou* e os teoremas da *convergência monótona* e da *convergência dominada*. Aqui será apresentado apenas uma ideia dessa extensão. Para maiores detalhes, veja as referências citadas anteriormente (Ash and Doleans-Dade, 2000; Schervish, 2012; Billingsley, 1986; Shiryaev, 1996).

**Definição:** Seja  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}_+$  uma função mensurável não negativa e considere o conjunto de funções  $\mathcal{C}_X = \{f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}_+, f \text{ simples}, f \leq X\}$ . O *valor esperado* de  $X$  é

$$E[X] = \int_{\Omega} X dP = \sup \left\{ \int_{\Omega} f dP : f \in \mathcal{C}_X \right\}.$$

**Resultado:** Para toda função  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+$ , existe uma sequência  $(f_n)_{n \geq 1}$  de funções simples não-negativas tais que  $f_n(w) \leq f_{n+1}(w)$ ,  $\forall w \in \Omega$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$  com  $f_n(w) \uparrow X(w)$ ,  $\forall w \in \Omega$ .


**Exemplo** de sequência  $(f_n)_{n \geq 1}$  atendendo as condições anteriores

Para cada  $n$ , considere  $1 + n2^n$  conjuntos em  $\mathcal{A}$  :

- $E_j^n = \left\{ w \in \Omega : \frac{j}{2^n} \leq X(w) \leq \frac{j+1}{2^n} \right\}$ ,  $j = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ .
- $E_{n2^n}^n = \left\{ w \in \Omega : X(w) \geq n \right\}$

e defina  $X_n(w) = \sum_{j=0}^{n2^n} \frac{j}{2^n} \mathbb{1}_{E_j^n}(w)$ . Pode-se provar que  $(X_n)_{n \geq 1}$  é tal que

- $X_n$  é simples,  $\forall n \geq 1$
- $X_n \leq X_{n+1}$
- $X_n(w) \uparrow X(w)$



**Resultado:**  $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+$ , com  $X \leq Y$ . Então  $E[X] \leq E[Y]$ .

**Demo:** Como  $X \leq Y$  (isto é,  $X(w) \leq Y(w) \forall w \in \Omega$ ),  $\mathcal{C}_X \subseteq \mathcal{C}_Y$   
 $\Rightarrow \sup \left\{ \int_{\Omega} f dP : f \in \mathcal{C}_X \right\} \leq \sup \left\{ \int_{\Omega} g dP : g \in \mathcal{C}_Y \right\} \Rightarrow \int_{\Omega} X dP \leq \int_{\Omega} Y dP$ .

**Definição:** Seja  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+$  e  $E \in \mathcal{A}$  definimos  $E(X \mathbb{1}_E) = \int_E X dP = \int_{\Omega} X \mathbb{1}_E dP$ .

Se  $E, F \in \mathcal{A}$  com  $E \subseteq F$ ,  $\int_E X dP \leq \int_F X dP$ .

**Propriedades:** se  $X, Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}_+$  são funções mensuráveis positivas, então

1.  $\int_{\Omega} cXdP = c \int_{\Omega} XdP, c \geq 0;$
2.  $\int_{\Omega} (X + Y)dP = \int_{\Omega} XdP + \int_{\Omega} YdP.$

**Demo 1.** Seja  $X_n \uparrow X$ ,  $X_n \geq 0$  simples. Então  $cX_n \uparrow cX$ ,  $cX_n \geq 0$ , simples.  

$$\int_{\Omega} cXdP = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} cX_n dP = \lim_{n \rightarrow \infty} c \int_{\Omega} X_n dP = c \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} X_n dP = c \int_{\Omega} XdP.$$

**Demo 2.** Exercício.

**Exemplo:** Suponha que  $X$  assume valores em  $\mathbb{N}$ . Pode-se escrever  $X = \sum_{i=1}^{\infty} i \mathbb{I}_{A_i}$ , com  $A_i = X^{-1}(\{i\})$ .

Defina  $X_n = \sum_{i=1}^{n-1} i \mathbb{I}_{A_i} + n \mathbb{I}_{\bigcup_{j=n}^{\infty} A_j}$ . Então  $X_n$  é simples,  $X_n \geq 0$ ,  $X_n \leq X_{n+1}$  e  $X_n \uparrow X$ , de modo que

$E(X) = \int_{\Omega} XdP = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} X_n dP$ . Além disso,


$$\begin{aligned} \int_{\Omega} X_n dP &= \sum_{i=1}^{n-1} i P(A_i) + n P\left(\bigcup_{j=n}^{\infty} A_j\right) = \sum_{i=1}^{n-1} i P(X=i) + n P(X \geq n) = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^i P(X=i) + n P(X \geq n) \\ &= \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j}^{n-1} P(X=i) + n P(X \geq n) = \sum_{j=1}^{n-1} P(j \leq X \leq n-1) + n P(X \geq n) = \sum_{j=1}^n P(X \geq j), \end{aligned}$$

então,  $E(X) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n P(X \geq j) = \sum_{j=1}^{\infty} P(X \geq j)$ .

Seja  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  e  $X^-, X^+ : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  dados por

- $X^- = \max\{-X, 0\}$  (parte negativa de  $X$ ) e
- $X^+ = \max\{X, 0\}$  (parte positiva de  $X$ )





Note que  $X = X^+ - X^-$

Se  $\int_{\Omega} X^+ dP < \infty$  ou  $\int_{\Omega} X^- dP < \infty$ , definimos

$$E[X] = \int_{\Omega} X dP = \int_{\Omega} X^+ dP - \int_{\Omega} X^- dP = E[X^+] - E[X^-].$$

Além disso, seja  $|X| = X^+ + X^-$ . Então,  $E[|X|] < \infty$  se  $E(X^+) < \infty$  e  $E(X^-) < \infty$ , e, nesse caso, dizemos que  $X$  é *integrável*.

**Propriedades:** se  $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  são funções mensuráveis, então

1.  $X \leq Y \Rightarrow E(X) \leq E(Y)$ ;
2.  $c \in \mathbb{R}$ ,  $E(cX) = cE(X)$ ;
3.  $X, Y$  integráveis.  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ .

**Demo 1.**

$$X \leq Y \Rightarrow \begin{cases} X^+ \leq Y^+ \\ X^- \geq Y^- \end{cases}$$

$$E(X) = E(X^+) - E(X^-) \leq E(Y^+) - E(Y^-) = E(Y).$$

**Demo 2.**

$$(cX)^+ = \begin{cases} cX^+ & , \quad c \geq 0 \\ -cX^- & , \quad c < 0 \end{cases}$$

$$(cX)^- = \begin{cases} cX^- & , \quad c \geq 0 \\ -cX^+ & , \quad c < 0 \end{cases}$$

Para  $c < 0$ ,

$$E[cX] = E[(cX)^+] - E[(cX)^-] = E[-cX^-] - E[-cX^+] = -cE[X^-] + cE[X^+] = cE[X].$$

**Demo 3.**

$$\int_{\Omega} (X^+ + Y^+) dP < \infty \text{ ou } \int_{\Omega} (X^- + Y^-) dP < \infty$$

$$\begin{aligned}
X + Y &= (X + Y)^+ - (X + Y)^- = X^+ - X^- + Y^+ - Y^- \\
&\Rightarrow (X + Y)^+ + X^- + Y^- = X^+ + Y^+ + (X + Y)^- \\
&\Rightarrow \int_{\Omega} (X + Y)^+ dP + \int_{\Omega} X^- dP + \int_{\Omega} Y^- dP \\
&= \int_{\Omega} X^+ dP + \int_{\Omega} Y^+ dP + \int_{\Omega} (X + Y)^- dP. \\
|X + Y| &= |X^+ - X^- + Y^+ - Y^-| \leq X^+ + X^- + Y^+ + Y^- \\
&\Rightarrow \int_{\Omega} (X + Y)^+ dP - \int_{\Omega} (X + Y)^- dP = \int_{\Omega} X^+ dP - \int_{\Omega} X^- dP + \int_{\Omega} Y^+ dP - \int_{\Omega} Y^- dP. \\
&\Rightarrow \int_{\Omega} (X + Y) dP = \int_{\Omega} X dP + \int_{\Omega} Y dP
\end{aligned}$$

### A.3 Funções de Variáveis Aleatórias

Considere agora uma v.a.  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  e uma função real  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Defina  $Y = g(X)$ . Então

$$(\Omega, \mathcal{A}, P) \xrightarrow{X} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X) \xrightarrow{g} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_Y)$$

$$(\Omega, \mathcal{A}, P) \xrightarrow{Y=g(X)} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_Y)$$

Logo, se  $g$  é uma função mensurável,  $Y = g(X)$  também é v.a. e as medidas induzidas por  $X$  e  $Y$  são

$$P_X(A) = P(X^{-1}(A)) = P(\{w \in \Omega : X(w) \in A\});$$

$$P_Y(B) = P_X(g^{-1}(B)) = P_X(\{x \in \mathbb{R} : g(x) \in B\}) = P(\{w \in \Omega : g(X(w)) \in B\}).$$

Assim, uma pergunta natural é como obter o valor esperado de  $Y$ .

$$E(Y) = \int_{\Omega} Y dP = \int_{\Omega} g(X) dP \stackrel{?}{=} \int_{\mathbb{R}} g dP_X.$$

**Caso 1.** Seja  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$  uma função simples tal que  $g = \sum_{i=1}^k g_i \mathbb{I}_{B_i}$ ,  $g_1, \dots, g_k \in \mathbb{R}$  e  $B_1, \dots, B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Então,

$$\begin{aligned}
\int_{\Omega} Y dP &= \int_{\Omega} g(X) dP = \int_{\Omega} \left( \sum_{i=1}^k g_i \mathbb{I}_{B_i}(X) \right) dP = \int_{\Omega} \left( \sum_{i=1}^k g_i \mathbb{I}_{X^{-1}(B_i)} \right) dP \stackrel{def}{=} \sum_{i=1}^k g_i P(X^{-1}(B_i)) \\
&= \sum_{i=1}^k g_i P_X(B_i) = \int_{\mathbb{R}} \left( \sum_{i=1}^k g_i \mathbb{I}_{B_i} \right) dP_X = \int_{\mathbb{R}} g dP_X.
\end{aligned}$$

**Caso 2.** Seja  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$  uma função não negativa e  $(g_n)_{n \geq 1}$ ,  $g_n \geq 0$ , uma sequência crescente de funções simples tal que  $g_n \uparrow g$ . Como  $g_n$  é simples,

$$\int_{\Omega} g_n(X) dP = \int_{\mathbb{R}} g_n dP_X \xrightarrow{n \uparrow \infty} \int_{\Omega} g(X) dP = \int_{\mathbb{R}} g dP_X.$$

**Caso 3.** Agora para  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , temos

$$\int_{\Omega} g^+(X) dP = \int_{\mathbb{R}} g^+ dP_X \text{ e } \int_{\Omega} g^-(X) dP = \int_{\mathbb{R}} g^- dP_X.$$

$$\text{Logo, } \int_{\Omega} g(X) dP = \int_{\mathbb{R}} g dP_X.$$

Suponha agora  $X$  v.a. discreta assumindo valores em  $\{x_1, x_2, \dots\}$  com probabilidade 1. Nesse caso,

$$P(X \in A) = \sum_{i: x_i \in A} P(X = x_i). \text{ Vamos "verificar" que } E[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)P(X = x_i).$$

**Caso 1.**  $g$  simples com  $g = \sum_{i=1}^k g_i \mathbb{I}_{B_i}$ ,  $g_1, \dots, g_k \in \mathbb{R}_+$ ,  $B_1, \dots, B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Então,

$$\begin{aligned} E[g(X)] &= \int_{\Omega} g(X) dP = \sum_{i=1}^k g_i P_X(B_i) = \sum_{i=1}^k g_i \sum_{j: x_j \in B_i} P(X = x_j) = \sum_{i=1}^k g_i \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{I}_{B_i}(x_j) P(X = x_j) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \underbrace{\left( \sum_{i=1}^k g_i \mathbb{I}_{B_i}(x_j) \right)}_{g(x_j)} P(X = x_j). \end{aligned}$$

**Caso 2.**  $g \geq 0$ ,  $g_n \geq 0$ ,  $g_n$  simples tal que  $g_n \uparrow g$

$$\int_{\Omega} g(X) dP = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} g_n(X) dP = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} g_n(x_j) P(X = x_j) \right\} = \sum_{j=1}^{\infty} g(x_j) P(X = x_j)$$

**Caso 3.** Agora para  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , temos

$$\int_{\Omega} g^+(X) dP = \sum_{j=1}^{\infty} g^+(x_j) P(X = x_j) \text{ e } \int_{\Omega} g^-(X) dP = \sum_{j=1}^{\infty} g^-(x_j) P(X = x_j).$$

$$\text{Logo, } \int_{\Omega} g(X) dP = \sum_{j=1}^{\infty} g(x_j) P(X = x_j).$$

Suponha agora  $X$  v.a. absolutamente contínua com função de densidade de probabilidade  $f_X$ . Nesse caso,  $P_X(X \in A) = \int_A f_X(t) dt = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{I}_A(t) f_X(t) dt$ . Vamos "verificar" que  $E[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) dx$ .

**Caso 1.**  $g$  simples com  $g = \sum_{i=1}^k g_i \mathbb{I}_{B_i}$ ,  $g_1, \dots, g_k \in \mathbb{R}_+$ ,  $B_1, \dots, B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Então,

$$\begin{aligned} E[g(X)] &= \int_{\Omega} g(X) dP = \int_{\Omega} \left( \sum_{i=1}^k g_i \mathbb{I}_{B_i}(X) \right) dP = \int_{\Omega} \left( \sum_{i=1}^k g_i \mathbb{I}_{X^{-1}(B_i)} \right) dP = \sum_{i=1}^k g_i P(X^{-1}(B_i)) \\ &= \sum_{i=1}^k g_i P_X(B_i) = \sum_{i=1}^k g_i \int_{\mathbb{R}} \mathbb{I}_{B_i}(x) f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \sum_{i=1}^k g_i \mathbb{I}_{B_i}(x) f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) dx. \end{aligned}$$

A extensão para funções positivas e para funções reais é análogo ao que foi feito nos exemplos anteriores.

Assim, em geral, vale que:

- $X$  discreto:  $E[g(X)] = \sum_{j=1}^{\infty} g(x_j) P(X = x_j)$ ;
- $X$  (absolutamente) contínuo:  $E[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx$ .

Esses resultados valem também se  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$  e  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Exemplo 1.** Seja  $X$  uma v.a. definida em  $\mathbb{N}$  com função de probabilidade  $P_X(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \mathbb{I}_{\mathbb{N}}(x)$ , para  $\lambda > 0$  fixado. Dizemos nesse caso que  $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ . Então, o valor esperado de  $X$  é

$$E[X] = \sum_{x=0}^{\infty} x P_X(X = x) = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = \sum_{x=1}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{(x-1)!} = \lambda \sum_{x=1}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x-1}}{(x-1)!} \stackrel{t=x-1}{=} \lambda \sum_{t=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^t}{t!} \\ \Rightarrow E[X] = \lambda.$$

Ainda neste exemplo, considere  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  com  $g(t) = e^t$ . Então,

$$E[g(X)] = \sum_{x=0}^{\infty} g(x) P_X(X = x) = \sum_{x=0}^{\infty} e^x \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(\lambda e)^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e} \underbrace{\sum_{x=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda e} (\lambda e)^x}{x!}}_1 = e^{\lambda(e-1)}.$$

**Exemplo 2.** Seja  $X$  uma v.a. definida em  $[0, 1]$  com função densidade de probabilidade  $f_X(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1}(1-x)^{b-1} \mathbb{I}_{[0,1]}(x)$ , para  $a, b > 0$  fixados. Dizemos nesse caso que  $X \sim \text{Beta}(a, b)$ . Então, o valor esperado de  $X$  é

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 x \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1}(1-x)^{b-1} dx = \frac{\Gamma(a+1)}{\Gamma(a+1+b)} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)} \int_0^1 \frac{\Gamma(a+1+b)}{\Gamma(a+1)\Gamma(b)} x^{(a+1)-1}(1-x)^{b-1} dx \\ = \frac{\Gamma(a+1)}{\Gamma(a+1+b)} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)}.$$

Considere agora  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  com  $g(t) = t^c(1-t)^d$ , com  $c, d > 0$  fixados. Então,

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx = \int_0^1 \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a+c-1}(1-x)^{b+d-1} dx = \frac{\Gamma(a+c)\Gamma(b+d)}{\Gamma(a+c+b+d)} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^1 \frac{\Gamma(a+c+b+d)}{\Gamma(a+b)\Gamma(b+d)} x^{(a+c)-1}(1-x)^{(b+d)-1} dx \\ = \frac{\Gamma(a+c)\Gamma(b+d)}{\Gamma(a+c+b+d)} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} = \frac{\beta(a+c, b+d)}{\beta(a, b)}.$$

## A.4 Função de Distribuição

**Definição:** Uma função  $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$  é uma *função de distribuição* (f.d.) se

- (i)  $F$  é não-decrescente e contínua à direita;
- (ii)  $\lim_{x \downarrow -\infty} F(x) = 0$  e  $\lim_{x \uparrow +\infty} F(x) = 1$ .

**Proposição:** Se  $X$  é uma v.a., então  $F_X(x) = P_X(X \leq x)$  é uma f.d. Recíprocamente, se  $F_X$  é uma f.d, então existe uma v.a.  $X$  com f.d.  $F_X$ .

- É possível usar uma f.d.  $F$  para criar uma medida em  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ . Para tal, defina  $P((a, b]) = F(b) - F(a)$  e essa medida pode ser estendida para a  $\sigma$ -álgebra usando o Teorema de Extensão de Caratheodory (veja, por exemplo, Schervish (2012), pág. 578).

- Reciprocamente, se  $P$  é uma medida de probabilidade em  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  então  $F(x) = P((-\infty, x])$  é uma f.d.
- Neste caso, se  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função mensurável, não será feita distinção entre  $\int g(x)dF(x) = \int g(x)dP(x)$ .
- Se  $P$  é uma medida de probabilidade em  $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k))$  então  $F(x_1, \dots, x_k) = P((-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_k])$  é a *função de distribuição conjunta* do *vector aleatório*  $X = (X_1, \dots, X_K)$ .

**Definição:** Seja  $(\Omega, \mathcal{A})$  um espaço mensurável e  $\mu_1$  e  $\mu_2$  medidas nesse espaço. Dizemos que  $\mu_2$  é *absolutamente contínua* com relação à  $\mu_1$  se,  $\forall A \in \mathcal{A}$ ,  $\mu_1(A) = 0 \Rightarrow \mu_2(A) = 0$ .

- Nesse caso, dizemos que  $\mu_2$  é dominada por  $\mu_1$  ou que  $\mu_1$  é uma medida dominante para  $\mu_2$  e denotamos  $\mu_2 \ll \mu_1$ .

**Teorema (de Radon-Nikodin):** Seja  $\mu_2 \ll \mu_1$  com  $\mu_1$   $\sigma$ -finita. Então,  $\exists f : \Omega \rightarrow [0, +\infty]$  tal que,  $\forall A \in \mathcal{A}$ ,

$$\mu_2(A) = \int_A f(x)d\mu_1(x).$$

Além disso, se  $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  é  $\mu_2$ -integrável, então

$$\int g(x)d\mu_2(x) = \int g(x)f(x)d\mu_1(x).$$

A função  $f = \frac{d\mu_2}{d\mu_1}$  é chamada de derivada de Radon-Nikodin da medida  $\mu_2$  com relação à medida  $\mu_1$  e é única  $\mu_1$ -q.c. (ou seja, é única em todo conjunto  $\Omega$  com eventual exceção de um conjunto  $C$  tal que  $\mu_1(C) = 0$ ).

**Definição:**  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  espaço de probabilidade e  $(\mathfrak{X}, \mathcal{F}, \mathcal{V})$  espaço mensurável. Considere  $X : \Omega \rightarrow \mathfrak{X}$  uma v.a. e  $P_X$  a medida induzida por  $X$  de  $P$ , i.e.  $P_X(B) = P(X^{-1}(B))$ . Suponha que  $P_X \ll \mathcal{V}$ . Então, a derivada de Radon-Nikodin  $f_X = \frac{dP_X}{d\mathcal{V}}$  é a densidade de  $X$  com respeito a  $\mathcal{V}$ .

**Proposição:** Se  $h : \mathfrak{X} \rightarrow \mathbb{R}$  é mensurável e  $f_X = \frac{dP_X}{d\mathcal{V}}$ , então  $\int h(x)dF_X(x) = \int h(x)f_X(x)d\mathcal{V}$ .

**Exemplo 1:** Seja  $\Omega = \mathfrak{X} = \mathbb{R}$  com a  $\sigma$ -álgebra de Borel e  $f$  uma função não negativa tal que  $\int f(x)dx = 1$ . Defina  $\mu(A) = \int_A f(x)dx$  e  $X(\omega) = \omega$ . Então,  $X$  é uma variável aleatória absolutamente contínua com função de densidade de probabilidade (f.d.p.)  $f$  e  $\mu_X = \mu$ . Além disso,  $\mu_X$  é absolutamente contínua com relação à medida de Lebesgue ( $\mu_X \ll \lambda$ ) e  $\frac{d\mu_X}{d\lambda} = f$ .

**Exemplo 2:** Seja  $\Omega = \mathbb{R}$  com a  $\sigma$ -álgebra de Borel,  $\mathfrak{X} = \{x_1, x_2, \dots\}$  um conjunto enumerável. Seja  $f$  uma função não negativa definida em  $\mathfrak{X}$  tal que  $\sum_{i=1}^{\infty} f(x_i) = 1$ . Defina  $\mu_X(A) = \sum_{\{i: x_i \in A\}} f(x_i)$ . Então  $X$  é uma variável aleatória discreta com função de probabilidade (f.d.p.)  $f$  e  $\mu_X = \mu$ . Além disso,  $\mu_X$  é absolutamente contínua com relação à medida de contagem ( $\mu_X \ll \nu$ ) e  $\frac{d\mu_X}{d\nu} = f$ .

**Resultado:**  $X_1, X_2, \dots, X_k$  são v.a. independentes com  $E(X_i) < \infty$ ,  $i = 1, \dots, k$

Então,

$$E(X_1 * X_2 \cdots * X_k) = E(X_1)E(X_2) \cdots E(X_k)$$

**Resultado**  $(\Omega, \mathcal{A})$  espaço mensurável.

$P_1, P_2 : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1)$  probabilidades.

$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  v.a.

$$\int_{\Omega} X dP_1 \text{ e } \int_{\Omega} X dP_2$$

$$P = \alpha P_1 + (1 - \alpha) P_2, 0 < \alpha < 1.$$

$$\text{Então; } \int_{\Omega} X dP = \alpha \int_{\Omega} X dP_1 + (1 - \alpha) \int_{\Omega} X dP_2$$

#### 1. $X$ simples

$$X = \sum_{i=1}^k X_i \mathbb{I}_{A_i}$$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} X dP &= \sum_{i=1}^k x_i P(A_i) = \sum_{i=1}^k x_i [\alpha P(A_i) + (1 - \alpha) P_2(A_i)] = \alpha \sum_{i=1}^k x_i P(A_i) + (1 - \alpha) \sum_{i=1}^k x_i P_2(A_i) \\ &= \alpha \int_{\Omega} X dP_1 + (1 - \alpha) \int_{\Omega} X dP_2 \end{aligned}$$

#### 2. $X \geq 0$

$X_n \uparrow X$ ,  $X_n \geq 0$ , simples.

$$\int_{\Omega} X dP = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} X_n dP = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \alpha \int_{\Omega} X_n dP_1 + (1 - \alpha) \int_{\Omega} X_n dP_2 \right\} = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} X_n dP_1 + (1 - \alpha) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} X_n dP_2 = \alpha \int_{\Omega} X dP_1 + (1 - \alpha) \int_{\Omega} X dP_2.$$

$P_1(\{x_1, x_2, \dots\}) = 1$ ,  $P_2$  “possui” função densidade de probabilidade  $f_x$ , e  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $P(X \in A) = \alpha P_1(X^{-1}(A)) + (1 - \alpha) P_2(X^{-1}(A))$

Então:

$$E(X) = \int_{\Omega} X dP = \alpha \int_{\Omega} X dP_1 + (1 - \alpha) \int_{\Omega} X dP_2 = \alpha \sum_{i=1}^{\infty} x_i P_1(X = x_i) + (1 - \alpha) \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

**Exemplo**

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{15} + \frac{2}{3}t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & t \geq 1 \end{cases}$$

IMAGEM FA F

$$\frac{1}{15} = P(X = 0) = \frac{9}{15} P_1(X = 0) \Rightarrow P_1(X = 0) = \frac{1}{5}, \text{ e portanto, } P_1(X = 1) = \frac{4}{5}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \alpha \int_{\Omega} X dP_1 + (1 - \alpha) \int_{\Omega} X dP_2 = \frac{1}{3} \left\{ 0 * \frac{1}{5} + 1 * \frac{4}{5} \right\} + \frac{2}{3} \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \frac{1}{3} * \frac{4}{5} + \frac{2}{3} \int_0^1 x dx = \\ &= \frac{4}{15} + \frac{2}{15} = \frac{6}{15}. \end{aligned}$$

**Exemplo**

$$(\Omega = [0, 1]^2, \mathcal{A} = \mathcal{B}([0, 1]^2), P = \lambda)$$

$$X(w) = \begin{cases} x_1, & w_1 \leq 1/2 \quad (A_1) \\ x_2, & w_1 > 1/2 \quad (A_2) \end{cases}$$

$$Y(w) = \begin{cases} y_1, & w_1 \leq w_2 \quad (B_1) \\ y_2, & w_1 > w_2 \quad (B_2) \end{cases}$$

**IMAGEM DAS PARTIÇÕES**

$$P_X(x_1) = P(X^{-1}(\{x_1\})) = P(w \in A_1) = \lambda(A_1) = 1/2$$

$$P_Y(y_1) = P(Y^{-1}(\{y_1\})) = P(w \in B_1) = \lambda(B_1) = 1/2$$

$$\sigma_X = \{\phi, A_1, A_2, \Omega\} \subseteq \mathcal{B}([0, 1]^2) \text{ (é sub-}\sigma\text{-álgebra)}$$

$$\sigma_Y = \{\phi, B_1, B_2, \Omega\} \subseteq \mathcal{B}([0, 1]^2)$$

Seja  $Z(w) = (X(w), Y(w)) = (X, Y)(w)$ ,  $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$   $Z(w) = \sum_{i=1}^4 z_i \mathbb{I}_{C_i}(w)$  é função simples.

$$Z(w) = \begin{cases} (x_1, y_1) = z_1, & w \in A_1 \cap B_1 = C_1 \\ (x_1, y_2) = z_2, & w \in A_1 \cap B_2 = C_2 \\ (x_2, y_1) = z_3, & w \in A_2 \cap B_1 = C_3 \\ (x_2, y_2) = z_4, & w \in A_2 \cap B_2 = C_4 \end{cases}$$

$$P_Z(\underbrace{(x_1, y_2)}_{z_2}) = P_Z(\underbrace{(x_2, y_1)}_{z_3}) = \frac{1}{8} = \lambda(\underbrace{A_1 \cap B_2}_{C_2}) = \lambda(\underbrace{A_2 \cap B_1}_{C_3})$$

$$P_Z(\underbrace{(x_1, y_1)}_{z_1}) = P_Z(\underbrace{(x_2, y_2)}_{z_4}) = \frac{3}{8} = \lambda(\underbrace{A_1 \cap B_1}_{C_1}) = \lambda(\underbrace{A_2 \cap B_2}_{C_4})$$

$$P_Z(z_1 | z_1 \cap z_3) = \frac{P_Z(z_1 \cap (z_1 \cup z_3))}{P_Z(z_1 \cup z_3)} = \frac{P_Z(z_1)}{P_Z(z_1) + P_Z(z_3)} = \frac{3/8}{3/8 + 1/8} = \frac{3}{4} = P_Z((X = x_1, Y = y_1) | \overbrace{X \in \{x_1, x_2\}}^{\Omega}, Y = y_1) = P_{X|Y=y_1}(X = x_1 | Y = y_1) = 1 - P_{X|y_1}(X = x_2 | Y = y_1).$$

$$P_{X|y_1}(X = x_1 | Y = y_2) = \frac{1/8}{4/8} = \frac{1}{4}$$

Pela aula passada, podemos calcular  $E[X|Y = y_1]$  como  $E[X|Y = y_1] = \int x dP_{X|Y=y_1}(x) = \sum_{i=1}^2 x_i P_{X|Y=y_1}(x_i | y_1)$

Por exemplo, se  $x_1 = y_1 = 1$ ,  $x_2 = y_2 = 2$ , temos  $E[X|Y = 1] = 1 * \frac{3}{4} + 2 * \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$

Analogamente,

$$E[X|Y = 2] = 1 * \frac{1}{4} + 2 * \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$$

$$E[X|Y](w) = \begin{cases} 5/4, & w \in B_1 \\ 7/4, & w \in B_2 \end{cases}$$

$$E[X|Y] = E[X|\sigma_X].$$

**A.5 Probabilidade Condicional****Motivação**

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ é bem definido se } P(B) > 0.$$

**Exemplo** Seja  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  v.a. e considere um experimento em dois estágios onde seleciona-se  $X \sim F_X$  e, dado  $X = x$ ,  $0 \leq x \leq 1$ , uma moeda com probabilidade  $x$  é lançada  $n$  vezes. Nesse caso, é natural definir  $Y|X = x \sim \text{Bin}(n, x)$  mesmo que  $P(X = x) = 0$ ,  $\forall x \in [0, 1]$ .

### A.5.1 Teorema da Medida Produto (para medidas de probabilidade)

Seja  $(\Omega_1, \mathcal{A}_1, P_1)$  um espaço de probabilidade e  $(\Omega_2, \mathcal{A}_2)$  um espaço mensurável. Para cada  $w_1 \in \Omega_1$ , defina uma medida de probabilidade  $\mu(w_1, \cdot)$  em  $\mathcal{A}_2$ . Assuma que, para cada  $B \in \mathcal{A}_2$ ,  $\mu(\cdot, B)$  também é  $\mathcal{A}_1$ -mensurável. Então, existe uma única medida de probabilidade  $P$  em  $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$  tal que  $P(A \times B) = \int_A \mu(w_1, B) dP_1(w_1)$ ,  $\forall A \in \mathcal{A}_1$ ,  $\forall B \in \mathcal{A}_2$ .

Se  $D(w_1)$  denota uma secção de  $D$  em  $w_1$ , isto é,  $D(w_1) = \{w_2 \in \Omega_2 : (w_1, w_2) \in D\}$ ,  $D \in \mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$ , então

$$P(D) = \int_{\Omega_1} \mu(w_1, D(w_1)) dP_1(w_1).$$

Voltando à probabilidade condicional,

Vamos interpretar (informalmente por enquanto)  $\mu(x, B)$  como  $P(Y \in B | X = x)$ . Ainda informalmente, vamos pensar no evento  $\{X = x\}$ . Intuitivamente, a probabilidade que  $X \in (x, x + dx]$  é  $dF(x)$ .

Então, sabendo que  $\{X = x\}$ , o evento  $\{(X, Y) \in C\}$  ocorre se, e somente,  $Y \in C(x) = \{y : (x, y) \in C\}$  e a probabilidade desse evento é  $\mu(x, C(x))$ . Pela regra da probabilidade total,

$$P(C) = \int_{-\infty}^{\infty} \mu(x, C(x)) dF(x).$$

Se  $C = \{(x, y) : x \in A, y \in B\} = A \times B$ ,  $C(x) = B$  se  $x \in A$  e  $C(x) = \emptyset$  se  $x \notin A$ , então

$$P(C) = P(A \times B) = \int_A \mu(x, B) dF(x)$$

Se  $\mu(x, B)$  é mensurável em  $x$  para cada  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , então pelo Teorema anterior,  $P$  é único.

**Exemplo:** Se  $X \sim \text{Beta}(a, b)$  e  $Y | X = x \sim \text{Ben}(n, x)$  ( $\Omega_1 = [0, 1]$ ,  $\mathcal{A}_1 = \mathcal{B}([0, 1])$ ,  $P_X$ ), onde

$$P_X(A) = \int_A dF_X(x) = \int_A f_X(x) dx = \int_A \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$$

para  $A \in \mathcal{A}_1$ . Além disso, considere  $\Omega_2 = \{0, 1, \dots, n\}$ ,  $\mathcal{A}_2 = \mathcal{P}(\Omega_2)$  e, para cada  $x \in [0, 1]$ ,

$\mu(x, B) = P(Y \in B | X = x)$ . Então, para  $k = 0, 1, \dots, n$ ;  $\mu(x, B) = P(Y \in B | X = x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$  (que é mensurável em  $x$ ).

Tomando  $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$ ,  $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$ ,  $P$  é a única medida de probabilidade determinada por  $P_X$  (ou  $F_X$ ) e  $\mu(x, \cdot)$ .

$$P(C) = \int_{\Omega_1} \mu(x, C(x)) dP_X = \int_0^1 \mu(x, C(x)) dF_X(x) = \int_0^1 \mu(x, C(x)) f_X(x) dx, C \in \mathcal{A}.$$

Por exemplo, se  $C = \Omega_1 \times \{k\}$ , temos

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= P(\Omega_1 \times \{k\}) = \int_0^1 P(Y = k | X = x) dF(x) = \int_0^1 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx \\ &= \frac{\binom{n}{k} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}}{\frac{\Gamma(a+b+n)}{\Gamma(a+k)\Gamma(b+n-k)}} \int_0^1 \frac{\Gamma(a+b+n)}{\Gamma(a+k)\Gamma(b+n-k)} x^{a+k-1} (1-x)^{b+n-k-1} dx = \binom{n}{k} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \frac{\Gamma(a+k)\Gamma(b+n-k)}{\Gamma(a+b+n)}. \end{aligned}$$

( $Y \sim \text{BetaBin}(n, a, b)$ )

**Teorema**  $X : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathfrak{X}, \mathcal{F})$  em  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  e  $B \in \mathcal{A}$ . Então  $\exists g : \mathfrak{X} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que, para cada  $A \in \mathcal{F}$ ,  $P(\{x \in A\} \cap B) = \int_A g(x) dP_X(x)$ .

Além disso,  $g$  é única  $P_X$ -q.c.

( $g(x) = P(B | X = x)$  é única  $P_X$ -q.c. para um dado  $B$ )

**Demo:** segue diretamente do Teorema de Radon-Nikodim (se  $\mu(A) = P(\{x \in A\} \cap B)$  então  $\lambda$  é medida finita em  $\mathcal{F}$  com  $\lambda \ll P_X$ )



**Exemplo1:**  $\mathfrak{X} = \{x_1, x_2, \dots\}$  com  $p_i = P(\{X = x_i\}) > 0$ . Defina

$$g(x_i) = P(B|X = x_i) = \frac{P(B \cap \{X = x_i\})}{P(\{X = x_i\})}, \quad i = 1, 2, \dots$$

( $g$  é uma “proposta” para  $P(B|\{X = x_i\})$ )

Se  $A \in \mathcal{F} = \mathcal{P}(\mathfrak{X})$ ,

$$\int_A g(x) dP_X(x) = \int_{\mathfrak{X}} g(x) \mathbb{1}_A(x) dP_X(x) = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) \mathbb{1}_A(x_i) P_X(\{x_i\}) = \sum_{x_i \in A} g(x_i) P(\{X = x_i\}) = \sum_{x_i \in A} P(B \cap \{X = x_i\}) = P(\{X \in A\} \cap B).$$

**Exemplo 2**  $\Omega = \mathbb{R}^2$ ,  $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ ,  $X(x, y) = x$ ,  $Y(x, y) = y$  ( $X, Y$ ) v.a. com densidade  $f$  ( $P(A) = \int \int_A f(x, y) dx dy$ ,  $A \in \mathcal{A}$ ).

Nesse caso  $P(\{X = x\}) = 0, \forall x$ .

Seja  $f_1(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$  a densidade de  $X$ .

Defina  $f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_1(x)}$  como a densidade condicional de  $Y$  dado  $X = x$ .

Note que  $f(y|x)$  só está definido quando  $f_1(x) \neq 0$ .

Contudo, se  $S = \{(x, y) : f_1(x) = 0\}$  então  $P(\{(X, Y) \in S\}) = 0$

$$P(\{(X, Y) \in S\}) = \int \int_S f(x, y) dx dy = \int_{\{x: f_1(x)=0\}} \left[ \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \right] dx = \int_{\{x: f_1(x)=0\}} f_1(x) dx = 0.$$

de modo que podemos ignorar o conjunto onde  $f(y|x)$  não está definida.

Se  $X = x$ ,  $\forall B \in \mathcal{A}$ ,  $B$  ocorre se e soente se  $Y \in B(x) = \{y : (x, y) \in B\}$ . Assim, vamos propor

$$g(x) = P(\{Y \in B(x)|X = x\}) = \int_{B(x)} f(y|x) dy = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{1}_B(x, y) f(y|x) dy,$$

Então, se  $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ,

$$P(\{X \in A\} \cap B) = \int \int_{\substack{x \in A \\ (x, y) \in B}} f(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{1}_B(x, y) f(y|x) dy \right] \mathbb{1}_A(x) f_1(x) dx = \int_A f_1(x) dx \underbrace{\int_B f(y|x) dy}_{g(x)} dx =$$

$$\int_A g(x) f_1(x) dx = \int_A g(x) dP_X(x)$$

$$\Rightarrow g(x) = P(B|X = x)$$

$$P(X \in A, Y \in B) = \int_A \int_B f(x, y) dx dy = \int_A \int_B f(y|x) f_1(x) dy dx = \int_B \int_A f(x|y) f_2(y) dx dy$$



# Referências Bibliográficas

- Albert, J. (2009). *Bayesian computation with R*. Springer.
- Ash, R. B. and Doleans-Dade, C. (2000). *Probability and Measure Theory*. Academic Press, California.
- Billingsley, P. (1986). *Probability and Measure*. Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics. John Wiley & Sons, Inc., New York, second edition.
- DeGroot, M. H. (1970). *Optimal Statistical Decisions*. MacGraw-Hill, New York.
- Schervish, M. J. (2012). *Theory of Statistics*. Springer Science & Business Media.
- Shiryaev, A. N. (1996). *Probability*, volume 95 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, second edition.