

高数选填做题技巧

主讲人 夜雨

以主流模拟卷的核心题为载体，给高数小题做一个做题技巧的总结，相信大家看完一定收获满满！

反常积分的判断

1) 一般情况，将被积函数等价成 p 积分 ($\frac{1}{(x-a)^p}$ 或 $\frac{1}{x^p}$)

2) 对于带 $\ln x$ 的积分，将被积函数等价成等价成 $\frac{1}{x^p \ln^q x}$

当 $p \neq 1$ 时， $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ 与 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^p} dx$ 同敛散， $\int_{\frac{3}{2}}^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ 与 $\int_{\frac{3}{2}}^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 同敛散

也就是说 $\ln^q x$ 不影响敛散性，可忽略！

当 $p=1$ 时， $\frac{1}{x \ln^q x} dx = \frac{1}{\ln^q x} d \ln x = \begin{cases} \ln \ln x, q=1 \\ \frac{\ln^{1-q} x}{1-q}, q \neq 1 \end{cases}$ (直接可以积出来)

3) 对于带 e^x 的积分，一般加绝对值放缩成 x^α

$x \rightarrow +\infty$ 时， $e^x \gg x^\alpha$

4) 带 $\sin x$, $\cos x (x \rightarrow +\infty)$ ，一般加绝对值放缩成 1

注：瑕点的定义是“无穷间断点”，间断点不一定是瑕点，比如 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 无瑕点，必收敛

汤八卷一

7. 下列反常积分发散的是().

A. $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x(1-x)}} dx$

B. $\int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{1+x|x|} dx$

C. $\int_0^1 \ln^2 x dx$

D. $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{\sqrt{x^3-x}} dx$

汤八卷八

3. 下列反常积分发散的是().

A. $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \ln x}{1+x^2} dx$

B. $\int_0^{+\infty} \frac{x^2 e^{-x^2}}{x+1} dx$

C. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}(1+2x)} dx$

D. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+x}}$

张八卷三

3. 设常数 $m > 0, n > 0$, 则 $\int_0^n \sqrt{x} \left[\frac{m}{x} \right] dx$ ($[\cdot]$ 是取整符号) 的敛散性A. 仅与 m 有关.B. 仅与 n 有关.C. 与 m, n 均有关.D. 与 m, n 均无关.

李艳芳卷二

4 设 q 为非零常数, 若积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p} dx$ 收敛, 则必有()

- (A) $q > 0$. (B) $q < 0$. (C) $\frac{1}{2} < p < 2$. (D) $0 < p < \frac{1}{2}$.

变上限积分函数奇偶性判断

定义判断稍微费时间, 直接上技巧

偶函数 \times 偶函数 = 偶函数 ($+\times+=+$)

奇函数 \times 偶函数 = 奇函数 ($-\times+=-$)

奇函数 \times 奇函数 = 偶函数 ($-\times- = +$)

$$\int_0^x \text{奇} dt = \text{偶}$$

$$\int_0^x \text{偶} dt = \text{奇}$$

若干奇偶函数复合

若全部是奇函数, 则复合的结果是奇函数

若有一个是偶函数, 则复合的结果是偶函数

张八卷四

2. $f(x) = \int_0^{\sin x} |x| e^{t^2} dt (x \in \mathbf{R})$ 是

A. 有界函数.

B. 单调函数.

C. 周期函数.

D. 奇函数.

两式差的等价量求法

- 1) 若 $f/g \rightarrow 1$, $f - g = g\left(\frac{f}{g} - 1\right) \sim g \ln \frac{f}{g} = g(\ln f - \ln g)$ (f, g 带指数, 根号都可以利用此方法去掉)
- 2) 若 $f/g \rightarrow 1$, 设 $f \sim ax^n, g \sim bx^n$, 则 $f - g \sim (a - b)x^n$
- 3) 若 f, g 不同阶, 则高阶被低阶吸收, $f - g \sim -g$ 或 f

李艳芳卷二

1 设 $\alpha_1 = \sin \sqrt{x} - \sin(2\sqrt{x}), \alpha_2 = e^{\sqrt[3]{x}} - e^{\sqrt{x}}, \alpha_3 = \sqrt[3]{8+x} - \sqrt[3]{8-x}$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$. (C) $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$. (D) $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$.

张八卷五

2. $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^x \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \right]$ 在 $x = 1$ 处

- A. 左极限存在, 右极限不存在.
- B. 左极限不存在, 右极限存在.
- C. 左、右极限都存在, 但不相等.
- D. 连续.

变上限积分的等价无穷小

为什么你学得好, 因为你站在更高的位置

李六卷三

1. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\cos x - 1} = 1$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^{\sin^2 x} f(t) dt$ 与 ax^n 是等价无穷小, 则

- A. $a = -1, n = 5$. B. $a = 1, n = 5$. C. $a = -\frac{1}{6}, n = 6$. D. $a = \frac{1}{6}, n = 6$.

张八卷五

1. 设 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x (e^{t \cos t^2} - e^t) dt$ 与 ax^b 是等价无穷小量, 则 $(a, b) =$

- A. $(-\frac{1}{6}, 3)$. B. $(-\frac{1}{24}, 4)$.
C. $(-\frac{1}{2}, 5)$. D. $(-\frac{1}{12}, 6)$.

渐近线的快速求法

给定曲线 $y = f(x)$

斜渐近线和水平渐近线求法: 若 $f(x)$ 可以表示为 $ax + b + o(1) (x \rightarrow \infty)$, 则 $y = ax + b$ 就是水平或斜渐近线

竖直渐近线求法: 找 $f(x)$ 的无穷间断点 (从无定义的点找)

李六卷一

1. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{1+ax^3} + x) = 0$, 则曲线 $y = \sqrt[3]{1+ax^3}$ 有斜渐近线为

- A. $y = x$. B. $y = -x$. C. $y = \frac{1}{3}x$. D. $y = -\frac{1}{3}x$.

超越卷一

(2) 曲线 $y = \ln |1 - e^{2x}|$ 有() 条渐近线.

- (A)0 (B)1 (C)2 (D)3

李六卷四

2. 曲线 $y = \sqrt{1+x^2} e^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线条数为

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

极限判断极值点, 拐点

已知 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = A (A \neq 0)$

1) 若点 a 不是 $g(x)$ 的极值点, 则点 a 也不是 $f(x)$ 的极值点

2) 若点 a 是 $g(x)$ 的极值点, 则点 a 也是 $f(x)$ 的极值点, 且 $A > 0$ 时, 结论相同, $A < 0$ 时, 结论相反

当 $A > 0$ 时, 若点 a 是 $g(x)$ 的极小 (大) 值点, 则点 a 是 $f(x)$ 的极小 (大) 值点

当 $A < 0$ 时, 若点 a 是 $g(x)$ 的极小 (大) 值点, 则点 a 是 $f(x)$ 的极大 (小) 值点

为什么你学得好, 因为你站在更高的位置

李四卷一

6. 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 则

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$ 存在.

B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$ 不存在.

C. $f'(0) = 0, f''(0) = 2$.

D. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

汤三卷二

7. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln^2 x}{f(x) - 2} = -1$, 则().

A. $f'(1) = 0$ 且 $x = 1$ 为极小值点

B. $f'(1) = 0$ 且 $x = 1$ 为极大值点

C. $f'(1)$ 不存在且 $x = 1$ 为极小值点

D. $f'(1)$ 不存在且 $x = 1$ 为极大值点

李六卷二

4. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[f(x+1) + e^{x^2}]}{x^2} = 2$, 则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的
- A. 驻点且为极大值点. B. 驻点且为极小值点.
C. 不可导点. D. 可导点但不是驻点.

余五卷一

1. 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内三阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{(x-1)^2 \ln x} = \frac{1}{3}$, 则().
- A. $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点 B. 点 $(1, 2)$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点
C. $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极小值点 D. 点 $(1, 2)$ 不为曲线 $y=f(x)$ 的拐点

余五卷四

2. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数, $f(0)=0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f'(x)}{x} = 2$, 则().
- A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值 B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点 D. 以上都不正确

极值点、拐点的判断除了根据“一阶、二阶两侧是否异号”，还可以根据第三充分条件
核心就是要看到几阶导数不为零！

极值的第三充分条件

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 $n (n \geq 2)$ 阶可导，且 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ ， $f^{(n)}(x_0) \neq 0$

若 n 是偶数，则 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点

若 n 是奇数，则 $x = x_0$ 不是 $f(x)$ 的极值点（无需记忆）

拐点的第三充分条件

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 $n (n \geq 3)$ 阶可导，且 $f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ ， $f^{(n)}(x_0) \neq 0$

若 n 是奇数，则点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

若 n 是偶数，则点 $(x_0, f(x_0))$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点（无需记忆）

汤八卷七

2. 设函数 $f(x)$ 连续二阶可导，且 $f(0) = 2$ ，又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2f'(x) - 2}{\ln(1+x) - x^2} = 2$ ，则（ ）.
- A. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取极大值 2 B. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取极小值 2
- C. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不取极值 D. $(0, 2)$ 为 $y = f(x)$ 的拐点

极值点、拐点、驻点个数判断

设 $f(x)$ 是多项式函数, 若 a 是 $f(x)$ 的 k 重根, 则 a 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根 (k 是正整数)

李六卷二

12. 函数 $f(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的驻点个数为_____.

增加问题求极值点个数, 拐点个数

最值计算

小题用拉乘有时比较浪费时间, 可借助参数方程或柯西不等式快速得到答案

张八卷一

4. 函数 $f(x, y) = x + 4y$ 在条件 $\frac{x^2}{2} - x + y^2 = 1$ 下的最大值是

A. $2 + 2\sqrt{2}$.

B. $1 + 3\sqrt{2}$.

C. $2 + 2\sqrt{3}$.

D. $1 + 3\sqrt{3}$.

积分比大小

- 1) 积分区域一致, 直接比较被积函数的大小
- 2) 积分区域不一致, 先化成一致, 再比较被积函数的大小
- 3) 积分区域具有包含关系, 可以考虑作差法
- 4) 积分区域一致, 被积函数无法比较大小, 可以考虑作差法

李艳芳卷三

3 设 $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x} dx$, $J = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$, $K = \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{e^x} dx$, 则()

(A) $I > J > K$. (B) $J > I > K$. (C) $I > K > J$. (D) $J > K > I$.

余五卷一

7. 设 $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}}, 0 \leq y \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}} \right\}$,

$I_1 = \iint_D \sin(\max\{x^2, y^2\}) dx dy$, $I_2 = \iint_D \sin(\min\{x^2, y^2\}) dx dy$,

$I_3 = \frac{1}{2} \iint_D (\sin x^2 + \sin y^2) dx dy$,

则有().

A. $I_1 = I_2 = I_3$

B. $I_1 = I_3 > I_2$

C. $I_1 > I_2 = I_3$

D. $I_1 > I_3 > I_2$

超越卷一

(4) 设 $M = \int_0^1 e^x dx$, $N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x} dx$, $P = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{\tan x} dx$, 则()

- (A) $P < M < N$ (B) $P < N < M$ (C) $M < P < N$ (D) $N < P < M$

李六卷一

6. 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^\alpha} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^\alpha} dx$ ($\alpha > 0$), 则

A. $I_1 < I_2$.

B. $I_1 > I_2$.

C. $I_1 = I_2$.

D. I_1, I_2 的大小与 α 有关.

李六卷六

5. 设 $I_k = \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} e^{-x^2} \cos^2 x dx$ ($k = 1, 2, 3, 4$), 则 $\max_{1 \leq k \leq 4} \{I_k\} =$

A. I_1 .

B. I_2 .

C. I_3 .

D. I_4 .

超越卷二

(6) 设 $I_k = \iint_{D_k} (xy^2 e^{-x^2} + x^2 \sin(x^2 + y^2)) d\sigma, k = 1, 2, 3$, 其中

$D_1: x^2 + y^2 \leq \frac{\pi}{2}, D_2: x^2 + y^2 \leq \pi, D_3: x^2 + y^2 \leq 2\pi$, 则 I_1, I_2, I_3 三者的大小关系为().

(A) $I_1 \leq I_2 \leq I_3$ (B) $I_3 \leq I_2 \leq I_1$ (C) $I_1 \leq I_3 \leq I_2$ (D) $I_3 \leq I_1 \leq I_2$

线性微分方程解的叠加原理

y_1^* 是 $y' + q(x)y = f_1(x)$ 的解, y_2^* 是 $y' + q(x)y = f_2(x)$ 的解

则 $ay_1^* + by_2^*$ 是 $y' + q(x)y = af_1(x) + bf_2(x)$ 的解 (可推广到任意阶情形)

由此可以得到

- 1) 非齐次解 + 齐次解 = 非齐次解
- 2) 非齐次解 - 非齐次解 = 齐次解
- 3) 齐次解 + 齐次解 = 齐次解

若 y_1, y_2 及 $ay_1 + by_2$ 是 $y' + p(x)y = q(x)$ 的解, $ay_1 - by_2$ 是 $y' + p(x)y = 0$ 的解, 求 a, b

李艳芳卷三

(5) 设函数 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 分别为一阶非齐次线性微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的三个不同的解, 已知 $y_1(0) = a, y_2(0) = b, y_3(0) = c$, 则下列说法中, 正确的是()

- (A) $\frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)}$ 是否为常数与 $p(x), q(x)$ 有关.
- (B) $\frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)}$ 是否为常数与 a, b, c 的取值有关.
- (C) 若 $a < b < c$, 则 $\frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)}$ 必为大于 0 的常数.
- (D) 若 $a < b < c$, 则 $\frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)}$ 必为小于 0 的常数.

求参数范围（参数分离）

李六卷三

1. 若方程 $\ln x = ax (a > 0)$ 有且只有 2 个实根, 则

A. $0 < a < \frac{1}{e}$.

B. $a = \frac{1}{e}$.

C. $\frac{1}{e} < a < 1$.

D. $a > 1$.

汤八卷四

3. 设 $\ln x = ax^2$ 有且仅有两个实根, 则().

A. $a < 0$

B. $0 < a < \frac{1}{2e}$

C. $a = \frac{1}{2e}$

D. $a > \frac{1}{2e}$

李六卷三

4. 设常数 $a > 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $\ln x \leq x^a$, 则 a 的取值范围为

- A. $(0, e]$. B. $(0, \frac{1}{e})$. C. $[e, +\infty)$. D. $[\frac{1}{e}, +\infty)$.

幂级数的收敛半径

设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$ 条件收敛, 则收敛半径为 $|q|$

张八卷六

2. 设常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, r 是实数, 则

- A. 当 $|r| \geq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} r^{2n-1}$ 发散.
- B. 当 $|r| \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散.
- C. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} r^{2n-1}$ 发散时, $|r| \geq 1$.
- D. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时, $|r| \leq 1$.

李六卷六

4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n (x+1)^n$ 的收敛区间为
- A. $(-3, 1)$. B. $(-4, 2)$. C. $(-2, 0)$. D. $(0, 2)$.