

24线代期中答案

制作人：学术讨论群全体成员



撰写者：Jaccck 混子 天赐 卡基米 寒金 Yasumi 潜伏 speculator 黄鹂 离谱 老汉 饭饭 牧博

对此试卷的点评 (by:潜伏): 这张卷子相比前两年难度有较大的提升, 难点在证明题, 同时考验了解题思维和计算能力。考完之后也是哀鸿遍野: 这张卷秩考的少, 是弱秩卷 😓 不过只要知识点牢固, 熟悉一些做题技巧, 拥有一点数学思维, 还是可以拿到高分的。

以下每道题的tips都来自本人的在考场上的做法和本人的知识点总结。

填空题

1. 0

💡 $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$

$$r(A^*) = \begin{cases} n & r(A) = n \\ 1 & r(A) = n - 1 \\ 0 & r(A) \leq n - 2 \end{cases}$$

根据以上两个公式解题即可

2.

$$(n+1)^{(n-1)^2}$$

💡 知识点:

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

3. 24

4.

$$|A|^{n-2} a_{nn}$$

5.

$$11x - 14y - 13z + 3 = 0$$

选择题

1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.C



线性方程组的解的充要条件: $B^T X = 0$ 等价于 $R(B^T) < n$

3.C



易错点: 次数为偶数, 所以 $\det(A)$ 不一定等于 $\det(B)$;

知识点: 任何可逆的矩阵均可以表示成E进行一系列初等行列变换的样式

4.A



克拉默法则, 其次就是注意或和且

5.C

解答题

三.

直线 L_1 的方向向量

$$\vec{s}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (0, 3, 3),$$

直线 L_2 的方向向量 $\vec{s}_2 = (-2, 1, 0)$.

$$\vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 3 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-3, -6, 6).$$

在 L_1 上取一点 $A(0, 0, 1)$, L_2 上取一点 $B(0, 0, -2)$, $\overrightarrow{AB} = (0, 0, -3)$ 则 L_1 与 L_2 之间的距离

$$d = \left| \overrightarrow{AB} \cdot \frac{\vec{s}_1 \times \vec{s}_2}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|} \right| = 2.$$



知识点: 异面直线的距离

第一步: 先对两条直线做叉乘得到 \vec{n}

第二步: 在两条直线分别找一点得到 \vec{m}

第三步: 用公式: $d = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}|}$

四.

(1)

$$\therefore (A \ B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (E \ A^{-1}B),$$

$$\therefore C = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$\therefore C^T C = 30,$$

$$\therefore (CC^T)^3 = 900CC^T.$$

$$\therefore |-E + (CC^T)^3| = \begin{vmatrix} -E + 900CC^T & 0 \\ C^T & 1 \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{\substack{r_1 - 900Cr_2 \\ C^T}}{=} \begin{vmatrix} -E & -900C \\ C^T & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\substack{r_2 + C^T r_1}}{=} \begin{vmatrix} -E & -900C \\ 0 & 1 - 900C^T C \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^4 (1 - 900C^T C) = -26999.$$



第一问:就是写出 (A, B) 的增广矩阵即可, 然后暴力变换, 最后不放心可以乘上A进行验算

第二问: 降阶公式(重要考点)每年必考

五.

五、解析

(1)证明:

$$\therefore \alpha^T A \alpha = (\alpha^T A \alpha)^T = \alpha^T A^T \alpha = -\alpha^T A \alpha,$$

$$\therefore \alpha^T A \alpha = 0.$$

$$\text{又 } (A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = (-A)^{-1} = -A^{-1},$$

则 A^{-1} 也为反对称矩阵.

$$\text{同上可得 } \alpha^T A^{-1} \alpha = 0.$$

$$\therefore \alpha^T A \alpha = \alpha^T A^{-1} \alpha = 0.$$

(2)

$$\therefore M = \begin{vmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{vmatrix} \stackrel{r_2 - \alpha^T A^{-1} r_1}{=} \begin{vmatrix} A & \alpha \\ 0 & b - \alpha^T A^{-1} \alpha \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \alpha \\ 0 & b \end{vmatrix} = b|A| \neq 0,$$

$\therefore M$ 可逆.

$$\therefore (M \ E_{n+1}) = \begin{pmatrix} A & \alpha & E_n & 0 \\ \alpha^T & b & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 - \alpha^T A^{-1} r_1} \begin{pmatrix} A & \alpha & E_n & 0 \\ 0 & b & -\alpha^T A^{-1} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 - \frac{1}{b} \alpha r_2} \begin{pmatrix} A & 0 & E_n + \frac{\alpha \alpha^T A^{-1}}{b} & -\frac{1}{b} \alpha \\ 0 & b & -\alpha^T A^{-1} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{b} r_2} \begin{pmatrix} E_n & 0 & A^{-1} + \frac{A^{-1} \alpha \alpha^T A^{-1}}{b} & -\frac{1}{b} A^{-1} \alpha \\ 0 & 1 & -\frac{1}{b} \alpha^T A^{-1} & \frac{1}{b} \end{pmatrix} = (E_{n+1} \ M^{-1}),$$

$$\therefore M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} + \frac{A^{-1} \alpha \alpha^T A^{-1}}{b} & -\frac{1}{b} A^{-1} \alpha \\ -\frac{1}{b} \alpha^T A^{-1} & \frac{1}{b} \end{pmatrix}$$

$$\therefore X = M^{-1} e_{n+1} = \begin{pmatrix} A^{-1} + \frac{A^{-1} \alpha \alpha^T A^{-1}}{b} & -\frac{1}{b} A^{-1} \alpha \\ -\frac{1}{b} \alpha^T A^{-1} & \frac{1}{b} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0_{n \times 1} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{b} A^{-1} \alpha \\ \frac{1}{b} \end{pmatrix}.$$



本题的要点在于注意到 $\alpha^T A \alpha$ 为一个数, 用取转置的公式再使用题目条件即可

第三问其实考的是分块矩阵初等变换, 可逆和求X均可以使用. 本答案的编写者是选择先求 M^{-1} , 不过其实可以直接把 e_{n+1} 放到右边形成增广矩阵, 再进行初等行变换即可

六.

(1) 设 $\alpha = (1, 1, \dots, 1)^T$. 如果 $a = 0$, 那么 $A\alpha = 0$.

这方程组存在非零解, 因此 $|A| = 0$. 这与 A 可逆矛盾, 因此必有 $a \neq 0$.

(2) 在等式 $A\alpha = a\alpha$ 两边左乘 A^{-1} 得 $\alpha = aA^{-1}\alpha$, 则 $\frac{1}{a}\alpha = A^{-1}\alpha$, 这说明 A^{-1} 每行元素和为 $\frac{1}{a}$.



第一问: 善用反证法

第二问: 这个算是一个技巧性的东西



关于最后一题笔者还有一个做法:

对于第 i 行, 设和为 $S = \frac{A_{1i} + \dots + A_{ni}}{|A|}$ (逆矩阵与伴随矩阵的关系)

$$|A|S = \begin{pmatrix} a_{11} \dots a_{1i-1} & 1 & a_{1i+1} \dots a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} \dots a_{ni-1} & 1 & a_{ni+1} \dots a_{nn} \end{pmatrix}$$

将其他列的项统统加到第 i 列我们不难注意到式子会变成:

$$\begin{pmatrix} a_{11} \dots a_{1i-1} & (a+1) - a_{1i} & a_{1i+1} \dots a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} \dots a_{ni-1} & (a+1) - a_{ni} & a_{ni+1} \dots a_{nn} \end{pmatrix}$$

拆开之后我们发现 $|A|S = (a+1)|A|S - |A|$, 最后解得和为 $\frac{1}{a}$

对于这个做法, 只有一句话: **attention is all you need!** 😊