

## 第十届清疏竞赛班非数学类 29

具体级数敛散判断

重要模型(记忆, 直接做很难做出来):

设正数列  $a_n$  递减到 0, 证明:  $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) < \infty \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ .

证明:

若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ , 回忆经典结论:  $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$ .

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k(a_k - a_{k+1}) &= \sum_{k=1}^n (ka_k - (k+1)a_{k+1}) + \sum_{k=1}^n ((k+1)a_{k+1} - ka_{k+1}) \\ &= a_1 - (n+1)a_{n+1} + \sum_{k=1}^n a_{k+1} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} a_k - (n+1)a_{n+1} \end{aligned}$$

因此两边令  $n \rightarrow \infty$ , 就有  $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .

假设  $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) < \infty$ , 仍然有:  $\sum_{k=1}^n k(a_k - a_{k+1}) = \sum_{k=1}^{n+1} a_k - (n+1)a_{n+1}$

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^m a_k + \sum_{k=m+1}^n a_k \geq \sum_{k=1}^m a_k + \sum_{k=m+1}^n a_n = \sum_{k=1}^m a_k + (n-m)a_n, \forall n \geq m.$$

因此  $\sum_{k=1}^m a_k \leq \sum_{k=1}^n a_k - na_n + ma_n, \forall n \geq m$ .

现在令  $n \rightarrow \infty, \sum_{k=1}^m a_k \leq \sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}), \forall m \geq 1$ .

因此  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  收敛, 此时回到另一边的情况就知道

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

运用：第十三届补赛压轴题：

设  $a_n$  递减到 0 且  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ , 若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散, 证明积分  $\int_1^{\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx$  也发散.

证明：

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 0$ , 所以  $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ , 当  $x > 0$ ,  $f(x) > 0$  且  $f'(x) > 0$ .

待定递增且趋于  $+\infty$  的正数列  $b_n$

$$\begin{aligned} \int_{b_1}^{\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(b_n)}{x^2} dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \ln f(b_n) \left[ \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right] \geq \sum_{n=1}^{\infty} \ln(a_n b_n^n) \left[ \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n \ln(a_n b_n) \left[ \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right] \end{aligned}$$

取  $b_n = \frac{c}{a_n}$ ,  $c > 1$ , 此时  $b_n$  递增到无穷且

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n \ln(a_n b_n) \left[ \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right] &= \ln c \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n \left[ \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right] = \ln c \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n} \\ &= c \ln c \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 发散.} \end{aligned}$$

因此  $\int_1^{\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx$  也发散.

正项级数判别的本质仍然是估阶：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(e^n + n^2)}{\sqrt[4]{n^8 + n^2 + 1} \cdot \ln^2(n+1)}, \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln^2 k}{n^p}$$

证明：

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(e^n + n^2)}{\sqrt[4]{n^8 + n^2 + 1} \cdot \ln^2(n+1)} &\sim \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln e^n}{n^2 \cdot \ln^2 n} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n} \quad \text{积分判别, 默认都会了} \sim \int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{1}{y^2} dy \text{收敛} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln^2 k}{n^p} \quad \text{和化积分, 常用方法} \sim \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\int_2^n \ln^2 x dx}{n^p} \quad \text{算出值再等价} \sim \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n \ln^2 n}{n^p}$$

或者

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln^2 k}{n \ln^2 n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n \ln^2 n - (n-1) \ln^2(n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{\ln^2 n + 2 \ln n} = 1$$

$$\text{即} \sum_{k=1}^n \ln^2 k \sim n \ln^2 n.$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n \ln^2 n}{n^p} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln^2 n}{n^{p-1}}, \text{当 } p > 2 \text{ 收敛, 当 } p \leq 2 \text{ 发散.}$$

带对数的一个小技巧：都是换底

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{r^{\ln n}} (r > 0), \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^{\ln n} n}, \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}}, \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{r^{\ln n}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{e^{\ln n \cdot \ln r}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln r}}, \text{故 } r > e \text{ 级数收敛, } r \leq e \text{ 级数发散}$$

$$\sum_{n=\text{非常大}}^{\infty} \frac{1}{\ln^{\ln n} n} = \sum_{n=\text{非常大}}^{\infty} \frac{1}{e^{\ln n \cdot \ln \ln n}} = \sum_{n=\text{非常大}}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln \ln n}} \leq \sum_{n=\text{非常大}}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{收敛.}$$

$$\sum_{n=\text{非常大}}^{\infty} \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}} = \sum_{n=\text{非常大}}^{\infty} \frac{1}{e^{\ln n \cdot \ln \ln \ln n}} = \sum_{n=\text{非常大}}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln \ln \ln n}} \leq \sum_{n=\text{非常大}}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{收敛.}$$

$$\sum_{n=\text{非常大}}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}} = \sum_{n=\text{非常大}}^{\infty} \frac{1}{n e^{(\ln \ln n)^2 - \ln n}} \sim \int_{\text{非常大}}^{\infty} \frac{1}{x e^{(\ln x)^2 - \ln x}} dx$$

$$= \int_{\text{非常大}}^{\infty} \frac{1}{e^{\ln^2 y - y}} dy = \int_{\text{非常大}}^{\infty} e^{y - \ln^2 y} dy \text{发散.}$$

设  $m \in \mathbb{N}$ , 判断下列级数收敛性:

$$\sum (-1)^j \ln \left[ \left( 1 + \frac{1}{j} \right)^m - \frac{1}{j^m} \right]$$

$$\text{当 } 1 - \frac{1}{m} < \alpha < 1, \sum (-1)^j \left[ \left( (j+1)^m - 1 \right)^{1-\alpha} - j^{m(1-\alpha)} \right].$$

判断收敛性  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(-1)^{n-1} + \sqrt[3]{n}}$  收敛性.

证明:

$$\sum (-1)^j \ln \left[ \left( 1 + \frac{1}{j} \right)^m - \frac{1}{j^m} \right] = \sum (-1)^j \ln \left[ 1 + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{C_m^k}{j^k} \right] \text{收敛}$$

$$\text{对于 } \sum (-1)^j \left[ \left( (j+1)^m - 1 \right)^{1-\alpha} - j^{m(1-\alpha)} \right],$$

$$\left( (j+1)^m - 1 \right)^{1-\alpha} - j^{m(1-\alpha)} \text{不太好判断单调性.}$$

直接对  $\left( (j+1)^m - 1 \right)^{1-\alpha} - j^{m(1-\alpha)}$  渐进 (初等函数即直接 *taylor* ).

$$\left( (j+1)^m - 1 \right)^{1-\alpha} - j^{m(1-\alpha)} = j^{m(1-\alpha)} \left[ \left( \left( 1 + \frac{1}{j} \right)^m - \frac{1}{j^m} \right)^{1-\alpha} - 1 \right]$$

$$= j^{m(1-\alpha)} \left[ \left( 1 + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{C_m^k}{j^k} \right)^{1-\alpha} - 1 \right]$$

$$= j^{m(1-\alpha)} \left[ (1-\alpha) \sum_{k=1}^{m-1} \frac{C_m^k}{j^k} + O \left( \left( \sum_{k=1}^{m-1} \frac{C_m^k}{j^k} \right)^2 \right) \right]$$

$$= j^{m(1-\alpha)} \left[ \frac{(1-\alpha)m}{j} + O \left( \frac{1}{j^2} \right) \right]$$

这里用到了  $(1+x)^{1-\alpha} = 1 + (1-\alpha)x + O(x^2)$

因为  $1 > m(1-\alpha) > 0$ , 所以  $\sum (-1)^j O \left( \frac{1}{j^{2-m(1-\alpha)}} \right) < \infty$ .

由交错级数判别法, 故  $\sum (-1)^j \frac{(1-\alpha)m}{j^{1-m(1-\alpha)}} < \infty$ .

判断收敛性  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(-1)^{n-1} + \sqrt[3]{n}}$  收敛性.

证明:

如果利用  $\frac{x}{1-x} = x + x^2 + O(x^3)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(-1)^{n-1} + \sqrt[3]{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}}{1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}} + \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}} + O\left(\frac{1}{n}\right) \right)$$

显然  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$  收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$  发散,  $\sum_{n=1}^{\infty} O\left(\frac{1}{n}\right)$  无法判断.

所以和积分一样, 适用 *taylor* 方法要保证余项部分级数绝对收敛!!!

利用  $\frac{x}{1-x} = x + x^2 + x^3 + O(x^4)$

$$\text{那么 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(-1)^{n-1} + \sqrt[3]{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}}{1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}} + \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}} + \frac{(-1)^n}{n} + O\left(\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}\right) \right)$$

故收敛 + 发散 + 收敛 + 收敛 = 发散, 因此原级数发散.

和积分一样有小结论:

绝对+绝对=绝对

绝对+条件=条件

条件+条件=无法判断.

判断级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{(-1)^n}{(-1)^{n-1} + \sqrt[3]{n}} - \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}} \right)$  收敛性

事实上:  $\frac{(-1)^n}{(-1)^{n-1} + \sqrt[3]{n}} - \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( (-1)^n \left( \frac{1}{\sqrt[3]{n}} + \frac{1}{n} \right) + O\left(\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}\right) \right)$

条件 + 绝对, 因此原级数条件收敛.

注意余项部分一定要保证绝对收敛, 没有条件收敛一说.

作业：若  $a \in (0, 1]$ , 求  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(\ln n)}{n^a} x^n$  收敛域

判断:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)} \text{收敛性, } a, b > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( 1 - \frac{\frac{a(a+1)\cdots(a+n)}{b(b+1)\cdots(b+n)}}{\frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( 1 - \frac{a+n}{b+n} \right) = b - a$$

由 *Raabe* 判别法知,  $b - a > 1$  收敛,  $b - a < 1$  发散.

$$\text{当 } b = a + 1, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)}$$

$$\text{此时 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{(a+1)\cdots(a+n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{a+n} \text{ 发散.}$$

$$\text{或者 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ n \ln \frac{b+n}{a+n} - 1 \right] \ln n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ -a + b - 1 + O\left(\frac{1}{n}\right) \right] \ln n = 0.$$

故级数发散.

$$\alpha > 0, \text{ 讨论 } \sum_{n=2}^{\infty} \left[ \left(2 - \sqrt[n]{e}\right) \left(2 - e^{\frac{1}{3}}\right) \cdots \left(2 - \sqrt[n]{e}\right) \right]^{\alpha}$$

利用  $e^x \geq 1 + x$

$$\prod_{k=2}^n \left(2 - e^{\frac{1}{k}}\right) \leq \prod_{k=2}^n \left(2 - \frac{1}{k} - 1\right) = \prod_{k=2}^n \left(\frac{k-1}{k}\right) = \frac{1}{n}$$

$$e^{\frac{1}{k}} \leq 1 + \frac{1}{k-1} \Leftrightarrow e^x \leq 1 + \frac{x}{1-x}, x \in (0, 1)$$

$\Leftrightarrow (1-x)e^x \leq 1, x \in (0, 1)$ , 这可以通过求导证明

$$\prod_{k=3}^n \left(2 - e^{\frac{1}{k}}\right) \geq \prod_{k=3}^n \left(2 - 1 - \frac{1}{k-1}\right) = \prod_{k=3}^n \left(\frac{k-2}{k-1}\right) = \frac{1}{n-1}$$

$$\prod_{k=2}^n \left(2 - e^{\frac{1}{k}}\right) \text{ 同阶于 } \frac{1}{n}.$$

$$\text{因此 } \sum_{n=2}^{\infty} \left[ \left(2 - \sqrt[n]{e}\right) \left(2 - e^{\frac{1}{3}}\right) \cdots \left(2 - \sqrt[n]{e}\right) \right]^{\alpha} \text{ 同阶于 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

$\alpha > 1$  收敛,  $\alpha \leq 1$  发散.

$\alpha \in \mathbb{N}, \beta \geq 0$ , 证明  $\sum_{n=2}^{\infty} n^{\beta} (\cos 1 \cos 2 \cdots \cos n)^{\alpha}$  绝对收敛

证明:

$$\begin{aligned} |\cos 1 \cos 2 \cdots \cos n|^2 &\leq \left( \frac{\sum_{k=1}^n \cos^2 k}{n} \right)^n = \left( \frac{\sum_{k=1}^n (1 + \cos(2k))}{2n} \right)^n \\ &= \left( \frac{n + \sum_{k=1}^n \cos(2k)}{2n} \right)^n = \left( \frac{1}{2} + \frac{\sin n \cos(n+1)}{n \sin 1} \right)^n \end{aligned}$$

因此当  $n$  充分大, 我们知道  $\frac{1}{2} + \frac{\sin n \cos(n+1)}{n \sin 1} < \frac{2}{3}$ , 因此

$$|\cos 1 \cos 2 \cdots \cos n| \leq \left( \frac{2}{3} \right)^{\frac{n}{2}}, \text{ 因此}$$

$$\sum_{n=\text{充分大}}^{\infty} n^{\beta} |\cos 1 \cos 2 \cdots \cos n|^{\alpha} \leq \sum_{n=\text{充分大}}^{\infty} n^{\beta} \left( \frac{2}{3} \right)^{\frac{n}{2}\alpha} < \infty.$$

因此原级数绝对收敛.

作业:  $\sum_{n=2}^{\infty} n^{\beta} (\sin 1 \sin 2 \cdots \sin n)^{\alpha}$  绝对收敛.

判断:  $\sum_{n=2}^{\infty} \cos 1 \cdot \cos^2 2 \cdots \cos^n n,$

$$\sum_{n=2}^{\infty} |\cos 1 \cdot \cos^2 2 \cdots \cos^n n| \leq \sum_{n=2}^{\infty} |\cos 1 \cdot \cos 2 \cdots \cos n| < \infty,$$

因此绝对收敛.



作业:  $\sum_{n=2}^{\infty} \sin 1 \sin^2 2 \cdots \sin^n n$

判断收敛性:  $\sum_{n=1}^{\infty} x^{\sin 1 + \sin \frac{1}{2} + \cdots + \sin \frac{1}{n}}, x \in (0, 1)$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( 1 - \frac{x^{\sin 1 + \sin \frac{1}{2} + \cdots + \sin \frac{1}{n+1}}}{x^{\sin 1 + \sin \frac{1}{2} + \cdots + \sin \frac{1}{n}}} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( 1 - x^{\sin \frac{1}{n+1}} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( 1 - e^{\sin \frac{1}{n+1} \cdot \ln x} \right)$$

$$= - \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \sin \frac{1}{n+1} \cdot \ln x$$

$$= \ln \frac{1}{x}.$$

因此  $x < \frac{1}{e}$  收敛,  $x > \frac{1}{e}$  发散.

当  $x = \frac{1}{e}$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ n \ln \frac{x^{\sin 1 + \sin \frac{1}{2} + \cdots + \sin \frac{1}{n}}}{x^{\sin 1 + \sin \frac{1}{2} + \cdots + \sin \frac{1}{n+1}}} - 1 \right] \ln n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ n \ln \frac{1}{x^{\sin \frac{1}{n+1}}} - 1 \right] \ln n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ -n \sin \frac{1}{n+1} \cdot \ln x - 1 \right] \ln n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ n \sin \frac{1}{n+1} - 1 \right] \ln n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} O\left(\frac{1}{n}\right) \ln n = 0$$

因此  $x = \frac{1}{e}$  发散.

检查下述判别法合理性(可跳过):

$$\left[ n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right] \ln n = G$$

$$\ln a_n - \ln a_{n+1} = \frac{G}{n \ln n} + \frac{1}{n}$$

$$\ln a_2 - \ln a_{n+1} \sim \int_2^n \left( \frac{G}{x \ln x} + \frac{1}{x} \right) dx = G \ln \ln n + \ln n + c$$

$$\ln a_{n+1} \sim -G \ln \ln n - \ln n + c$$

$$a_{n+1} \sim \frac{c}{n \ln^G n}, \text{ 所以判别法是对的.}$$