

第十届清疏竞赛班非数学类 7:

连续函数的处理

为了不再重复经典的结果,我们将第九届非数学类 6 纳入自己学习的正课,视频和 pdf 都可以在 cctalk 找到,内容主要由连续单射等价严格单调以及 cauchy 方程的处理手法.

重要的简单结论:

(Darboux中值定理) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, 则 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 具有介值性.

证明:

不妨设 $f'(b) \geq f'(a)$, 对 $s \in (f'(a), f'(b))$,

不妨设 $f'(a) < 0, f'(b) > 0, s = 0$

否则我们可以用 $f(x) - sx$ 去代替, 此时

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, f'(b) = \lim_{x \rightarrow b^+} \frac{f(x) - f(b)}{x - b}$$

由极限保号性, 我们知道存在 $\delta_1, \delta_2 > 0$

$$\forall x \in (a, a + \delta_1), \text{ 有 } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} < 0, \forall x \in (b - \delta_2, b), \text{ 有 } \frac{f(x) - f(b)}{x - b} < 0$$

$$\text{即 } \forall x \in (a, a + \delta_1), f(x) < f(a), \forall x \in (b - \delta_2, b), \text{ 有 } f(x) < f(b)$$

因此 $f(x)$ 的最小值点在 (a, b) 取得, 所以 $\exists x_0 \in (a, b), f'(x_0) = 0$.

导数极限定理:

设 $f(x) \in D(a, b] \cap C[a, b]$, 如果 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ 存在, 则 $f'(a)$ 存在, 且 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$

证明:

$$f'(\theta(x)) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, a < \theta(x) < x \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} \theta(x) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(\theta(x)) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \text{ 因此 } f \text{ 在 } x = a \text{ 可导且}$$

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x).$$

导函数无第一类间断点和无穷间断点, 单调函数无第二类间断点.

即 $f(x) \in D(a,b)$, 则 $f(x)$ 在 (a,b) 上没有第一类间断点和无穷间断点
证明:

设 $x_0 \in (a,b)$, 使得 x_0 是第一类间断点, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 存在

因此由导数极限定理, $f'(x_0)$ 存在, 并且 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$

因此 x_0 是 $f'(x)$ 连续点, 矛盾!

设 $x_0 \in (a,b)$, 使得 x_0 是无穷间断点, 不妨设 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = +\infty$,

那么 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(\theta(x)) = +\infty$, 矛盾!

因此完成了证明.

推论: 有第一类间断点和无穷间断点的函数没有原函数.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上没有第二类间断点.

注意:

函数版本的单调有界定理仍然成立, 并且可以无脑直接使用

证明: 不妨设 $f(x)$ 递增, 对任何 $x_0 \in [a,b]$, 有 $f(b) \geq f(x) \geq f(a)$

则 $f(x)$ 单调有界, 所以 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 存在, 因此

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上没有第二类间断点.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 取得最值且具有介值性, $p_i > 0, \sum_{i=1}^n p_i = 1$

则对 $x_i \in [a,b], i = 1, 2, \dots, m$, 存在 $y \in [a,b]$, 使得 $f(y) = \sum_{i=1}^m p_i f(x_i)$

证明:

设 $M = \max_{x \in [a,b]} f(x), m = \min_{x \in [a,b]} f(x)$, 则

$$m = \sum_{i=1}^m p_i m \leq \sum_{i=1}^m p_i f(x_i) \leq \sum_{i=1}^m p_i M = M, \text{ 因此}$$

$\sum_{i=1}^m p_i f(x_i)$ 是介于最小最大之间的一个数字, 由介值性, 我们知道

存在 $y \in [a,b]$, 使得 $f(y) = \sum_{i=1}^m p_i f(x_i)$

$f \in C[0,1], f(0) = f(1)$, 证明对任何 $n \in \mathbb{N}$, 都存在 $x_n \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$, 使得

$$f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{n}\right)$$

证明:

$$f_n(x) \triangleq f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x),$$

$$\sum_{k=1}^n f_n\left(\frac{k-1}{n}\right) = \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k-1}{n} + \frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{k-1}{n}\right) \right]$$

$$= \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k-1}{n}\right) \right] = f(1) - f(0) = 0$$

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f_n\left(\frac{k-1}{n}\right) = 0, \text{ 由刚才的基本结论,}$$

存在 $x_n \in (0,1)$, 使得 $f_n(x_n) = 0$,

$$\text{这恰好就是 } f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{n}\right).$$

$f \in C[0,1], f(0) = f(1) = 0$ 且 f 非负, 证明对 $a \in (0,1)$, 都存在 $\xi \in [0,1)$, 使得 $f(\xi) = f(a + \xi)$.

证明:

$$F(x) = f(a + x) - f(x),$$

$$F(0) = f(a), F(1-a) = -f(1-a), F(0)F(1-a) = -f(1-a)f(a) \leq 0$$

由零点定理存在 $\xi \in [0,1)$, 使得 $F(\xi) = 0$, 此时恰好就是 $f(\xi) = f(a + \xi)$.

函数方程的处理(先看第九届的Cauchy方程部分):

设 \mathbb{R} 上的函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续,且满足 $f(x+y)-f(x-y)=f(x)f(y)$
求 $f(x)$ 表达式.

证明:

令 $y=x, f(2x)-f(0)=f^2(x)$, 令 $x=0$, 知 $f(0)=0$

所以 $f^2(x)=f(2x)\geq 0 \Rightarrow f(x)$ 非负.

$$\text{则 } f(x)=f^2\left(\frac{x}{2}\right)=f^{2^2}\left(\frac{x}{2^2}\right)=\cdots=f^{2^n}\left(\frac{x}{2^n}\right)$$

$$\text{然后 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x)=\lim_{n \rightarrow \infty} f^{2^n}\left(\frac{x}{2^n}\right)=0 \Rightarrow f(x) \equiv 0$$

$f(x) \in C(\mathbb{R}), f(xy)=xf(y)+yf(x), x, y \in \mathbb{R}$, 求 $f(x)$

证明:

$$f(0)=xf(0), \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(0)=0$$

$$f(x)=xf(1)+f(x), \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(1)=0$$

$$f(1)=f(-1)-f(1) \Rightarrow f(-1)=0$$

$$f(-x)=xf(-1)-f(x)=-f(x), x \in \mathbb{R}$$

考虑 $x, y > 0, x=e^s, y=e^t, s, t \in \mathbb{R}$

$$\frac{f(e^{s+t})}{e^{s+t}} = \frac{f(e^s)}{e^s} + \frac{f(e^t)}{e^t},$$

$$\frac{f(e^x)}{e^x} \text{ 满足 Cauchy 方程, 所以 } \frac{f(e^x)}{e^x} = \frac{f(e)}{e}x,$$

$$f(x) = \begin{cases} f(e) \frac{x \ln x}{e}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ f(e) \frac{x \ln(-x)}{e}, & x < 0 \end{cases}.$$

设 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}, \forall x, y \in \mathbb{R}$, 如果 $f(x)$ 有下界, 证明 f 为常数

证明:

不妨设 $f(x) \geq 0$, 否则用 $f(x) - s$ 代替 $f(x)$ 即可.

$$\text{此时 } f\left(\frac{x}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(0)}{2} \Rightarrow f(x) \leq 2f\left(\frac{x}{2}\right) - f(0)$$

$$f(2x) \leq 2f(x) - f(0)$$

$$f(2^n x) \leq 2f(2^{n-1}x) - f(0)$$

$$\frac{f(2^n x)}{2^n} - \frac{f(2^{n-1}x)}{2^{n-1}} \leq -\frac{f(0)}{2^n}$$

$$\frac{f(2^n x)}{2^n} - f(x) \leq -\sum_{k=1}^n \frac{f(0)}{2^k} = f(0) \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} = -f(0) \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$$

$$f(2^n x) \leq 2^n f(x) - f(0)(2^n - 1) = f(0) + 2^n (f(x) - f(0))$$

若 $f(x) < f(0)$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(2^n x) = -\infty$, 矛盾!

因此 $f(x) \geq f(0), \forall x \in \mathbb{R}$

$$f(0) \geq \frac{f(x)+f(-x)}{2} \geq \frac{f(0)+f(0)}{2} = f(0)$$

上面并没有放缩, 因此 $f(x) = f(0), \forall x \in \mathbb{R}$.

$f \in C[0,1]$ 且 f 的值域 $[0,1]$, 以及 $f_n(x) = f(f_{n-1}(x)), f_1(x) = f(x)$

若存在 $n_0 \in \mathbb{N}, f_{n_0}(x) = x, x \in [0,1]$, 证明 $f(x) = x, \forall x \in [0,1]$

注意: 以后看到 $f(f)$, 就要联想单射和单调的关系

证明:

设 $f(x) = f(y), f(f(f(x))) = f(f(f(y))) \dots$

$\Rightarrow f_{n_0}(x) = f_{n_0}(y) \Rightarrow x = y \Rightarrow f$ 单射 $\Rightarrow f$ 严格单调.

不妨设 $f(x)$ 递增, 那么若 $f(x_0) > x_0$, 则

$f(f(f(x_0))) > f(f(x_0)) > f(x_0) > x_0 \dots$

因此类似的 $f_{n_0}(x_0) > x_0$, 矛盾!

$f(x_0) < x_0$, 同理即知矛盾!

故 $f(x_0) = x_0$.

经典结论：

(1)：若 $f \in C[a, b]$ ，且 f 值域是 $[a, b]$ 子集，则 f 在 $[a, b]$ 有不动点

(2)：若 $f \in C[a, b]$ 且 (a, b) 内， f 无极值点，则 f 在 $[a, b]$ 严格单调

证明：

(1)： $[f(a) - a][f(b) - b] \leq 0$ ，由零点定理即得(1)。

(2)：

若 f 在 (a, b) 内取最得在 $[a, b]$ 上的最值点 x_0 ，那么 x_0 是极值点，矛盾！

因此不妨设 $f(a) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$ ， $f(b) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$ ，下证明 $f(x)$ 严格递增

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 不严格递增，存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$ ，使得 $x_2 > x_1$ ， $f(x_1) \geq f(x_2)$ ，

注意我们不妨设 $x_1, x_2 \in (a, b)$ ，

至于他们属于端点的情况可以显然被排除，读者自证。

因此在 $[a, x_2]$ 上，因为 $f(x_1) \geq \max\{f(x_2), f(a)\}$ ，所以 (a, x_2) 内

f 取得 $[a, x_2]$ 上最大值，此时就是 f 的极大值点！矛盾！

因此 f 在 $[a, b]$ 严格单调，我们完成了证明。

$f(x) \in C(\mathbb{R})$, 满足 $\forall y \in \mathbb{R}$, 存在且只存在 n 个不同的数 $\{x_i\}_{i=1}^n$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = \cdots = f(x_n) = y$, 求 n 的值.

证明:

当 n 为奇数时,

我们可以令 $f(x) = (-1)^{\lfloor x \rfloor} \cos(n\pi x) - 2\lfloor x \rfloor, x \in \mathbb{R}$

有兴趣的同学可以自己验证满足条件.

重点掌握 n 为偶数时, 这样的 f 不存在.

设 $n = 2m$, 取 $y = 0$, 知 $f(x)$ 恰好存在 $2m$ 个零点

$x_1 < x_2 < \cdots < x_{2m}$, 记 $x_0 = -\infty, x_{2m+1} = +\infty$.

由 y 任意性我们知 f 值域也是 \mathbb{R} .

现在 f 在 $(x_{i-1}, x_i), i = 1, 2, \cdots, 2m+1$ 不变号.

由抽屉原理, 必有 $m+1$ 个区间, f 同号, 即在些区间里面不妨设 $f > 0$.

注意这 $m+1$ 个区间有 m 个区间不会到无穷.

(下面的步骤直接类似证明无极值必单调作图.)

取 m 个区间中最小的那个区间内的最大值 c ,

再取 $y \in (0, c)$, 由介值定理,

$f(x)$ 至少存在 $2m+1$ 个点, 使得 $f(x) = c$, 这是矛盾!

我们完成了证明.

$f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续有界, 则对任何 $T > 0$, 证明存在 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$,

使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n + T) - f(x_n)) = 0$

证明:

$f(x+T) - f(x)$ 有无穷多零点, 那取 x_n 为这一串零点即可.

因此设 $f(x+T) - f(x)$ 有有限多零点, 存在 $X > 0$, 使得

$f(x+T) - f(x)$ 没有零点, 因此不妨设 $f(x+T) - f(x) > 0, \forall x \geq X$

假设不存在 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n + T) - f(x_n)) = 0$,

即当 $x \rightarrow \infty$, $f(x+T) - f(x)$ 最小的子列极限都比0大, 即

$\exists \varepsilon_0 > 0, X' \geq X$, 使得 $\forall x \geq X'$, 都有 $f(x+T) - f(x) \geq \varepsilon_0$

此时 $f(x+nT) - f(x+(n-1)T) \geq \varepsilon_0, \forall x \geq X', n \in \mathbb{N}$

因此 $f(x+nT) - f(x) \geq n\varepsilon_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x+nT) = +\infty$,

这和 f 有界矛盾!

