



PIT staand order 30

## Hyperventilatie/paniekaanval



### Indicaties voor toepassing.

Patiënten met hyperventilatie ten gevolge van een paniekaanval. Hyperventilatie kan ook secundair op een onderliggende somatische aandoening voorkomen, heb hier aandacht voor.

### Contra-indicaties voor toepassing van het staand order.

Het staand order is **NIET** van toepassing op:

- ✓ Patiënten met een allergie of intolerantie voor geneesmiddelen die worden voorgesteld binnen dit staand order.
- ✓ Volwassen patiënten met respiratoire insufficiëntie → PIT staand order 14
- ✓ Pediatriche patiënten met respiratoire insufficiëntie → PIT staand order 15

### Algemene maatregelen.



#### ABCDE:

- ✓ Controle vitale parameters is vereist (bloeddruk en saturatie, ademhalingsfrequentie)
- ✓ 12-lead ECG zo nodig → doorsturen naar spoedgevallen-arts

#### AMVLOP

### Specifieke maatregelen.

#### ❶ Halfzittende of rechtzittende houding.

#### ❷ Dialoog om de patiënt tot rust te brengen:

- ✓ Zorg voor een rustige omgeving.
- ✓ Geruststellen en praten met het slachtoffer.

- ✓ Masker met zak of plastic zakje aanbieden en begeleiding om de ademhalingsfrequentie te normaliseren.

🕒 **Indien tetanie van de vingers → 1 mg temesta PO toedienen.**

### MUG-bijstand is aangewezen ingeval van:

- ✓ Somatische hyperventilatie met hemodynamische instabiliteit.

### Aandachtspunten.

- ❶ Zorg voor rust → verwijder overbodige omstaanders uit de onmiddellijke omgeving van de patiënt.