



PIT staand order 16

## Intoxicatie CO en verbrandingsgassen



### Indicaties voor toepassing.

Patiënten met tekens van een mogelijke CO-intoxicatie en/of die uit een brand geëvacueerd werd.

- ✓ Hoofdpijn.
- ✓ Misselijkheid/braken.
- ✓ Syncope.
- ✓ Agitatie. (wijst op mogelijke aanwezigheid van een cyanide-intoxicatie)

### Contra-indicaties voor toepassing van het staand order.

Het staand order is **NIET** van toepassing op:

- ✓ Patiënten met een allergie of intolerantie voor de voorgestelde medicatie binnen dit staand order.
- ✓ Patiënten met een cardio-respiratoir arrest → PIT staand order 20/22 (volwassenen) - 21/23 (kinderen)

### Algemene maatregelen.



#### VEILIGHEID:

- ✓ CO is daar waar men het niet verwacht → gebruik steeds de persoonlijke CO-detector van de ziekenwagen.
- ✓ Bij twijfel over aanwezigheid van CO → brandweer bijvragen voor het opsporen van CO

#### ABCDE:



**Saturatiemeting is onbetrouwbaar !!!**

- ✓ Continue monitoring van de RR, saturatie, cardiale monitoring en NIBP.
- ✓ Controle glycemie zo aangewezen.
- ✓ Houding in functie van bewustzijn van de patiënt (halfzittende/zittende/veiligheidshouding)
- ✓ Plaatsen van een intraveneuze toegangsweg.

- ✓ Labo (indien mogelijk)
- ✓ 12-afleidingen ECG

## AMVLOP

- ✓ Bron van CO (boiler, houtkachel, gaskachel, schouw, uitlaat wagon, ...)
- ✓ Familiale of collectieve malaise (ook huisdieren)

## Specifieke maatregelen.

### ❶ Verwijdering uit de woonst

- ✓ Verzorging zal steeds in de ziekenwagen gebeuren of in open lucht!

### ❷ Zuurstoftherapie

- ✓ 15 L/min met masker en reservoir.

### ❸ Verwijzing naar centrum voor hyperbare zuurstoftherapie (MUG)

- ✓ Zwangerschap. (omwille van de oxygenatie van de foetus)
- ✓ Manifeste neurologische tekens.

## MUG-bijstand is aangewezen ingeval van:

- ✓ Indien vermoeden van een cyanide-intoxicatie → MUG voor toedienen cyanokit (5 gram)
  - Instabiele patiënten.
  - Bewustzijnsverlies.
  - Tekens van rookinhalatie.
- ✓ Comateuze patiënten of rookinhalatie tekens met nood aan intubatie

## Aandachtspunten.

- ❶ Zuurstof blijven toedienen tot na controle arteriële bloedgaswaarden op spoedgevallen.