



Indicaties voor toepassing.

Patiënten met gedragsstoornissen op motorisch, psychisch of relationeel vlak die niet door de omgeving worden verdragen en die een onrustige, zenuwachtige houding en bewegingen vertonen.

Er zijn 3 niveaus van opwindning waar te nemen:

1. Oncontroleerbaar met geweld (niet te benaderen)
2. Agitatie met indicatie tot onmiddellijke geweldpleging.
3. Controleerbare agitatie.

Contra-indicaties voor toepassing van het staand order.

Het staand order is **NIET** van toepassing op:

- ✓ Patiënten met agitatie ten gevolge van een onderliggende hypoglycemie □ PIT staand order 11
- ✓ Patiënten met agitatie ten gevolge van een epilepsie-aanval □ PIT staand order 6
- ✓ Patiënten met agitatie ten gevolge van een mogelijke stroke □ PIT staand order 29
- ✓ Patiënten met een allergie of intolerantie voor de voorgestelde geneesmiddelen binnen dit staand order.

Algemene maatregelen.



VEILIGHEID

- ✓ Zorg voor veiligheid van hulpverleners, patiënt, omstaanders, zo nodig met assistentie van of door de politiediensten.
- ✓ Overweeg laagdrempelig bijstand van de politie.

ABCDE:

- ✓ Vitale parameters zijn vereist (RR, glycemie, NIBP, HF, saturatie, temperatuur)
- ✓ Labo
- ✓ Plaatsen van een intraveneuze toegangsweg indien noodzakelijk. (en mogelijk)

AMVLOP

- ✓ Trauma, inname van toxische stoffen of medicatie, derving, diabetes, koorts, ...

Specifieke maatregelen.

❶ *Poging tot dialoog om verdere escalatie te voorkomen.*

❷ *Diagnostiek // behandeling van de somatische oorzaak primeert:*

Somatische oorzaken	Hypoxie, hypercapnie Shock Hypoglycemie Elektrolytenstoornissen Epilepsie Hersensbloeding	Meningitis, encephalitis Stroke Hersentumor Blaasaandoeningen Hyperthermie
Toxische oorzaken	Alcohol Verdovende middelen Medicatie Ontbering CO	
Psychische oorzaken	Manische aanval Psychose of acute delirante vlaag Schizofrenie Zenuwcrisis of hysterie Paniekaanval Asociale of beperkte persoonlijkheid	

❸ *Medicatie (eerst diagnostiek en daarna pas medicatie-toediening)*

- ✓ Psychische oorzaken □ Temesta 1 mg SL
- ✓ Somatische oorzaken □ geen medicatie toedienen, oorzakelijk behandelen.
- ✓ Toxische oorzaken □ Temesta 1 mg SL na advies (telefonisch contact met urgentie-arts)

❹ *Fysieke fixatie*

- ✓ Immobilisatie door fixatie zoveel mogelijk vermijden tenzij noodzakelijk om hulpverleners, patiënt en/of omgeving te beschermen.

MUG-bijstand is aangewezen ingeval van:

- ✓ Indien oncontroleerbaar na toediening van medicatie of bij weigering om medicatie in te nemen.
- ✓ Excited delirium

Aandachtspunten.

❶ *Opgelet!*

Een verwarde ethiologie kan van psychiatrische (62%), organische (25%) of toxische (25%) oorsprong zijn.

❷ *Documenteer duidelijk in het PIT-verslag indien de patiënt geen handelingen toelaat!*