



PIT staand order 3

Pijnstilling bij niet traumatische aandoeningen



Indicaties voor toepassing.

Standaardbehandeling voor het toedienen van pijnmedicatie bij patiënten (volwassenen) met pijn ten gevolge van:

- ✓ Thoracale pijn (van niet cardiale oorsprong)
- ✓ Abdominale pijn
- ✓ Vermoeden van een nierkoliek
- ✓ Acute hoofdpijn

Contra-indicaties voor toepassing van het staand order.

Het staand order is **NIET** van toepassing op:

- ✓ Kinderen met pijn ten gevolge van een niet traumatische aandoening.
- ✓ Zwangere patiënten.
- ✓ Patiënten met thoracale pijn, abdominale pijn of hoofdpijn ontstaan na een trauma.
- ✓ Patiënten met hemodynamische instabiliteit.
- ✓ Patiënten met een allergie of intolerantie voor de voorgestelde geneesmiddelen binnen dit staand order.
- ✓ Patiënten met rugpijn.

Algemene maatregelen.



ABCDE:

- ✓ HF, RR, NIBP, T°, (glycemie) → toedienen van zuurstof in functie van de saturatie.
- ✓ Continue monitoring van de vitale parameters is vereist bij een VAS >7
- ✓ Labo.
- ✓ Plaatsen van een intraveneuze toegangsweg.
- ✓ Afname van een 12-lead ECG (bij thoracale en abdominale pijn)

AMVLOP:

- ✓ VAS-score is vereist voor **EN** na het toedienen van pijnmedicatie.

Specifieke maatregelen:

▣ *Patiënten met thoracale pijn (GEEN ACS!!!)*

- ✓ **VAS 4 - 7** ⇒ 1 gram paracetamol IV over 15-30 minuten
- ✓ **VAS >7**
 - **Telefonisch contact met urgentie-arts**
 - 1 gram paracetamol IV over 15-30 minuten
 - 1 ampul contramal (100 mg/2ml) + 1 ampul litican (50mg/2ml) in 100 ml NaCl 0.9% IV

▣ *Patiënten met abdominale pijn:*

- ✓ **VAS 4 - 7**
 - 1 gram paracetamol IV over 15-30 minuten
 - 1 ampul litican (50 mg/2ml) IV indien misselijkheid en/of braken
- ✓ **VAS >7**
 - **Telefonisch contact met urgentie-arts**
 - 1 gram paracetamol IV over 15-30 minuten
 - 1 ampul contramal (100 mg/2ml) + 1 ampul litican (50mg/2ml) in 100 ml NaCl 0.9% IV

▣ *Patiënten met vermoeden van een nierkoliek:*

- ✓ **VAS 4 - 7**
 - 1 gram paracetamol IV over 15-30 minuten
- ✓ **VAS >7**
 - **Telefonisch contact met urgentie-arts**
 - 1 gram paracetamol IV over 15-30 minuten
 - 20 mg taradyl IV in 50 ml NaCl 0.9% over 15 minuten

□ **Patiënten met acute hoofdpijn:**

✓ **VAS 4 - 7**

- 1 gram paracetamol IV over 15-30 minuten
- 1 ampul litican (50 mg/2ml) IV indien misselijkheid en/of braken.

✓ **VAS >7**

- **Telefonisch contact met urgentie-arts**
- 1 gram paracetamol IV over 15-30 minuten
- 1 ampul contramal (100 mg/2ml) + 1 ampul litican (50mg/2ml) in

MUG-bijstand is aangewezen ingeval van:

- ✓ Patiënten met hemodynamische instabiliteit.

Aandachtspunten.

- De maximale dosis paracetamol is 1 gram om de 6 uur.
- Contra-indicaties voor toediening van medicatie uit het staand order:

Paracetamol	NSAID's
<ul style="list-style-type: none">• Allergie• Leverinsufficiëntie• Actief ethylisme	<ul style="list-style-type: none">• Allergie• > 65 jaar• Nierinsufficiëntie• Leverinsufficiëntie• Maagulcera• Colitis ulcerosa of Crohn• COPD/astma• Zwangerschap• Stollings- en bloedingsproblemen

- Wees bedacht op de aanwezigheid van een aneurysma en dissectie!